

## 形考任务一

1. 临产的主要标志是（规律宫缩并逐渐增强、宫颈扩张、胎先露下降）
2. 第一产程又称宫颈扩张期，一般产妇需经历的时间是（初产妇约 11~12 小时）
3. 用胎心监护仪监护胎心率，下列指标中提示胎儿缺氧的是（晚期减速）
4. 属于手术流产严重并发症的是（子宫穿孔）
5. 关于激素治疗（HT）禁忌症错误的是（骨质疏松）
6. 女性孕前及孕初补充叶酸的目的是（降低胎儿神经管畸形的发生率）
7. 乙肝第一次接种的年龄是（出生时）
8. 计划免疫中初种年龄为 1 岁以上的疫苗是（甲肝疫苗）
9. 婚前医学检查指定传染病不包括（滴虫性阴道炎）
- 10 小儿先能抬头后能坐，之后能走遵循的发育顺序是（由上到下的顺序）
11. 临产后肛查了解胎头下降程度的标志是（坐骨棘）
12. 关于宫内节育器不良反应及护理的叙述不正确的是（不规则阴道流血处理无效时，建议继续观察）
13. 常用来推算预产期的依据是（末次月经开始的第一天）
14. 新生儿期保健要点不包括（排便训练）
15. 胎盘剥离的征象，不包括（宫底下降）
16. 妊娠期子宫变化的特点，应除外（支持子宫的韧带松弛）
17. 正常产程进展的标志是（胎头下降和宫口扩张）
18. 围婚期保健包括（婚前医学检查）
19. 预防接种属于（人工主动免疫）
20. 可以准确诊断早期妊娠的是（：超声发现子宫内有孕囊）
21. 产褥期，正常恶露持续（4~6 周）

22. 在分娩过程中起主导作用的产力是（子宫收缩力）
23. 孕前保健指导的内容描述错误的是（对于有畸形儿、智力低下儿生育史或有习惯性流产、死胎等不良生育史的服务对象，建议避免生育）
24. 下列哪个不是围生期人工监护技术（心电图）
25. 婚前医学检查的主要疾病，不包括（食管癌、肺癌等恶性肿瘤）

## 形考任务二

1. 一新生儿胎龄 37 周，出生体重 2600g，其出生体重在同胎龄儿平均体重的 15 百分位，该新生儿是（足月儿、适于胎龄儿）
2. 一 Rh 溶血患儿，出现嗜睡、尖声哭叫、肌张力下降，胆红素上升至  $342 \mu\text{mol/L}$ ，该患儿最可能发生了（胆红素脑病）
3. 新生儿肺透明膜病主要是由于（缺乏肺表面活性物质）
4. 缓解哮喘患儿呼吸困难的措施，不包括（指导和鼓励患儿做浅而快的呼吸运动）
5. 新生儿生后排尿的时间一般为（生后 24 小时内）
6. 超低出生体重儿是指（出生体重不足 1000g 的新生儿）
7. 新生儿出生后开始排胎便的时间一般为（生后 12 小时内）
8. 新生儿病理性黄疸要密切观察病情变化，观察内容不包括（腹部体征的变化）
9. 哮喘的防病知识，不包括（多卧床休息，不宜户外活动）
10. 营养性缺铁性贫血的描述，错误的是（大细胞性贫血）
11. 肺炎的临床特征，不包括（肺部干啰音）
12. 关于支气管哮喘的描述,错误的是（常在白日发作或加剧，夜间很少发作）
13. 指导家长对早产儿及低体重儿及早给予铁剂元素铁  $0.8\sim 1.5\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ ，时间为（约 2 月龄）
14. 护理脱水补液的患儿时，如输液后患儿出现乏力、腹胀、肠鸣音减弱、腱反射消失、心音低钝，应考虑发生了（低钾血症）
15. 预防小儿营养性缺铁性贫血饮食上应强调（母乳加辅食，如蛋黄、豆类、肉类）

16. 哮喘持续状态指的是哮喘持续发作，在合理应用常规拟交感神经药物和茶碱类药物治疗后仍有严重或进行性呼吸困难，出现低氧血症、心功能不全，时间一般在（12h 以上）
17. 营养性缺铁性贫血的一般表现，不包括（ 年长儿可诉头晕、腹痛 ）
18. 新生儿窒息的预防措施，不包含（ 孕妇不需检测血糖 ）
19. 患儿，男，9个月，咳嗽2天，1天来发烧 $38^{\circ}\text{C}\sim 38.5^{\circ}\text{C}$ ，伴喘憋而入院。病后吃奶稍差，二便正常。查体：急性病容，呼吸急促，T： $38.5^{\circ}\text{C}$ ，R：50次/分，P：160次/分，可见鼻扇及三凹征，口周发绀，两肺满布中小水泡音及痰鸣音，腹软，肝肋下1cm，余正常，神经系统正常。化验：Hb：112g/L，WBC： $21\times 10^9/\text{L}$ 。诊断：支气管肺炎。以下护理措施不正确的是（ 保持固定体位，减少能量消耗 ）
20. 人体所需的维生素D主要来源于（ 人体皮肤中的7-脱氢胆固醇 ）
21. 预防维生素D缺乏性佝偻病最应强调（： 经常晒太阳 ）
22. 适于胎龄儿指的是新生儿出生体重在同胎龄儿平均体重（ 第10~90百分位数之间 ）
23. 对新生儿肺透明膜病患儿进行氧气疗法， $\text{PaO}_2$ 应维持在（  $6.7\sim 9.3\text{kPa}$ （ $50\sim 70\text{mmHg}$ ））
24. 足月新生儿生理性黄疸多出现于生后（ 2~3 天 ）
25. 引起小儿秋冬季腹泻最常见的病毒是（： 轮状病毒 ）

### 形考任务三

1. 法洛氏四联症患儿喜蹲踞的主要原因是（ 体循环阻力增加，减少右向左分流血量 ）
2. 皮肤黏膜淋巴结综合征的临床特点，不包括（ 关节肿痛 ）
3. 以下不符合手足口病特点的是（ 皮疹呈向心分布 ）
4. 法洛四联症由四种畸形组成，其中不包括（ 房间隔缺损 ）
5. 原发性肾病综合征患儿的饮食护理，错误的是（ 水肿消退、尿量正常后应该继续长期限盐 ）
6. 患儿，女，2岁，4天开始发热， $T 38.5^{\circ}\text{C}\sim 39^{\circ}\text{C}$ ，伴有咳嗽、流涕、眼红流泪，今起开始出皮疹，耳后、头颈部开始，体温更高，患儿烦躁不适加重。查体：急性病容、 $T 39.8^{\circ}\text{C}$ ，精神萎靡，咽红，鼻涕、眼泪多，头部及躯干部可见较密皮疹，四肢也见少量散在皮疹，皮疹为红色斑丘疹，疹间皮肤正常。心率150次/分、两肺呼吸音较粗，腹软，肝肋下可及边缘。神经系统未见异常。患儿为进城务工人员子女，刚从老家接来，预防接种史不详。昨日邻

居有一3岁小儿发热、出疹子。入院诊断为麻疹。常见的护理问题，其中不正确的（气体交换受损：与肺部炎症有关）

7. 麻疹的预防措施，错误的是（接触的易感者应隔离观察检疫28天）
8. 单纯性肾病最先出现的症状是（水肿）
9. 保持惊厥患儿呼吸道通畅的护理措施，错误的是（在牙关紧闭时，要强力撬开）
10. 结核病流行病学特点，不包括（儿童结核病的感染率随年龄的增长而降低）
11. 预防手足口病的关键是（托幼机构搞好环境卫生和饮食卫生）
12. 手足口病的流行病学特点，不包括（重症患者是主要的传染源）
13. 心脏按压与人工呼吸要同步进行，二者频率之比为（5:1~10:1）
14. 川崎病形成冠状动脉瘤的高危因素，不包括（女孩）
15. 单纯性肾病综合征的首选药物为（肾上腺皮质激素）
16. 关于麻疹高热护理，正确的是（体温升至40℃以上时，可用小量退热药）
17. 儿科门诊护士分诊，早期发现麻疹的最有价值的依据是（口腔黏膜柯氏斑）
18. 抗结核药物治疗原则，不包括（单一用药）
19. 胸外心脏按压的要求，错误的是（按压速度约为130次/min）
20. 结核性脑膜炎最易发生在（原发结核感染后3~6个月）
21. 急性肾炎的主要预防措施是（避免或减少上呼吸道感染）
22. 手足口病的主要特征是（发热和手、足、口等部位皮肤黏膜的疱疹或溃疡）
23. 惊厥的用药护理，错误的是（使用副醛，建议使用塑料注射器（一次性注射器））
24. 皮质激素的副作用不包括（凝血时间延长）
25. 平时由于体循环压力高于肺循环，血液从左向右分流而不出现青紫当屏气、剧烈哭闹或任何病理情况致肺动脉和右心室压力增高并超过左心压力时，血液自右向左分流而出现暂时性青紫，故此型称为（左向右分流型（潜伏紫绀型））

## 形考任务四

1. 胎盘早剥的处理原则是（纠正休克、及时终止妊娠）
2. 控制子痫的首选药物是（硫酸镁）
3. 诊断前置胎盘较安全可靠的方法是（B超检查）
4. 胎盘早剥的临床特点是（妊娠晚期突然发生的腹部持续性疼痛）
5. 产后出血约 80%发生在产后（2 小时内）
6. 前置胎盘患者在接受非手术治疗期间的病情观察，错误的是（阴道流血量不多时可减少观察次数）
7. 胎盘早剥缓解症状的护理措施，不包括（为期待疗法做好准备）
8. 妊娠期高血压疾病患者使用硫酸镁解痉时，应停用药物的情况是（膝反射消失）
9. 前置胎盘的典型症状是妊娠晚期或临产时，出现（突发性无诱因、无痛性阴道流血）
10. 以下妊娠合并糖尿病健康教育内容，错误的是（产后不宜母乳喂养）
11. 输卵管妊娠的主要处理方法是（手术治疗）
12. 妊娠期糖尿病的诊断要依靠（糖筛查试验）
13. 不符合输卵管妊娠流产或破裂检查所见的是（子宫增大与停经月份相符，质地硬）
14. 产后出血指的是（胎儿娩出后 24 小时内阴道出血量超过 500ml 者）
15. 妊娠合并糖尿病的饮食和运动指导，错误的是（运动方式可选择中等强度的运动，持续 20~40 分钟）
16. 李女士，30 岁，初产妇，停经 28 周，因阴道流血 1 天收入院。患者于 1 日前无明显诱因出现阴道流血，量较多，无腹痛。入院检查：血压 120/75mmHg，尿蛋白 (-)，下肢水肿 (-)，血色素 82g/L。B 超提示胎盘位于子宫右后壁延至前壁覆盖宫颈内口，为前置胎盘，现接受期待疗法的治疗方案。以下护理措施错误的是（孕妇要尽量卧床休息，尤以右侧卧位为佳）
17. 妊娠期高血压疾病患者，采用大剂量硫酸镁治疗时，其最早出现的中毒反是（：膝腱反射消失）
18. 关于期待疗法孕妇的护理措施的叙述，正确的是（孕妇需住院观察，绝对卧床休息，尤以左侧卧位为佳）

19. 输卵管妊娠最常见的原因是（输卵管慢性炎症）
20. 预防产后出血的措施，错误的是（第二产程指导产妇正确使用腹压，适时适度作会阴侧切术，胎头、胎肩娩出要快）
21. 妊娠期糖尿病（gestational diabetes mellitus, GDM）是指（妊娠期首次发现或发生的糖代谢异常）
22. 关于妊娠期高血压疾病妇女的产时和产后护理，错误的措施是（胎儿娩出前肩后立即静推麦角新碱）
23. 前置胎盘患者的处理原则，不包括（及早终止妊娠）
24. 胎盘早期剥离的主要病理变化是出血发生在（底蜕膜）
25. 关于分娩期预防产后出血的措施的叙述，错误的是（胎头、胎肩娩出要尽量快）

## 形考任务五

1. 以下局部刺激较强的化疗药物外渗所采取的措施，错误的是（给予局部热敷）
2. 子宫内膜癌晚期或复发患者不能手术切除，或年轻、早期、要求保留生育功能者，可考虑用（大剂量孕激素治疗）
3. 关于淋病的描述，错误的是（孕妇在妊娠晚期感染淋病，对胎儿无不良影响）
4. 李女士，58岁，绝经8年后阴道流血2个月，出血量时多时少，盆腔检查：宫颈光滑，子宫正常大小、软，双侧附件正常。怀疑子宫内膜癌，为明确诊断，首选的辅助检查是（分段诊断性刮宫）
5. 葡萄胎病人在随访期间最好的避孕方法是（避孕套）
6. 子宫颈癌术后预防尿潴留发生的措施，不包括（尽早采取导尿措施，尽量使尿液排空）
7. 子宫内膜癌最常见症状是（不规则阴道流血）
8. 关于卵巢纤维瘤的描述，错误的是（肿瘤多为双侧，中等大小）
9. 大力宣传定期普查的重要性，30岁以上妇女（每1~2年接受一次妇科检查）
10. 关于库肯勃瘤的描述，错误的是（囊性）
11. 对采用孕激素治疗的子宫内膜癌患者采取的护理措施，不正确的是（应说明此类药虽

然应用剂量大，时间长，但通常没有副作用 )

12. 化疗患者考虑停药的血白细胞计数为 (  $3.0 \times 10^9/L$  )

13. 关于尖锐湿疣病因及发病机制的描述，错误的是 ( 不通过污染的衣物、器械间接传播 )

14. 某 40 岁妇女，白带多，偶伴性交后出血现象，妇科检查：宫颈重度糜烂。为排除宫颈癌，首选的检查项目是 ( 宫颈刮片细胞学检查 )

15. 绒毛膜癌最主要的转移途径是 ( 血行转移 )

16. 子宫托使用的注意事项，错误的是 ( 上托 6 个月后一般不用继续到医院复查 )

17. 我国目前发病率最高的一种性传播疾病是 ( 淋病 )

18. 某患者，女，41 岁，因经量增多，经期延长 2 年，症状加重 6 个月入院。2 年前开始出现月经量增多，近 6 个月经期延长，周期缩短为 6~7/16~17 天，量多伴血块，常感头晕、乏力。月经史：14 5~6/25~26，量中。体检：子宫前位，约孕 3 个月大小，质硬，宫体活动度好，无明显压痛。实验室检查：血红蛋白 82g/L。入院诊断为：子宫肌瘤 贫血。

患者入院后睡眠差，经常询问“能否吃止血药治疗？害怕手术会疼痛，还怕影响以后生活……”。该患者存在的可能的护理问题如下：

知识缺乏：与缺乏子宫肌瘤发生、发展和治疗相关的知识有关

焦虑：与担心肌瘤恶变及手术后影响生活方式有关

应对无效：与病史较长，病情加重、有继发性症状出现和无法选择有效治疗方案有关

针对护理问题制定的护理措施，不恰当的是 ( 要求病人自行学习疾病知识 )

19. 指导患者放取喇叭型子宫托的方法的叙述，错误的是 ( 托盘达子宫颈后，将托柄弯度朝后，对正耻骨弓后面便可 )

20. 卵巢肿瘤围手术期护理，错误的是 ( 一次放腹水不宜超过 1000ml，速度缓慢，放后用腹带包扎腹部 )

21. 关于子宫肌瘤手术的护理，错误的是 ( 经阴道黏膜下肌瘤摘除术常在蒂部留置止血钳 12 小时 )

22. 子宫颈癌患者的早期症状是 ( 接触性出血 )

**23.** 张女士，69岁，孕6产5，患慢性支气管炎20年，经常咳嗽。10年来感觉有块状物自阴道脱出，起初卧床休息后块状物可消失。近6年来脱出的块状物逐渐增大，卧床休息后也不消失，大笑、咳嗽时有尿溢出伴尿频。患者感觉到行走不便，影响日常生活，但害怕手术治疗。妇科检查：阴道前后壁膨出，宫颈及部分宫体脱出于阴道口。压力性尿失禁的检查结果，提示患者有压力性尿失禁。该病人最可能的医疗诊断是（**子宫脱垂Ⅱ度重型**）

**24.** 卵巢肿瘤患者最常见的并发症是（**蒂扭转**）

**25.** 在女性生殖系统恶性肿瘤中，目前死亡率最高的是（**卵巢癌**）