

单选题

- 1、三部分护理诊断的陈述多用于：（ ）
正确选项 1. 现存的护理诊断(V)
- 2、所示的心电图可诊断为：（ ）

正确选项 1. 室性期前收缩(V)
- 3、“潜在并发症：出血”属于：（ ）
正确选项 1. 医护合作性问题(V)
- 4、I 导联是较深的负向波，III 导联是正向波，电轴：（ ）
正确选项 1. 右偏(V)
- 5、I 导联是正向波，III 导联是较深的负向波，电轴：（ ）
正确选项 1. 左偏(V)
- 6、Murphy 征阳性见于：（ ）
正确选项 1. 急性胆囊炎(V)
- 7、P 波代表：（ ）
正确选项 1. 心房除极(V)
- 8、QRS 波群代表：（ ）
正确选项 1. 心室除极(V)
- 9、板状腹见于：（ ）
正确选项 1. 急性弥漫性腹膜炎(V)
- 10、病人处于病理性睡眠状态，唤醒后能正确回答问题和作出各种反应，刺激停止后又很快入睡，称为：（ ）
正确选项 1. 嗜睡(V)
- 11、不会出现触觉语颤增强的病变是（ ）
正确选项 1. 大量胸腔积液(V)
- 12、采集病史过程中，下列提问不妥的是：（ ）
正确选项 1. 你的粪便发黑吗？(V)
- 13、肠鸣音活跃见于：（ ）
正确选项 1. 胃肠道大出血(V)
- 14、肠鸣音亢进见于：（ ）
正确选项 1. 机械性肠梗阻(V)
- 15、肠鸣音消失常见于：（ ）
正确选项 1. 麻痹性肠梗阻(V)
- 16、出现黑便提示一次上消化道出血量达：（ ）
正确选项 1. 50~70ml 以上(V)
- 17、触及奇脉常提示：（ ）
正确选项 1. 缩窄性心包炎(V)
- 18、大咯血是指一次咯血量达 300~500ml，或每日咯血量达：（ ）
正确选项 1. 500ml 以上(V)
- 19、大量腹水患者仰卧时，腹部外形呈：（ ）
正确选项 1. 蛙腹(V)
- 20、导致呕血最常见的胃及十二指肠原因是：（ ）
正确选项 1. 消化性溃疡(V)
- 21、盗汗多见于：（ ）
正确选项 1. 结核病(V)
- 22、第一心音减弱可见于：（ ）
正确选项 1. 二尖瓣关闭不全(V)
- 23、对个体社会属性的评估的内容应包

- 括：（ ）
正确选项 1. 角色、文化、家庭、环境(V)
- 24、多汗见于：（ ）
正确选项 1. 甲状腺功能亢进(V)
- 25、反跳痛表示炎症累及：（ ）
正确选项 1. 腹膜壁层(V)
- 26、肥胖是指体重超过标准体重的：（ ）
正确选项 1. 20%(V)
- 27、肺部叩诊呈鼓音，见于：（ ）
正确选项 1. 气胸(V)
- 28、肺部叩诊呈浊音或实音多见于：（ ）
正确选项 1. 肺部大片炎症(V)
- 29、分泌性腹泻的特点为：（ ）
正确选项 1. 腹泻量大呈水样(V)
- 30、腹部叩诊鼓音范围明显缩小，可见于：（ ）
正确选项 1. 腹腔内大量积液(V)
- 31、腹部叩诊鼓音范围明显增大，见于：（ ）
正确选项 1. 胃肠高度胀气(V)
- 32、腹式呼吸消失可见于：（ ）
正确选项 1. 急性腹膜炎(V)
- 33、肝源性水肿的特点为：（ ）
正确选项 1. 以腹水为主要表现(V)
- 34、干性咳嗽常见于的疾病是：（ ）
正确选项 1. 胸膜炎(V)
- 35、咯血直接致死的重要原因为：（ ）
正确选项 1. 窒息(V)
- 36、关于问诊，下列错误的是：（ ）
正确选项 1. 问诊要全面，危重病人更应详细询问后再处理(V)
- 37、关于心电图操作的环境要求，错误的是：（ ）
正确选项 1. 使用直流电源的心电图机必须接地线(V)
- 38、关于心电图操作时的病人准备，错误的是：（ ）
正确选项 1. 不必介意检查前病人是否饱餐或吸烟(V)
- 39、呼气性呼吸困难常见于：（ ）
正确选项 1. 支气管哮喘(V)
- 40、呼吸中枢兴奋性极度降低时，出现的呼吸节律改变称为：（ ）
正确选项 1. 间停呼吸(V)
- 41、患者一般护理记录单的记录频率，依病情而定，一般要求二级护理患者至少：（ ）
正确选项 1. 每周 2 次(V)
- 42、患者一般护理记录单的记录频率，依病情而定，一般要求三级护理患者至少：（ ）
正确选项 1. 每周 1 次(V)
- 43、患者一般护理记录单的记录频率，依病情而定，一般要求一级护理患者至少：（ ）
正确选项 1. 每日 1 次(V)
- 44、鉴别深昏迷与浅昏迷最有价值的项目是：（ ）

- 正确选项 1. 深浅反射是否全部消失(V)
- 45、角膜反射完全消失，见于：（ ）
正确选项 1. 深昏迷者(V)
- 46、角色冲突是指：（ ）
正确选项 1. 角色期望与角色表现差距太大(V)
- 47、角色适应不良产生的原因是：（ ）
正确选项 1. 角色表现与角色期望不协调(V)
- 48、颈静脉怒张提示：（ ）
正确选项 1. 静脉压增高(V)
- 49、颈项强直见于：（ ）
正确选项 1. 脑膜炎(V)
- 50、咳粉红色泡沫痰见于：（ ）
正确选项 1. 肺水肿(V)
- 51、口唇呈樱桃红色见于：（ ）
正确选项 1. 一氧化碳中毒(V)
- 52、口腔内有烂苹果味，见于：（ ）
正确选项 1. 糖尿病酮症酸中毒(V)
- 53、叩诊移动性浊音阳性，提示腹腔内游离腹水达：（ ）
正确选项 1. 1000ml 以上(V)
- 54、类风湿性关节炎的手部特征性改变为：（ ）
正确选项 1. 梭形关节(V)
- 55、冷汗见于：（ ）
正确选项 1. 虚脱(V)
- 56、扪及交替脉常提示：（ ）
正确选项 1. 左心功能不全(V)
- 57、脑膜刺激征见于：（ ）
正确选项 1. 脑脊液压力增高(V)
- 58、能反映个体思维能力的是：（ ）
正确选项 1. 认知水平(V)
- 59、呕血提示胃内积血量达：（ ）
正确选项 1. 250~300ml(V)
- 60、浅昏迷与昏睡最有价值的鉴别是：（ ）
正确选项 1. 病人能否被唤醒(V)
- 61、强迫仰卧位见于：（ ）
正确选项 1. 急性腹膜炎(V)
- 62、强迫坐位见于：（ ）
正确选项 1. 心、肺功能不全(V)
- 63、全身软组织均可见明显水肿，指压后出现较深的凹陷，平复缓慢，其水肿程度为：（ ）
正确选项 1. 中度水肿(V)
- 64、全身组织严重水肿，身体低垂部位皮肤紧张发亮，甚至有液体渗出，可伴有胸腔、腹腔、鞘膜腔积液，外阴部也可有明显水肿，其水肿程度为：（ ）
正确选项 1. 重度水肿(V)
- 65、确定第一心音最有价值的是：（ ）
正确选项 1. 与心尖搏动同时出现(V)
- 66、人的基本心理活动为：（ ）
正确选项 1. 认知、情感和意志(V)
- 67、上肢平伸时手指细微震颤见于：（ ）
正确选项 1. 甲状腺功能亢进(V)
- 68、社会评估的目的不包括：（ ）
正确选项 1. 评估个体的性格(V)

69、肾源性水肿的特点为：（ ）
正确选项 1. 初为晨起眼睑与颜面水肿(V)

70、渗出性腹泻的特点为：（ ）
正确选项 1. 多伴腹痛与发热(V)

71、双侧瞳孔大小不等见于：（ ）
正确选项 1. 脑疝(V)

72、双侧瞳孔散大伴对光反射消失见于：（ ）
正确选项 1. 濒死状态(V)

73、双侧胸廓扩张受限多见于：（ ）
正确选项 1. 肺气肿(V)

74、双侧眼球下陷见于：（ ）
正确选项 1. 严重脱水(V)

75、双肺闻及干啰音可见于：（ ）
正确选项 1. 支气管哮喘(V)

76、水肿仅发生于眼睑、眶下软组织，胫骨前及踝部皮下组织，指压后组织轻度凹陷，平复较快，其水肿程度为：（ ）
正确选项 1. 轻度水肿(V)

77、所示的心电图可诊断为：（ ）

正确选项 1. 一度房室传导阻滞(V)

78、抬举样搏动作为可靠体征，发生的病理改变是：（ ）
正确选项 1. 左室肥大(V)

79、提示下呼吸道部分阻塞、痉挛或狭窄的呼吸音是（ ）
正确选项 1. 呼气音延长(V)

80、体格检查时触诊肌肉坚实，被动运动阻力增加，为：（ ）
正确选项 1. 肌张力增强(V)

81、无脉主要见于：（ ）
正确选项 1. 严重休克(V)

82、膝关节腔积液的重要体征为：（ ）
正确选项 1. 浮髌试验阳性(V)

83、下列不是中枢性呕吐特点的是：（ ）
正确选项 1. 与头部位置改变有关(V)

84、下列各项属于客观资料的是：（ ）
正确选项 1. 肝脏肿大(V)

85、下列关于护理诊断“清理呼吸道无效”的相关因素的描述，错误的是：（ ）
正确选项 1. 清理呼吸道无效：与肺气肿伴上呼吸道感染有关(V)

86、下列关于护理诊断的描述，正确的是：（ ）
正确选项 1. 用于判断一个体对健康问题的反应(V)

87、下列关于一上消化道出血伴柏油样便病人的护理诊断的陈述，正确的是：（ ）
正确选项 1. 排便异常：柏油样便：与进食不规则所致消化性溃疡有关(V)

88、下列属于焦虑和抑郁共有症状的是：（ ）
正确选项 1. 睡眠障碍(V)

89、下列属于自我概念的分类的是：（ ）
正确选项 1. 真实自我、期望自我、表现自我(V)

90、下列最能反应家庭成员间的相互关系的是：（ ）
正确选项 1. 沟通类型(V)

91、下列最易出现触觉语颤增强的是：（ ）
正确选项 1. 肺组织实变(V)

92、下腔静脉阻塞所致的腹壁静脉曲张主要分布于：（ ）
正确选项 1. 腹壁两侧(V)

93、消瘦是指体重低于标准体重的：（ ）
正确选项 1. 10%(V)

94、小儿高热易出现：（ ）
正确选项 1. 惊厥(V)

95、心电图 T 波代表：（ ）
正确选项 1. 心室快速复极(V)

96、心尖部第一心音增强见于：（ ）
正确选项 1. 二尖瓣狭窄(V)

97、心理评估最基本的方法为：（ ）
正确选项 1. 会谈(V)

98、心源性水肿的特点为：（ ）
正确选项 1. 首先出现在身体下垂部位(V)

99、胸式呼吸运动减弱而腹式呼吸运动增强见于：（ ）
正确选项 1. 胸腔疾病(V)

100、严重代谢性酸中毒时的呼吸特征为：（ ）
正确选项 1. 呼吸深快(V)

101、严重吸气性呼吸困难的特征为：（ ）
正确选项 1. “三凹症”(V)

102、夜间阵发性呼吸困难常见于：（ ）
正确选项 1. 急性左心衰竭(V)

103、一部分护理诊断的陈述多用于：（ ）
正确选项 1. 健康的护理诊断(V)

104、以口腔温度为例，超高热是指体温在：（ ）
正确选项 1. 41℃以上(V)

105、以下不是家庭内部资源的是：（ ）
正确选项 1. 家庭的文化背景、宗教信仰(V)

106、因医嘱或因无法避免的肌肉、骨骼不能活动可能导致的“有废用综合征的危险”属：（ ）
正确选项 1. 有危险的护理诊断(V)

107、因长期卧床皮肤受压导致的“有皮肤完整性受损的危险”属：（ ）
正确选项 1. 有危险的护理诊断(V)

108、引起发热最常见的原因：（ ）
正确选项 1. 感染性发热(V)

109、幽门梗阻所致呕吐的特点为：（ ）
正确选项 1. 多为宿食，常于夜间发生(V)

110、右锁骨上淋巴结肿大常见的癌肿转移为：（ ）
正确选项 1. 肺癌(V)

111、在现存的护理诊断中，导致个体、家庭或社区健康状况改变的因素，称为：（ ）
正确选项 1. 相关因素(V)

112、辗转体位见于：（ ）
正确选项 1. 胆道蛔虫症(V)

113、长期慢性腹泻最易导致：（ ）

正确选项 1. 贫血(V)

114、爪形手可见于：（ ）
正确选项 1. 尺神经损伤(V)

115、正常 P 波时间：（ ）
正确选项 1. <0.12 秒(V)

116、正常成人 QRS 时间：（ ）
正确选项 1. <0.11 秒(V)

117、正常成人在任一导联中，ST 段压低不能：（ ）
正确选项 1. >0.05 mv(V)

118、正常情况下，叩诊鼓音见于：（ ）
正确选项 1. 腹部(V)

119、正常情况下，叩诊清音见于：（ ）
正确选项 1. 肺(V)

120、正常情况下，叩诊实音见于：（ ）
正确选项 1. 肝脏(V)

121、正常人心尖搏动的位置为：（ ）
正确选项 1. 第 5 肋间、左锁骨中线内 0.5~1cm(V)

122、正常人心尖搏动范围为：（ ）
正确选项 1. 直径 2-2.5cm(V)

123、肢导联电极安放的正确方法是自右上肢开始顺时针方向依次为：（ ）
正确选项 1. 红、黄、绿、黑(V)

124、中等量以上咯血者咯血前的先兆症状为：（ ）
正确选项 1. 喉痒、胸闷、咳嗽(V)

125、肿大的淋巴结常位于颈部，呈多发性，质地较硬，大小不等，可互相粘连，或与周围组织粘连，常见于：（ ）
正确选项 1. 淋巴结结核(V)

126、锥体束损害时最易引出的病理反射是：（ ）
正确选项 1. Babinski 征(V)

127、自我概念的组成中最不不稳定，易受疾病、手术或外伤影响的部分是（ ）
正确选项 1. 身体意象(V)

128、左锁骨上淋巴结肿大大多见的癌肿转移为：（ ）
正确选项 1. 胃或食管癌(V)

129、下列各项属于主观资料的是：（ ）
正确选项 1. 恶心(V)