

健康评估卷包-006 试卷号: 22840

单选题 1、角色适应不良产生的原因是: () A、角色期望与角色认知有差异 B、角色期望与角色模仿不一致 C、角色表现与角色期望不协调 D、角色表现与角色认知不协调

答案: C

2、以下不是家庭内部资源的是: () C、家庭的文化背景、宗教信仰

答案: C

3、社会评估的目的不包括: () A、评估个体的角色功能 B、评估个体的文化背景 C、评估个体的性格 D、评估个体的家庭

答案: C

4、长期慢性腹泻最易导致: () A、脱水 B、贫血 C、代谢性酸中毒 D、肛周皮肤糜烂

答案: B

5、浅昏迷与昏睡最有价值的鉴别是: () A、对光反射是否存在 B、排便、排尿是否失禁 C、吞咽反射是否存在 D、病人能否被唤醒

答案: D

6、心源性水肿的特点为: () A、首先出现在身体下垂部位 B、初为眼睑与颜面水肿 C、以腹水为主要表现 D、以口唇、眼睑及下肢胫前较明显,呈非凹陷性

答案: A

7、中等量以上咯血者咯血前的先兆症状为: () A、喉痒、烦躁不安、发绀 B、喉痒、胸闷、咳嗽 C、喉痒、咳嗽、呛咳 D、胸闷、咳嗽、发绀

答案: B

8、中心性发绀主要见于: () A、药物中毒 B、心肺疾病 C、右心衰竭 D、严重休克

答案: B

9、肝源性水肿的特点为: () A、水肿与体位有明显的关系 B、于直立或劳累后出现,休息后减轻或消失 C、以腹水为主要表现 D、指压凹陷不明显

答案: C

10、严重吸气性呼吸困难的特征为: () A、端坐呼吸 B、鼻翼煽动 C、“三凹症” D、哮鸣音

答案: C

11、大咯血是指一次咯血量达 300~500ml,或每日咯血量达: () A、500ml 以上 B、450ml 以上 C、400ml 以上 D、300ml 以上

答案: A

12、患者一般护理记录单的记录频率,依病情而定,一般要求二级护理患者至少: () A、每日 1 次 B、每日 2 次

C、每周 1 次 D、每周 2 次

答案: D

13、下列关于护理诊断“清理呼吸道无效”的相关因素的描述,错误的是: () A、清理呼吸道无效:与腹部手术后切口疼痛有关 B、清理呼吸道无效:与痰液粘稠有关 C、清理呼吸道无效:与无力咳嗽有关 D、清理呼吸道无效:与肺气肿伴上呼吸道感染有关

答案: D

14、一部分护理诊断的陈述多用于: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题

答案: C

15、下列各项属于体征的是: () A、头痛 B、关节酸痛 C、肝脏肿大 D、腹泻

答案: C

16、下列各项属于主观资料的是: () A、肝脏肿大 B、肝功能异常 C、蜘蛛痣 D、恶心

答案: D

17、心电图 T 波代表: () A、心室快速复极 B、心室缓慢复极 C、心室除极 D、心房复极

答案: A

18、正常心电图轴的范围是: () A、0~90° B、0~30° C、30~-90° D、-30~120°

答案: C

19、I 导联是正向波,III 导联是较深的负向波,电轴: () A、正常 B、左偏 C、右偏 D、极度右偏

答案: B

20、关于心电图操作的环境要求,错误的是: () A、温暖 B、床的宽度不宜过窄 C、使用直流电源的心电图机必须接地线 D、心电图机旁不要摆放其他电器用具

答案: C

21、所示的心电图可诊断为: () A、房性期前收缩 B、室性期前收缩 C、窦性期前收缩 D、房室交界性期前收缩

答案: C

22、自我概念的组成中最不稳定,易受疾病、手术或外伤影响的部分是 () A、身体意象 B、社会认同 C、自我认同 D、自尊

答案: A

23、能反映个体思维能力的是: () A、自我概念 B、认知水平 C、情绪与情感 D、压力应对

答案: B

24、心理评估最基本的方法为: () A、会谈 B、观察 C、心理测量学方法 D、医学检测法

答案: A

25、脑膜刺激征见于: () A、脑脊液压力增高 B、锥体束受损 C、小脑疾病 D、震颤麻痹

答案: A

26、第一心音减弱可见于: () A、动脉硬化 B、二尖瓣狭窄 C、甲亢 D、二尖瓣关闭不全

答案: D

27、肺部叩诊呈鼓音, 见于: () A、肺空洞 B、肺气肿 C、气胸 D、肺癌

答案: C

28、右锁骨上淋巴结肿大常见的癌肿转移为: () A、肺癌 B、胃或食管癌 C、乳腺癌 D、肝癌

答案: A

29、肠鸣音活跃见于: () A、胃肠道大出血 B、机械性肠梗阻 C、便秘 D、急性腹膜炎

答案: A

30、双侧瞳孔散大伴对光反射消失见于: () A、有机磷农药中毒 B、阿托品药物反应 C、毒蕈中毒 D、濒死状态

答案: D

31、肺部叩诊呈浊音或实音多见于: () A、肺气肿 B、肺部大片炎症 C、肺空洞 D、气胸

答案: B

32、正常情况下, 叩诊实音见于: () A、肝脏 B、腹部 C、肺部 D、胃泡区

答案: A

33、类风湿性关节炎的手部特征性改变为: () A、爪形手 B、梭形关节 C、杵状指 D、垂腕

答案: B

34、正常情况下, 叩诊鼓音见于: () A、肝脏 B、腹部 C、肺部 D、心脏

答案: B

35、反跳痛表示炎症累及: () A、脏器浆膜层 B、腹壁皮肤 C、腹膜脏层 D、腹膜壁层

答案: D

36、腹部叩诊鼓音范围明显缩小, 可见于: () A、胃肠高度胀气 B、胃肠穿孔 C、人工气腹 D、腹腔内大量积液

答案: D

37、提示下呼吸道部分阻塞、痉挛或狭窄的呼吸音是 () A、肺泡呼吸音增强 B、肺泡呼吸音消失 C、呼气音延长 D、支气管呼吸音

答案: C

38、全身软组织均可见明显水肿, 指压后出现较深的凹陷,

平复缓慢, 其水肿程度为: () A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案: B

39、颈静脉怒张提示: () A、静脉压增高 B、静脉压降低 C、脉压增宽 D、脉压变窄

答案: A

40、双肺闻及干啰音可见于: () A、胸腔积液 B、肺炎 C、气胸 D、支气管哮喘

答案: D

41、扪及交替脉常提示: () A、右心功能不全 B、主动脉瓣关闭不全 C、左心功能不全 D、缩窄性心包炎

答案: C

42、正常人心尖搏动范围为: () A、半径 2-2.5cm B、直径 2-2.5cm C、半径 0.5-1cm D、直径 1-2cm

答案: B

43、下列最易出现触觉语颤增强的是: () A、肺组织实变 B、肺泡含气量增多 C、皮下气肿 D、大量胸水

答案: A

44、胸式呼吸运动减弱而腹式呼吸运动增强见于: () A、腹膜炎 B、大量腹水 C、妊娠晚期 D、胸腔疾病

答案: D

45、全身组织严重水肿, 身体低垂部位皮肤紧张发亮, 甚至有液体渗出, 可伴有胸腔、腹腔、鞘膜腔积液, 外阴部也可有明显水肿, 其水肿程度为: () A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案: C

46、腹式呼吸消失可见于: () A、腹水 B、急性腹膜炎 C、肠麻痹 D、腹腔内巨大肿块

答案: B

47、不会出现触觉语颤增强的病变是 () A、大叶性肺炎 B、肺栓塞 C、靠近胸壁的肺内巨大空腔 D、大量胸腔积液

答案: D

48、辗转体位见于: () A、心绞痛 B、胆道蛔虫症 C、心、肺功能不全 D、脊椎疾病

答案: B

49、上肢扑翼样震颤见于: () A、肝昏迷 B、甲状腺功能亢进 C、糖尿病酮症酸中毒昏迷 D、震颤性麻痹

答案: B

50、膝关节腔积液的重要体征为: () A、膝关节红、肿 B、膝关节运动障碍 C、浮髌试验阴性 D、浮髌试验阳性

答案: D

健康评估卷包试卷号：22840

- 单选题 1、对个体社会属性的评估的内容应包括：（）A、个性、角色、压力、环境 B、情绪情感、角色、家庭、文化 C、角色、文化、家庭、环境 D、文化、语言、家庭、角色
答案：C
- 2、社会评估的目的不包括：（）A、评估个体的角色功能 B、评估个体的文化背景 C、评估个体的性格 D、评估个体的家庭
答案：C
- 3、以下不是家庭内部资源的是：（）C、家庭的文化背景、宗教信仰
答案：C
- 4、渗出性腹泻的特点为：（）A、水样 B、排便量每日大于1000ml C、无脓血与粘液 D、多伴腹痛与发热
答案：D
- 5、咳粉红色泡沫样痰见于：（）A、支气管扩张 B、大叶性肺炎 C、肺水肿 D、肺梗死
答案：C
- 6、幽门梗阻所致呕吐的特点为：（）A、进餐后即刻发生 B、剧烈呈喷射状 C、多为宿食，常于夜间发生 D、胃排空后仍干呕不止
答案：C
- 7、呕血提示胃内积血量达：（）A、150~200ml B、250~300ml C、350~400ml D、450~500ml
答案：B
- 8、干性咳嗽常见于的疾病是：（）A、胸膜炎 B、肺炎 C、支气管扩张 D、二尖瓣狭窄
答案：A
- 9、肝源性水肿的特点为：（）A、水肿与体位有明显的关系 B、于直立或劳累后出现，休息后减轻或消失 C、以腹水为主要表现 D、指压凹陷不明显
答案：C
- 10、出现黑便提示一次上消化道出血量达：（）A、10~30ml 以上 B、30~50ml 以上 C、50~70ml 以上 D、70~90ml 以上
答案：C
- 11、周围性发绀的特点为：（）A、除四肢及颜面外，亦可见于舌、口腔粘膜和躯干皮肤
答案：A
- 12、因长期卧床皮肤受压导致的"有皮肤完整性受损的危险"属：（）A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题
答案：B
- 13、下列关于护理诊断“清理呼吸道无效”的相关因素的描述，错误的是：（）D、清理呼吸道无效：与肺气肿伴上呼吸道感染有关
答案：D
- 14、下列关于护理诊断的描述，正确的是：（）A、用于确定一个具体的疾病 B、用于确定一个具体的病理状态 C、用于判断一个体对健康问题的反应
答案：C
- 15、在有危险的护理诊断中，导致个体、家庭和社区健康状况改变发生可能性增加的因素，称为：（）A、定义 B、诊断依据 C、相关因素 D、危险因素
答案：C
- 16、下列关于一上消化道出血伴柏油样便病人的护理诊断的陈述，正确的是：（）B、排便异常：柏油样便：与进食不规则所致消化性溃疡有关
答案：B
- 17、正常成人在任一导联中，ST段压低不能：（）A、>0.05mv B、>0.1mv C、>0.25mv D、>0.15mv
答案：A
- 18、正常成人QRS时间：（）A、<0.06秒 B、<0.08秒 C、<0.11秒 D、<0.14秒
答案：C
- 19、I导联是正向波，III导联是较深的负向波，电轴：（）A、正常 B、左偏 C、右偏 D、极度右偏
答案：C
- 20、关于心电图操作时的病人准备，错误的是：（）A、受检者休息片刻，取平卧位 B、不必介意检查前病人是否饱餐或吸烟
答案：B
- 21、肢导联电极安放的正确方法是自右上肢开始顺时针方向依次为：（）A、红、黄、绿、黑 B、黄、绿、黑、红 C、绿、黑、红、黄 D、黑、红、黄、绿
答案：A
- 22、心理评估最基本的方法为：（）A、会谈 B、观察 C、心理测量学方法 D、医学检测法
答案：A
- 23、自我概念的组成中最不稳定，易受疾病、手术或外伤影响的部分是（）A、身体意象 B、社会认同 C、自我认同 D、自尊
答案：A
- 24、能反映个体思维能力的是：（）A、自我概念 B、认知水平 C、情绪与情感 D、压力应对
答案：B
- 25、提示下呼吸道部分阻塞、痉挛或狭窄的呼吸音是（）

A、肺泡呼吸音增强 B、肺泡呼吸音消失 C、呼气音延长 D、支气管呼吸音

答案：C

26、板状腹见于：（）A、急性弥漫性腹膜炎 B、结核性腹膜炎 C、癌性腹膜炎 D、大量腹水

答案：A

27、右锁骨上淋巴结肿大常见的癌肿转移为：（）A、肺癌 B、胃或食管癌 C、乳腺癌 D、肝癌

答案：A

28、冷汗见于：（）A、结核病 B、虚脱 C、甲状腺功能亢进 D、维生素 A 缺乏

答案：A

29、腹部叩诊鼓音范围明显缩小，可见于：（）A、胃肠高度胀气 B、胃肠穿孔 C、人工气腹 D、腹腔内大量积液

答案：D

30、正常人心尖搏动的位置为：（）D、第 5 肋间、左锁骨中线内 0.5~1cm

答案：D

31、体格检查时触诊肌肉坚实，被动运动阻力增加，为：（）A、肌张力增强 B、肌张力减弱 C、肌力增强 D、肌力减弱

答案：A

32、下腔静脉阻塞所致的腹壁静脉曲张主要分布于：（）A、腹壁两侧 B、以脐为中心向四周放射 C、下腹部 D、上腹部

答案：A

33、肠鸣音消失常见于：（）A、机械性肠梗阻 B、麻痹性肠梗阻 C、幽门梗阻 D、大量腹水

答案：B

34、颈静脉怒张提示：（）A、静脉压增高 B、静脉压降低 C、脉压增宽 D、脉压变窄

答案：A

35、抬举样搏动作为可靠体征，发生的病理改变是：（）A、左室肥大 B、右室肥大 C、右房肥大 D、左房肥大

答案：A

36、类风湿性关节炎的手部特征性改变为：（）A、爪形手 B、梭形关节 C、杵状指 D、垂腕

答案：B

37、触及奇脉常提示：（）A、右心衰 B、主动脉瓣关闭不全 C、缩窄性心包炎 D、左心衰

答案：C

38、腹式呼吸消失可见于：（）A、腹水 B、急性腹膜炎

C、肠麻痹 D、腹腔内巨大肿块

答案：B

39、全身组织严重水肿，身体低垂部位皮肤紧张发亮，甚至有液体渗出，可伴有胸腔、腹腔、鞘膜腔积液，外阴部也可有明显水肿，其水肿程度为：（）A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案：C

40、Murphy 征阳性见于：（）A、急性肝炎 B、急性阑尾炎 C、急性胆囊炎 D、急性腹膜炎

答案：C

41、颈项强直见于：（）A、脑膜炎 B、颈肌外伤 C、先天性颈肌挛缩 D、先天性斜颈

答案：A

42、肠鸣音亢进见于：（）A、急性肠炎 B、机械性肠梗阻 C、腹泻 D、胃肠道大出血

答案：B

43、正常人心尖搏动范围为：（）A、半径 2-2.5cm B、直径 2-2.5cm C、半径 0.5-1cm D、直径 1-2cm

答案：B

44、严重代谢性酸中毒时的呼吸特征为：（）A、呼吸浅快 B、呼吸深快 C、有呼吸暂停现象 D、呼吸急促，有屏气呼吸

答案：B

45、腹部叩诊鼓音范围明显增大，见于：（）A、肝脏极度肿大 B、脾脏极度肿大 C、胃肠高度胀气 D、腹腔内大量积液

答案：C

46、扪及交替脉常提示：（）A、右心功能不全 B、主动脉瓣关闭不全 C、左心功能不全 D、缩窄性心包炎

答案：C

47、肠鸣音活跃见于：（）A、胃肠道大出血 B、机械性肠梗阻 C、便秘 D、急性腹膜炎

答案：A

48、胸式呼吸运动减弱而腹式呼吸运动增强见于：（）A、腹膜炎 B、大量腹水 C、妊娠晚期 D、胸腔疾病

答案：D

49、双侧胸廓扩张受限多见于：（）A、胸膜炎 B、肺气肿 C、肺炎 D、肺不张

答案：B

50、大量腹水患者仰卧时，腹部外形呈：（）A、球状腹 B、蛙腹 C、舟状腹 D、平坦腹

答案：B

健康评估卷包-020 试卷号: 22840

- 单选题 1、对个体社会属性的评估的内容应包括: () A、个性、角色、压力、环境 B、情绪情感、角色、家庭、文化 C、角色、文化、家庭、环境 D、文化、语言、家庭、角色
答案: C
- 2、角色适应不良产生的原因是: () A、角色期望与角色认知有差异 B、角色期望与角色模仿不一致 C、角色表现与角色期望不协调 D、角色表现与角色认知不协调
答案: C
- 3、以下不是家庭内部资源的是: () C、家庭的文化背景、宗教信仰
答案: C
- 4、分泌性腹泻的特点为: () A、腹泻量大呈水样 B、多有黏液与脓血 C、与进食有关 D、常伴里急后重
答案: A
- 5、咯血直接致死的重要原因为: () A、肺部感染 B、窒息 C、肺不张 D、失血性休克
答案: B
- 6、中心性发绀主要见于: () A、药物中毒 B、心肺疾病 C、右心衰竭 D、严重休克
答案: B
- 7、小儿高热易出现: () A、昏迷 B、消瘦 C、惊厥 D、失水
答案: C
- 8、鉴别深昏迷与浅昏迷最有价值的项目是: () A、能否被唤醒 B、深浅反射是否全部消失 C、有否排便、排尿失禁 D、肌肉松弛与否
答案: B
- 9、大咯血是指一次咯血量达 300~500ml, 或每日咯血量达: () A、500ml 以上 B、450ml 以上 C、400ml 以上 D、300ml 以上
答案: A
- 10、导致呕血最常见的胃及十二指肠原因是: () A、消化性溃疡 B、胃底静脉曲张破裂 C、急性胃粘膜病变 D、胃癌
答案: A
- 11、周围性发绀的特点为: () A、除四肢及颜面外, 亦可见于舌、口腔粘膜和躯干皮肤
答案: A
- 12、患者一般护理记录单的记录频率, 依病情而定, 一般要求一级护理患者至少: () A、每日 1 次 B、每日 2 次 C、每周 1 次 D、每周 2 次
答案: A
- 13、患者一般护理记录单的记录频率, 依病情而定, 一般要求二级护理患者至少: () A、每日 1 次 B、每日 2 次 C、每周 1 次 D、每周 2 次
答案: D
- 14、三部分护理诊断的陈述多用于: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题
答案: A
- 15、下列各项属于客观资料的是: () A、头痛 B、关节酸痛 C、肝脏肿大 D、腹泻
答案: C
- 16、下列关于一上消化道出血伴柏油样便病人的护理诊断的陈述, 正确的是: () A、上消化道出血: 与消化性溃疡有关 B、排便异常: 柏油样便: 与进食不规则所致消化性溃疡有关 C、上消化道出血: 柏油样便: 与进食不规则所致消化性溃疡有关 D、排便异常: 与消化性溃疡有关
答案: B
- 17、P 波代表: () A、心房除极 B、心房复极 C、心室除极 D、心室复极
答案: A
- 18、正常成人 QRS 时间: () A、<0.06 秒 B、<0.08 秒 C、<0.11 秒 D、<0.14 秒
答案: C
- 19、I 导联是正向波, III 导联是较深的负向波, 电轴: () A、正常 B、左偏 C、右偏 D、极度右偏
答案: B
- 20、心电图 T 波代表: () A、心室快速复极 B、心室缓慢复极 C、心室除极 D、心房复极
答案: A
- 21、I 导联是较深的负向波, III 导联是正向波, 电轴: () A、正常 B、左偏 C、右偏 D、极度右偏
答案: C
- 22、下列属于焦虑和抑郁共有症状的是: () A、惊慌 B、易激惹 C、无助感 D、睡眠障碍
答案: D
- 23、能反映个体思维能力的是: () A、自我概念 B、认知水平 C、情绪与情感 D、压力应对
答案: B
- 24、自我概念的组成中最不稳定, 易受疾病、手术或外伤影响的部分是 () A、身体意象 B、社会认同 C、自我认同 D、自尊
答案: A
- 25、水肿仅发生于眼睑、眶下软组织, 胫骨前及踝部皮下

组织，指压后组织轻度凹陷，平复较快，其水肿程度为：
() A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案：A

26、第一心音减弱可见于：() A、动脉硬化 B、二尖瓣狭窄 C、甲亢 D、二尖瓣关闭不全

答案：D

27、反跳痛表示炎症累及：() A、脏器浆膜层 B、腹壁皮肤 C、腹膜脏层 D、腹膜壁层

答案：D

28、心尖部第一心音增强见于：() A、二尖瓣狭窄 B、二尖瓣关闭不全 C、主动脉瓣关闭不全 D、甲亢

答案：A

29、锥体束损害时最易引出的病理反射是：() A、Gordon征 B、Babinski征 C、Chaddock征 D、Oppenheim征

答案：B

30、肠鸣音亢进见于：() A、急性肠炎 B、机械性肠梗阻 C、腹泻 D、胃肠道大出血

答案：B

31、双侧眼球下陷见于：() A、严重脱水 B、Horner综合征 C、眼部炎症 D、甲状腺功能减退

答案：A

32、确定第一心音最有价值的是：() A、持续时间长 B、心尖部声音最强 C、音调比第二心音低 D、与心尖搏动同时出现

答案：D

33、肺部叩诊呈鼓音，见于：() A、肺空洞 B、肺气肿 C、气胸 D、肺癌

答案：C

34、双侧瞳孔大小不等见于：() A、阿托品药物反应 B、脑疝 C、濒死状态 D、有机磷农药中毒

答案：B

35、脑膜刺激征见于：() A、脑脊液压力增高 B、锥体束受损 C、小脑疾病 D、震颤麻痹

答案：A

36、冷汗见于：() A、结核病 B、虚脱 C、甲状腺功能亢进 D、维生素A缺乏

答案：B

37、肿大的淋巴结常位于颈部，呈多发性，质地较硬，大小不等，可互相粘连，或与周围组织粘连，常见于：() A、淋巴瘤 B、恶性肿瘤淋巴结转移 C、淋巴结结核 D、白血病

答案：C

38、辗转体位见于：() A、心绞痛 B、胆道蛔虫症 C、心、肺功能不全 D、脊椎疾病

答案：B

39、腹部叩诊鼓音范围明显缩小，可见于：() A、胃肠高度胀气 B、胃肠穿孔 C、人工气腹 D、腹腔内大量积液

答案：D

40、严重代谢性酸中毒时的呼吸特征为：() A、呼吸浅快 B、呼吸深快 C、有呼吸暂停现象 D、呼吸急促，有屏气呼吸

答案：B

41、全身组织严重水肿，身体低垂部位皮肤紧张发亮，甚至有液体渗出，可伴有胸腔、腹腔、鞘膜腔积液，外阴部也可有明显水肿，其水肿程度为：() A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案：C

42、无脉主要见于：() A、心包积液 B、严重休克 C、主动脉瓣狭窄 D、室间隔缺损

答案：B

43、强迫坐位见于：() A、心绞痛 B、胆道蛔虫症 C、心、肺功能不全 D、脊椎疾病

答案：C

44、正常人心尖搏动范围为：() A、半径 2-2.5cm B、直径 2-2.5cm C、半径 0.5-1cm D、直径 1-2cm

答案：B

45、肺部叩诊呈浊音或实音多见于：() A、肺气肿 B、肺部大片炎症 C、肺空洞 D、气胸

答案：B

46、双肺闻及干啰音可见于：() A、胸腔积液 B、肺炎 C、气胸 D、支气管哮喘

答案：D

47、板状腹见于：() A、急性弥漫性腹膜炎 B、结核性腹膜炎 C、癌性腹膜炎 D、大量腹水

答案：A

48、左锁骨上淋巴结肿大常见的癌肿转移为：() A、肺癌 B、胃或食管癌 C、乳腺癌 D、肝癌

答案：B

49、正常情况下，叩诊清音见于：() A、肝脏 B、心脏 C、肺 D、腹部

答案：C

50、肠鸣音消失常见于：() A、机械性肠梗阻 B、麻痹性肠梗阻 C、幽门梗阻 D、大量腹水

答案：B

健康评估卷包-017 试卷号: 22840

单选题 1、角色适应不良产生的原因是: () A、角色期望与角色认知有差异 B、角色期望与角色模仿不一致 C、角色表现与角色期望不协调 D、角色表现与角色认知不协调

答案: C

2、下列最能反应家庭成员间的相互关系的是: () A、权利结构 B、家庭角色 C、家庭内部资源 D、沟通类型

答案: D

3、角色冲突是指: () A、角色期望与角色表现差距太大 B、角色期望不明确 C、对角色期望过高或过低 D、角色期望与角色自我能力不匹配

答案: A

4、长期慢性腹泻最易导致: () A、脱水 B、贫血 C、代谢性酸中毒 D、肛周皮肤糜烂

答案: B

5、干性咳嗽常见于的疾病是: () A、胸膜炎 B、肺炎 C、支气管扩张 D、二尖瓣狭窄

答案: A

6、夜间阵发性呼吸困难常见于: () A、急性左心衰竭 B、右心衰竭 C、支气管哮喘 D、糖尿病酮症酸中毒

答案: A

7、出现黑便提示一次上消化道出血量达: () A、10~30ml 以上 B、30~50ml 以上 C、50~70ml 以上 D、70~90ml 以上

答案: C

8、病人处于病理性睡眠状态, 唤醒后能正确回答问题和作出各种反应, 刺激停止后又很快入睡, 称为: () A、意识模糊 B、嗜睡 C、昏睡 D、谵妄

答案: B

9、幽门梗阻所致呕吐的特点为: () A、进餐后即刻发生 B、剧烈呈喷射状 C、多为宿食, 常于夜间发生 D、胃排空后仍干呕不止

答案: C

10、以口腔温度为例, 超高热是指体温在: () A、37.3~38°C B、38.1~39°C C、39.1~40°C D、41°C 以上

答案: D

11、大咯血是指一次咯血量达 300~500ml, 或每日咯血量达: () A、500ml 以上 B、450ml 以上 C、400ml 以上 D、300ml 以上

答案: A

12、因医嘱或因无法避免的肌肉、骨骼不能活动可能导致的“有废用综合征的危险”属: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作

性问题

答案: B

13、患者一般护理记录单的记录频率, 依病情而定, 一般要求二级护理患者至少: () A、每日 1 次 B、每日 2 次 C、每周 1 次 D、每周 2 次

答案: D

14、关于问诊, 下列错误的是: () A、问诊是采集健康史的重要手段 B、问诊一般从主诉开始, 有目的、有序的进行 C、问诊要全面, 危重病人更应详细询问后再处理 D、问诊中应注意与病人的非语言沟通

答案: C

15、下列各项属于客观资料的是: () A、头痛 B、关节酸痛 C、肝脏肿大 D、腹泻

答案: C

16、“潜在并发症: 出血”属于: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题

答案: D

17、关于心电图操作时的病人准备, 错误的是: () A、受检者休息片刻, 取平卧位 B、不必介意检查前病人是否饱餐或吸烟

答案: B

18、所示的心电图可诊断为: () A、房性期前收缩 B、室性期前收缩 C、窦性期前收缩 D、房室交界性期前收缩

答案: B

19、I 导联是较深的负向波, III 导联是正向波, 电轴: () A、正常 B、左偏 C、右偏 D、极度右偏

答案: C

20、正常成人在任一导联中, ST 段压低不能: () A、>0.05 mv B、>0.1 mv C、>0.25 mv D、>0.15 mv

答案: A

21、所示的心电图可诊断为: () A、一度房室传导阻滞 B、二度 I 型房室传导阻滞 C、二度 II 型房室传导阻滞 D、三度房室传导阻滞

答案: A

22、能反映个体思维能力的是: () A、自我概念 B、认知水平 C、情绪与情感 D、压力应对

答案: B

23、心理评估最基本的方法为: () A、会谈 B、观察 C、心理测量学方法 D、医学检测法

答案: A

24、自我概念的组成中最不稳定, 易受疾病、手术或外伤影响的部分是 () A、身体意象 B、社会认同 C、自我认

同 D、自尊

答案：A

25、腹部叩诊鼓音范围明显增大，见于：（）A、肝脏极度肿大 B、脾脏极度肿大 C、胃肠高度胀气 D、腹腔内大量积液

答案：C

26、辗转体位见于：（）A、心绞痛 B、胆道蛔虫症 C、心、肺功能不全 D、脊椎疾病

答案：B

27、板状腹见于：（）A、急性弥漫性腹膜炎 B、结核性腹膜炎 C、癌性腹膜炎 D、大量腹水

答案：A

28、肠鸣音亢进见于：（）A、急性肠炎 B、机械性肠梗阻 C、腹泻 D、胃肠道大出血

答案：B

29、正常人心尖搏动的位置为：（）A、第 6 肋间、左锁骨中线内 1~1.5cm B、第 5 肋间、左锁骨中线内 1~1.5cm C、第 4 肋间、左锁骨中线内 0.5~1cm D、第 5 肋间、左锁骨中线内 0.5~1cm

答案：D

30、上肢平伸时手指细微震颤见于：（）A、肝昏迷 B、甲状腺功能亢进 C、糖尿病酮症酸中毒昏迷 D、震颤性麻痹

答案：B

31、肺部叩诊呈浊音或实音多见于：（）A、肺气肿 B、肺部大片炎症 C、肺空洞 D、气胸

答案：D

32、反跳痛表示炎症累及：（）A、脏器浆膜层 B、腹壁皮肤 C、腹膜脏层 D、腹膜壁层

答案：D

33、胸式呼吸运动减弱而腹式呼吸运动增强见于：（）A、腹膜炎 B、大量腹水 C、妊娠晚期 D、胸腔疾病

答案：D

34、肿大的淋巴结常位于颈部，呈多发性，质地较硬，大小不等，可互相粘连，或与周围组织粘连，常见于：（）A、淋巴瘤 B、恶性肿瘤淋巴结转移 C、淋巴结结核 D、白血病

答案：C

35、肠鸣音活跃见于：（）A、胃肠道大出血 B、机械性肠梗阻 C、便秘 D、急性腹膜炎

答案：A

36、抬举样搏动作为可靠体征，发生的病理改变是：（）A、左室肥大 B、右室肥大 C、右房肥大 D、左房肥大

答案：A

37、第一心音减弱可见于：（）A、动脉硬化 B、二尖瓣狭窄 C、甲亢 D、二尖瓣关闭不全

答案：D

38、双肺闻及干啰音可见于：（）A、胸腔积液 B、肺炎 C、气胸 D、支气管哮喘

答案：D

39、强迫仰卧位见于：（）A、急性腹膜炎 B、胆道蛔虫症 C、心、肺功能不全 D、脊椎疾病

答案：A

40、正常情况下，叩诊清音见于：（）A、肝脏 B、心脏 C、肺 D、腹部

答案：C

41、强迫坐位见于：（）A、心绞痛 B、胆道蛔虫症 C、心、肺功能不全 D、脊椎疾病

答案：C

42、冷汗见于：（）A、结核病 B、虚脱 C、甲状腺功能亢进 D、维生素 A 缺乏

答案：B

43、口唇呈樱桃红色见于：（）A、一氧化碳中毒 B、心功能不全 C、肺功能不全 D、高铁血红蛋白血症

答案：A

44、双侧胸廓扩张受限多见于：（）A、胸膜炎 B、肺气肿 C、肺炎 D、肺不张

答案：B

45、腹式呼吸消失可见于：（）A、腹水 B、急性腹膜炎 C、肠麻痹 D、腹腔内巨大肿块

答案：B

46、膝关节积液的重要体征为：（）A、膝关节红、肿 B、膝关节运动障碍 C、浮髌试验阴性 D、浮髌试验阳性

答案：D

47、双侧眼球下陷见于：（）A、严重脱水 B、Horner 综合征 C、眼部炎症 D、甲状腺功能减退

答案：A

48、多汗见于：（）A、休克 B、脱水 C、甲状腺功能亢进 D、维生素 A 缺乏

答案：C

49、严重代谢性酸中毒时的呼吸特征为：（）A、呼吸浅快 B、呼吸深快 C、有呼吸暂停现象 D、呼吸急促，有屏气呼吸

答案：B

50、下腔静脉阻塞所致的腹壁静脉曲张主要分布于：（）A、腹壁两侧 B、以脐为中心向四周放射 C、下腹部 D、上腹部

答案：A

健康评估卷包-013 试卷号: 22840

单选题 1、角色冲突是指: () A、角色期望与角色表现差距太大 B、角色期望不明确 C、对角色期望过高或过低 D、角色期望与角色自我能力不匹配

答案: A

2、下列最能反应家庭成员间的相互关系的是: () A、权利结构 B、家庭角色 C、家庭内部资源 D、沟通类型

答案: D

3、对个体社会属性的评估的内容应包括: () A、个性、角色、压力、环境 B、情绪情感、角色、家庭、文化 C、角色、文化、家庭、环境 D、文化、语言、家庭、角色

答案: C

4、长期慢性腹泻最易导致: () A、脱水 B、贫血 C、代谢性酸中毒 D、肛周皮肤糜烂

答案: B

5、以口腔温度为例,超高热是指体温在: () A、37.3~38℃ B、38.1~39℃ C、39.1~40℃ D、41℃以上

答案: D

6、浅昏迷与昏睡最有价值的鉴别是: () A、对光反射是否存在 B、排便、排尿是否失禁 C、吞咽反射是否存在 D、病人能否被唤醒

答案: D

7、咯血直接致死的重要原因为: () A、肺部感染 B、窒息 C、肺不张 D、失血性休克

答案: B

8、小儿高热易出现: () A、昏迷 B、消瘦 C、惊厥 D、失水

答案: C

9、夜间阵发性呼吸困难常见于: () A、急性左心衰竭 B、右心衰竭 C、支气管哮喘 D、糖尿病酮症酸中毒

答案: A

10、出现黑便提示一次上消化道出血量达: () A、10~30ml 以上 B、30~50ml 以上 C、50~70ml 以上 D、70~90ml 以上

答案: C

11、中心性发绀主要见于: () A、药物中毒 B、心肺疾病 C、右心衰竭 D、严重休克

答案: C

12、因医嘱或因无法避免的肌肉、骨骼不能活动可能导致的“有废用综合征的危险”属: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题

答案: B

13、因长期卧床皮肤受压导致的“有皮肤完整性受损的危

险”属: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题

答案: B

14、在现存的护理诊断中,导致个体、家庭或社区健康状况改变的因素,称为: () A、定义 B、诊断依据 C、相关因素 D、危险因素

答案: B

15、下列各项属于主观资料的是: () A、肝脏肿大 B、肝功能异常 C、蜘蛛痣 D、恶心想吐

答案: A

16、二部分护理诊断的陈述多用于: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题

答案: C

17、肢导联电极安放的正确方法是自右上肢开始顺时针方向依次为: () A、红、黄、绿、黑 B、黄、绿、黑、红 C、绿、黑、红、黄 D、黑、红、黄、绿

答案: A

18、所示的心电图可诊断为: () A、一度房室传导阻滞 B、二度 I 型房室传导阻滞 C、二度 II 型房室传导阻滞 D、三度房室传导阻滞

答案: A

19、P 波代表: () A、心房除极 B、心房复极 C、心室除极 D、心室复极

答案: A

20、正常心电轴的范围是: () A、0~90° B、0~30° C、30~-90° D、-30~120°

答案: C

21、正常成人在任一导联中,ST 段压低不能: () A、>0.05 mV B、>0.1 mV C、>0.25 mV D、>0.15 mV

答案: A

22、能反映个体思维能力的是: () A、自我概念 B、认知水平 C、情绪与情感 D、压力应对

答案: B

23、下列属于焦虑和抑郁共有症状的是: () A、惊慌 B、易激惹 C、无助感 D、睡眠障碍

答案: D

24、人的基本心理活动为: () A、认知、情感和能力 B、认知、情感和意志 C、知识、情感和意志 D、知识、情感和能力

答案: B

25、双肺闻及干啰音可见于: () A、胸腔积液 B、肺炎 C、气胸 D、支气管哮喘

答案: D

26、全身组织严重水肿,身体低垂部位皮肤紧张发亮,甚至有液体渗出,可伴有胸腔、腹腔、鞘膜腔积液,外阴部也可有明显水肿,其水肿程度为: () A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案: B

27、脑膜刺激征见于: () A、脑脊液压力增高 B、锥体束受损 C、小脑疾病 D、震颤麻痹

答案: A

28、盗汗多见于: () A、结核病 B、虚脱 C、甲状腺功能亢进 D、维生素 A 缺乏

答案: A

29、右锁骨上淋巴结肿大常见的癌肿转移为: () A、肺癌 B、胃或食管癌 C、乳腺癌 D、肝癌

答案: A

30、角膜反射完全消失,见于: () A、深昏迷者 B、浅昏迷者 C、中度昏迷者 D、昏睡者

答案: A

31、正常人心尖搏动的位置为: () A、第 6 肋间、左锁骨中线内 1~1.5cm B、第 5 肋间、左锁骨中线内 1~1.5cm C、第 4 肋间、左锁骨中线内 0.5~1cm D、第 5 肋间、左锁骨中线内 0.5~1cm

答案: B

32、正常情况下,叩诊清音见于: () A、肝脏 B、心脏 C、肺 D、腹部

答案: C

33、大量腹水患者仰卧时,腹部外形呈: () A、球状腹 B、蛙腹 C、舟状腹 D、平坦腹

答案: B

34、叩诊移动性浊音阳性,提示腹腔内游离腹水达: () A、500ml 以上 B、1000ml 以上 C、1500ml 以上 D、2000ml 以上

答案: B

35、口腔内有烂苹果味,见于: () A、有机磷农药中毒 B、糖尿病酮症酸中毒 C、尿毒症 D、肝性昏迷

答案: B

36、呼吸中枢兴奋性极度降低时,出现的呼吸节律改变称为: () A、潮式呼吸 B、深快呼吸 C、间停呼吸 D、叹息样呼吸

答案: C

37、强迫坐位见于: () A、心绞痛 B、胆道蛔虫症 C、心、肺功能不全 D、脊椎疾病

答案: C

38、类风湿性关节炎的手部特征性改变为: () A、爪形手 B、梭形关节 C、杵状指 D、垂腕

答案: C

39、板状腹见于: () A、急性弥漫性腹膜炎 B、结核性腹膜炎 C、癌性腹膜炎 D、大量腹水

答案: C

40、双侧瞳孔大小不等见于: () A、阿托品药物反应 B、脑疝 C、濒死状态 D、有机磷农药中毒

答案: B

41、双侧眼球下陷见于: () A、严重脱水 B、Horner 综合征 C、眼部炎症 D、甲状腺功能减退

答案: A

42、腹式呼吸消失可见于: () A、腹水 B、急性腹膜炎 C、肠麻痹 D、腹腔内巨大肿块

答案: B

43、腹部叩诊鼓音范围明显增大,见于: () A、肝脏极度肿大 B、脾脏极度肿大 C、胃肠高度胀气 D、腹腔内大量积液

答案: C

44、消瘦是指体重低于标准体重的: () A、10% B、20% C、30% D、40%

答案: A

45、双侧胸廓扩张受限多见于: () A、胸膜炎 B、肺气肿 C、肺炎 D、肺不张

答案: B

46、反跳痛表示炎症累及: () A、脏器浆膜层 B、腹壁皮肤 C、腹膜脏层 D、腹膜壁层

答案: D

47、正常情况下,叩诊实音见于: () A、肝脏 B、腹部 C、肺部 D、胃泡区

答案: A

48、不会出现触觉语颤增强的病变是 () A、大叶性肺炎 B、肺栓塞 C、靠近胸壁的肺内巨大空腔 D、大量胸腔积液

答案: B

49、扪及交替脉常提示: () A、右心功能不全 B、主动脉瓣关闭不全 C、左心功能不全 D、缩窄性心包炎

答案: C

50、肺部叩诊呈鼓音,见于: () A、肺空洞 B、肺气肿 C、气胸 D、肺癌

答案: C

健康评估卷包-016 试卷号: 22840

单选题 1、社会评估的目的不包括: () A、评估个体的角色功能 B、评估个体的文化背景 C、评估个体的性格 D、评估个体的家庭

答案: C

2、以下不是家庭内部资源的是: () C、家庭的文化背景、宗教信仰

答案: C

3、对个体社会属性的评估的内容应包括: () A、个性、角色、压力、环境 B、情绪情感、角色、家庭、文化 C、角色、文化、家庭、环境 D、文化、语言、家庭、角色

答案: C

4、长期慢性腹泻最易导致: () A、脱水 B、贫血 C、代谢性酸中毒 D、肛周皮肤糜烂

答案: B

5、小儿高热易出现: () A、昏迷 B、消瘦 C、惊厥 D、失水

答案: C

6、鉴别深昏迷与浅昏迷最有价值的项目是: () A、能否被唤醒 B、深浅反射是否全部消失 C、有否排便、排尿失禁 D、肌肉松弛与否

答案: B

7、出现黑便提示一次上消化道出血量达: () A、10~30ml 以上 B、30~50ml 以上 C、50~70ml 以上 D、70~90ml 以上

答案: C

8、幽门梗阻所致呕吐的特点为: () A、进餐后即刻发生 B、剧烈呈喷射状 C、多为宿食, 常于夜间发生 D、胃排空后仍干呕不止

答案: C

9、干性咳嗽常见于的疾病是: () A、胸膜炎 B、肺炎 C、支气管扩张 D、二尖瓣狭窄

答案: A

10、肾源性水肿的特点为: () A、常伴颈静脉怒张、肝大等体循环淤血表现 B、初为晨起眼睑与颜面水肿 C、水肿发生前常有消瘦、体重减轻 D、以低垂部位显著

答案: B

11、大咯血是指一次咯血量达 300~500ml, 或每日咯血量达: () A、500ml 以上 B、450ml 以上 C、400ml 以上 D、300ml 以上

答案: A

12、患者一般护理记录单的记录频率, 依病情而定, 一般要求三级护理患者至少: () A、每日 1 次 B、每日 2 次

C、每周 1 次 D、每周 2 次

答案: C

13、因长期卧床皮肤受压导致的"有皮肤完整性受损的危险"属: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题

答案: B

14、采集病史过程中, 下列提问不妥的是: () A、你病了多长时间了? B、你感到哪儿不舒服? C、你的粪便发黑吗? D、你一般在什么时候发热?

答案: C

15、下列各项属于客观资料的是: () A、头痛 B、关节酸痛 C、肝脏肿大 D、腹泻

答案: C

16、下列关于护理诊断的描述, 正确的是: () A、用于确定一个具体的疾病 B、用于确定一个具体的病理状态 C、用于判断一个体对健康问题的反应

答案: C

17、所示的心电图可诊断为: () A、一度房室传导阻滞 B、二度 I 型房室传导阻滞 C、二度 II 型房室传导阻滞 D、三度房室传导阻滞

答案: A

18、关于心电图操作时的病人准备, 错误的是: () A、受检者休息片刻, 取平卧位 B、不必介意检查前病人是否饱餐或吸烟

答案: B

19、I 导联是较深的负向波, III 导联是正向波, 电轴: () A、正常 B、左偏 C、右偏 D、极度右偏

答案: C

20、正常成人在任一导联中, ST 段压低不能: () A、>0.05 mV B、>0.1 mV C、>0.25 mV D、>0.15 mV

答案: A

21、正常成人 QRS 时间: () A、<0.06 秒 B、<0.08 秒 C、<0.11 秒 D、<0.14 秒

答案: C

22、自我概念的组成中最不稳定, 易受疾病、手术或外伤影响的部分是 () A、身体意象 B、社会认同 C、自我认同 D、自尊

答案: A

23、下列属于自我概念的分类的是: () A、真实自我、社会自我、表现自我 B、真实自我、期望自我、表现自我 C、真实自我、期望自我、社会自我 D、表现自我、期望自我、社会自我

答案: B

24、下列属于焦虑和抑郁共有症状的是：（）A、惊慌 B、易激惹 C、无助感 D、睡眠障碍

答案：D

25、颈项强直见于：（）A、脑膜炎 B、颈肌外伤 C、先天性颈肌挛缩 D、先天性斜颈

答案：A

26、腹式呼吸消失可见于：（）A、腹水 B、急性腹膜炎 C、肠麻痹 D、腹腔内巨大肿块

答案：B

27、角膜反射完全消失，见于：（）A、深昏迷者 B、浅昏迷者 C、中度昏迷者 D、昏睡者

答案：A

28、叩诊移动性浊音阳性，提示腹腔内游离腹水达：（）A、500ml 以上 B、1000ml 以上 C、1500ml 以上 D、2000ml 以上

答案：B

29、上肢平伸时手指细微震颤见于：（）A、肝昏迷 B、甲状腺功能亢进 C、糖尿病酮症酸中毒昏迷 D、震颤性麻痹

答案：B

30、口腔内有烂苹果味，见于：（）A、有机磷农药中毒 B、糖尿病酮症酸中毒 C、尿毒症 D、肝性昏迷

答案：B

31、正常情况下，叩诊实音见于：（）A、肝脏 B、腹部 C、肺部 D、胃泡区

答案：A

32、肺部叩诊呈浊音或实音多见于：（）A、肺气肿 B、肺部大片炎症 C、肺空洞 D、气胸

答案：B

33、脑膜刺激征见于：（）A、脑脊液压力增高 B、锥体束受损 C、小脑疾病 D、震颤麻痹

答案：A

34、消瘦是指体重低于标准体重的：（）A、10%B、20%C、30%D、40%

答案：A

35、正常情况下，叩诊清音见于：（）A、肝脏 B、心脏 C、肺 D、腹部

答案：C

36、不会出现触觉语颤增强的病变是（）A、大叶性肺炎 B、肺栓塞 C、靠近胸壁的肺内巨大空腔 D、大量胸腔积液

答案：D

37、左锁骨上淋巴结肿大常见的癌肿转移为：（）A、肺

癌 B、胃或食管癌 C、乳腺癌 D、肝癌

答案：B

38、确定第一心音最有价值的是：（）A、持续时间长 B、心尖部声音最强 C、音调比第二心音低 D、与心尖搏动同时出现

答案：D

39、下列最易出现触觉语颤增强的是：（）A、肺组织实变 B、肺泡含气量增多 C、皮下气肿 D、大量胸水

答案：A

40、正常情况下，叩诊鼓音见于：（）A、肝脏 B、腹部 C、肺部 D、心脏

答案：B

41、类风湿性关节炎的手部特征性改变为：（）A、爪形手 B、梭形关节 C、杵状指 D、垂腕

答案：B

42、腹部叩诊鼓音范围明显缩小，可见于：（）A、胃肠高度胀气 B、胃肠穿孔 C、人工气腹 D、腹腔内大量积液

答案：D

43、颈静脉怒张提示：（）A、静脉压增高 B、静脉压降低 C、脉压增宽 D、脉压变窄

答案：A

44、双侧瞳孔大小不等见于：（）A、阿托品药物反应 B、脑疝 C、濒死状态 D、有机磷农药中毒

答案：B

45、双侧瞳孔散大伴对光反射消失见于：（）A、有机磷农药中毒 B、阿托品药物反应 C、毒蕈中毒 D、濒死状态

答案：D

46、肥胖是指体重超过标准体重的：（）A、10%B、20%C、30%D、40%

答案：B

47、爪形手可见于：（）A、类风湿性关节炎 B、正中神经损伤 C、尺神经损伤 D、痛风

答案：C

48、触及奇脉常提示：（）A、右心衰 B、主动脉瓣关闭不全 C、缩窄性心包炎 D、左心衰

答案：C

49、锥体束损害时最易引出的病理反射是：（）A、Gordon 征 B、Babinski 征 C、Chaddock 征 D、Oppenheim 征

答案：B

50、无脉主要见于：（）A、心包积液 B、严重休克 C、主动脉瓣狭窄 D、室间隔缺损

答案：B

健康评估卷包-015 试卷号: 22840

单选题 1、社会评估的目的不包括: () A、评估个体的角色功能 B、评估个体的文化背景 C、评估个体的性格 D、评估个体的家庭

答案: C

2、以下不是家庭内部资源的是: () C、家庭的文化背景、宗教信仰

答案: C

3、对个体社会属性的评估的内容应包括: () A、个性、角色、压力、环境 B、情绪情感、角色、家庭、文化 C、角色、文化、家庭、环境 D、文化、语言、家庭、角色

答案: C

4、长期慢性腹泻最易导致: () A、脱水 B、贫血 C、代谢性酸中毒 D、肛周皮肤糜烂

答案: B

5、周围性发绀的特点为: () A、除四肢及颜面外,亦可见于舌、口腔粘膜和躯干皮肤

答案: B

6、大咯血是指一次咯血量达 300~500ml,或每日咯血量达: () A、500ml 以上 B、450ml 以上 C、400ml 以上 D、300ml 以上

答案: A

7、肾源性水肿的特点为: () A、常伴颈静脉怒张、肝大等体循环淤血表现 B、初为晨起眼睑与颜面水肿 C、水肿发生前常有消瘦、体重减轻 D、以低垂部位显著

答案: B

8、心源性水肿的特点为: () A、首先出现在身体下垂部位 B、初为眼睑与颜面水肿 C、以腹水为主要表现 D、以口唇、眼睑及下肢胫前较明显,呈非凹陷性

答案: A

9、出现黑便提示一次上消化道出血量达: () A、10~30ml 以上 B、30~50ml 以上 C、50~70ml 以上 D、70~90ml 以上

答案: C

10、下列不是中枢性呕吐特点的是: () A、多无恶心先兆 B、剧烈呈喷射状 C、吐后不感轻松 D、与头部位置改变有关

答案: D

11、夜间阵发性呼吸困难常见于: () A、急性左心衰竭 B、右心衰竭 C、支气管哮喘 D、糖尿病酮症酸中毒

答案: A

12、患者一般护理记录单的记录频率,依病情而定,一般要求一级护理患者至少: () A、每日 1 次 B、每日 2 次

C、每周 1 次 D、每周 2 次

答案: C

13、因长期卧床皮肤受压导致的"有皮肤完整性受损的危险"属: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题

答案: B

14、关于问诊,下列错误的是: () A、问诊是采集健康史的重要手段 B、问诊一般从主诉开始,有目的、有序的进行 C、问诊要全面,危重病人更应详细询问后再处理 D、问诊中应注意与病人的非语言沟通

答案: C

15、下列各项属于客观资料的是: () A、头痛 B、关节酸痛 C、肝脏肿大 D、腹泻

答案: C

16、二部分护理诊断的陈述多用于: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题

答案: C

17、关于心电图操作时的病人准备,错误的是: () A、受检者休息片刻,取平卧位 B、不必介意检查前病人是否饱餐或吸烟

答案: B

18、I 导联是正向波,III 导联是较深的负向波,电轴: () A、正常 B、左偏 C、右偏 D、极度右偏

答案: B

19、所示的心电图可诊断为: () A、房性期前收缩 B、室性期前收缩 C、窦性期前收缩 D、房室交界性期前收缩

答案: B

20、肢导联电极安放的正确方法是自右上肢开始顺时针方向依次为: () A、红、黄、绿、黑 B、黄、绿、黑、红 C、绿、黑、红、黄 D、黑、红、黄、绿

答案: A

21、QRS 波群代表: () A、心房除极 B、心室除极 C、心室复极快速期 D、心室复极缓慢期

答案: B

22、自我概念的组成中最不稳定,易受疾病、手术或外伤影响的部分是 () A、身体意象 B、社会认同 C、自我认同 D、自尊

答案: A

23、人的基本心理活动为: () A、认知、情感和能力 B、认知、情感和意志 C、知识、情感和意志 D、知识、情感和能力

答案: B

24、能反映个体思维能力的是: () A、自我概念 B、认知水平 C、情绪与情感 D、压力应对

答案: B

25、口唇呈樱桃红色见于: () A、一氧化碳中毒 B、心功能不全 C、肺功能不全 D、高铁血红蛋白血症

答案: A

26、双侧瞳孔散大伴对光反射消失见于: () A、有机磷农药中毒 B、阿托品药物反应 C、毒蕈中毒 D、濒死状态

答案: D

27、腹式呼吸消失可见于: () A、腹水 B、急性腹膜炎 C、肠麻痹 D、腹腔内巨大肿块

答案: B

28、肺部叩诊呈鼓音, 见于: () A、肺空洞 B、肺气肿 C、气胸 D、肺癌

答案: C

29、叩诊移动性浊音阳性, 提示腹腔内游离腹水达: () A、500ml 以上 B、1000ml 以上 C、1500ml 以上 D、2000ml 以上

答案: B

30、双肺闻及干啰音可见于: () A、胸腔积液 B、肺炎 C、气胸 D、支气管哮喘

答案: D

31、扪及交替脉常提示: () A、右心功能不全 B、主动脉瓣关闭不全 C、左心功能不全 D、缩窄性心包炎

答案: C

32、类风湿性关节炎的手部特征性改变为: () A、爪形手 B、梭形关节 C、杵状指 D、垂腕

答案: B

33、右锁骨上淋巴结肿大常见的癌肿转移为: () A、肺癌 B、胃或食管癌 C、乳腺癌 D、肝癌

答案: A

34、反跳痛表示炎症累及: () A、脏器浆膜层 B、腹壁皮肤 C、腹膜脏层 D、腹膜壁层

答案: D

35、肠鸣音活跃见于: () A、胃肠道大出血 B、机械性肠梗阻 C、便秘 D、急性腹膜炎

答案: A

36、消瘦是指体重低于标准体重的: () A、10% B、20% C、30% D、40%

答案: A

37、脑膜刺激征见于: () A、脑脊液压力增高 B、锥体束受损 C、小脑疾病 D、震颤麻痹

答案: A

38、颈静脉怒张提示: () A、静脉压增高 B、静脉压降低 C、脉压增宽 D、脉压变窄

答案: A

39、触及奇脉常提示: () A、右心衰 B、主动脉瓣关闭不全 C、缩窄性心包炎 D、左心衰

答案: C

40、腹部叩诊鼓音范围明显缩小, 可见于: () A、胃肠高度胀气 B、胃肠穿孔 C、人工气腹 D、腹腔内大量积液

答案: D

41、全身组织严重水肿, 身体低垂部位皮肤紧张发亮, 甚至有液体渗出, 可伴有胸腔、腹腔、鞘膜腔积液, 外阴部也可有明显水肿, 其水肿程度为: () A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案: C

42、心尖部第一心音增强见于: () A、二尖瓣狭窄 B、二尖瓣关闭不全 C、主动脉瓣关闭不全 D、甲亢

答案: A

43、冷汗见于: () A、结核病 B、虚脱 C、甲状腺功能亢进 D、维生素 A 缺乏

答案: B

44、肠鸣音亢进见于: () A、急性肠炎 B、机械性肠梗阻 C、腹泻 D、胃肠道大出血

答案: B

45、体格检查时触诊肌肉坚实, 被动运动阻力增加, 为: () A、肌张力增强 B、肌张力减弱 C、肌力增强 D、肌力减弱

答案: A

46、严重代谢性酸中毒时的呼吸特征为: () A、呼吸浅快 B、呼吸深快 C、有呼吸暂停现象 D、呼吸急促, 有屏气呼吸

答案: B

47、水肿仅发生于眼睑、眶下软组织, 胫骨前及踝部皮下组织, 指压后组织轻度凹陷, 平复较快, 其水肿程度为: () A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水

答案: A

48、盗汗多见于: () A、结核病 B、虚脱 C、甲状腺功能亢进 D、维生素 A 缺乏

答案: A

49、抬举样搏动作为可靠体征, 发生的病理改变是: () A、左室肥大 B、右室肥大 C、右房肥大 D、左房肥大

答案: A

50、Murphy 征阳性见于: () A、急性肝炎 B、急性阑尾炎 C、急性胆囊炎 D、急性腹膜炎

答案: C

健康评估卷包-018 试卷号：22840

- 单选题 1、下列最能反应家庭成员间的相互关系的是：（）
A、权利结构 B、家庭角色 C、家庭内部资源 D、沟通类型
答案：D
- 2、角色冲突是指：（）
A、角色期望与角色表现差距太大
B、角色期望不明确 C、对角色期望过高或过低 D、角色期望与角色自我能力不匹配
答案：A
- 3、角色适应不良产生的原因是：（）
A、角色期望与角色认知有差异 B、角色期望与角色模仿不一致 C、角色表现与角色期望不协调 D、角色表现与角色认知不协调
答案：C
- 4、渗出性腹泻的特点为：（）
A、水样 B、排便量每日大于1000ml C、无脓血与粘液 D、多伴腹痛与发热
答案：D
- 5、中等量以上咯血者咯血前的先兆症状为：（）
A、喉痒、烦躁不安、发绀 B、喉痒、胸闷、咳嗽 C、喉痒、咳嗽、呛咳 D、胸闷、咳嗽、发绀
答案：B
- 6、咯血直接致死的重要原因为：（）
A、肺部感染 B、窒息 C、肺不张 D、失血性休克
答案：B
- 7、幽门梗阻所致呕吐的特点为：（）
A、进餐后即刻发生 B、剧烈呈喷射状 C、多为宿食，常于夜间发生 D、胃排空后仍于呕不止
答案：C
- 8、导致呕血最常见的胃及十二指肠原因是：（）
A、消化性溃疡 B、胃底静脉曲张破裂 C、急性胃粘膜病变 D、胃癌
答案：A
- 9、肝源性水肿的特点为：（）
A、水肿与体位有明显的关系 B、于直立或劳累后出现，休息后减轻或消失 C、以腹水为主要表现 D、指压凹陷不明显
答案：C
- 10、夜间阵发性呼吸困难常见于：（）
A、急性左心衰竭 B、右心衰竭 C、支气管哮喘 D、糖尿病酮症酸中毒
答案：A
- 11、严重吸气性呼吸困难的特征为：（）
A、端坐呼吸 B、鼻翼煽动 C、“三凹症” D、哮鸣音
答案：C
- 12、患者一般护理记录单的记录频率，依病情而定，一般要求一级护理患者至少：（）
A、每日1次 B、每日2次 C、每周1次 D、每周2次
答案：A
- 13、因长期卧床皮肤受压导致的“有皮肤完整性受损的危险”属：（）
A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题
答案：B
- 14、下列各项属于客观资料的是：（）
A、头痛 B、关节酸痛 C、肝脏肿大 D、腹泻
答案：C
- 15、“潜在并发症：出血”属于：（）
A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题
答案：D
- 16、采集病史过程中，下列提问不妥的是：（）
A、你病了多长时间了？ B、你感到哪儿不舒服？ C、你的粪便发黑吗？ D、你一般在什么时候发热？
答案：C
- 17、关于心电图操作时的病人准备，错误的是：（）
A、受检者休息片刻，取平卧位 B、不必介意检查前病人是否饱餐或吸烟
答案：B
- 18、关于心电图操作的环境要求，错误的是：（）
A、温暖 B、床的宽度不宜过窄 C、使用直流电源的心电图机必须接地线 D、心电图机旁不要摆放其他电器用具
答案：C
- 19、正常成人QRS时间：（）
A、<0.06秒 B、<0.08秒 C、<0.11秒 D、<0.14秒
答案：C
- 20、正常P波时间：（）
A、<0.04秒 B、<0.08秒 C、<0.10秒 D、<0.12秒
答案：D
- 21、肢导联电极安放的正确方法是自右上肢开始顺时针方向依次为：（）
A、红、黄、绿、黑 B、黄、绿、黑、红 C、绿、黑、红、黄 D、黑、红、黄、绿
答案：A
- 22、自我概念的组成中最不稳定，易受疾病、手术或外伤影响的部分是（）
A、身体意象 B、社会认同 C、自我认同 D、自尊
答案：A
- 23、心理评估最基本的方法为：（）
A、会谈 B、观察 C、心理测量学方法 D、医学检测法
答案：A
- 24、人的基本心理活动为：（）
A、认知、情感和能力 B、认知、情感和意志 C、知识、情感和意志 D、知识、情感和能力

答案: B

25、第一心音减弱可见于: () A、动脉硬化 B、二尖瓣狭窄 C、甲亢 D、二尖瓣关闭不全

答案: D

26、双侧瞳孔大小不等见于: () A、阿托品药物反应 B、脑疝 C、濒死状态 D、有机磷农药中毒

答案: B

27、水肿仅发生于眼睑、眶下软组织,胫骨前及踝部皮下组织,指压后组织轻度凹陷,平复较快,其水肿程度为: () A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案: A

28、角膜反射完全消失,见于: () A、深昏迷者 B、浅昏迷者 C、中度昏迷者 D、昏睡者

答案: A

29、左锁骨上淋巴结肿大常见的癌肿转移为: () A、肺癌 B、胃或食管癌 C、乳腺癌 D、肝癌

答案: B

30、上肢扑翼样震颤见于: () A、肝昏迷 B、甲状腺功能亢进 C、糖尿病酮症酸中毒昏迷 D、震颤性麻痹

答案: A

31、心尖部第一心音增强见于: () A、二尖瓣狭窄 B、二尖瓣关闭不全 C、主动脉瓣关闭不全 D、甲亢

答案: A

32、腹部叩诊鼓音范围明显增大,见于: () A、肝脏极度肿大 B、脾脏极度肿大 C、胃肠高度胀气 D、腹腔内大量积液

答案: C

33、下列最易出现触觉语颤增强的是: () A、肺组织实变 B、肺泡含气量增多 C、皮下气肿 D、大量胸水

答案: A

34、膝关节腔积液的重要体征为: () A、膝关节红、肿 B、膝关节运动障碍 C、浮髌试验阴性 D、浮髌试验阳性

答案: D

35、冷汗见于: () A、结核病 B、虚脱 C、甲状腺功能亢进 D、维生素 A 缺乏

答案: B

36、类风湿性关节炎的手部特征性改变为: () A、爪形手 B、梭形关节 C、杵状指 D、垂腕

答案: B

37、肠鸣音亢进见于: () A、急性肠炎 B、机械性肠梗阻 C、腹泻 D、胃肠道大出血

答案: B

38、正常情况下,叩诊实音见于: () A、肝脏 B、腹部 C、肺部 D、胃泡区

答案: A

39、呼吸中枢兴奋性极度降低时,出现的呼吸节律改变称为: () A、潮式呼吸 B、深快呼吸 C、间停呼吸 D、叹息样呼吸

答案: C

40、口腔内有烂苹果味,见于: () A、有机磷农药中毒 B、糖尿病酮症酸中毒 C、尿毒症 D、肝性昏迷

答案: B

41、腹部叩诊鼓音范围明显缩小,可见于: () A、胃肠高度胀气 B、胃肠穿孔 C、人工气腹 D、腹腔内大量积液

答案: D

42、消瘦是指体重低于标准体重的: () A、10% B、20% C、30% D、40%

答案: A

43、板状腹见于: () A、急性弥漫性腹膜炎 B、结核性腹膜炎 C、癌性腹膜炎 D、大量腹水

答案: A

44、确定第一心音最有价值的是: () A、持续时间长 B、心尖部声音最强 C、音调比第二心音低 D、与心尖搏动同时出现

答案: D

45、锥体束损害时最易引出的病理反射是: () A、Gordon 征 B、Babinski 征 C、Chaddock 征 D、Oppenheim 征

答案: B

46、抬举样搏动作为可靠体征,发生的病理改变是: () A、左室肥大 B、右室肥大 C、右房肥大 D、左房肥大

答案: A

47、腹式呼吸消失可见于: () A、腹水 B、急性腹膜炎 C、肠麻痹 D、腹腔内巨大肿块

答案: B

48、双侧眼球下陷见于: () A、严重脱水 B、Horner 综合征 C、眼部炎症 D、甲状腺功能减退

答案: A

49、胸式呼吸运动减弱而腹式呼吸运动增强见于: () A、腹膜炎 B、大量腹水 C、妊娠晚期 D、胸腔疾病

答案: D

50、肥胖是指体重超过标准体重的: () A、10% B、20% C、30% D、40%

答案: B

健康评估卷包-002 试卷号: 22840

单选题 1、角色适应不良产生的原因是: () A、角色期望与角色认知有差异 B、角色期望与角色模仿不一致 C、角色表现与角色期望不协调 D、角色表现与角色认知不协调

答案: C

2、角色冲突是指: () A、角色期望与角色表现差距太大 B、角色期望不明确 C、对角色期望过高或过低 D、角色期望与角色自我能力不匹配

答案: A

3、以下不是家庭内部资源的是: () C、家庭的文化背景、宗教信仰

答案: C

4、分泌性腹泻的特点为: () A、腹泻量大呈水样 B、多有黏液与脓血 C、与进食有关 D、常伴里急后重

答案: A

5、肝源性水肿的特点为: () A、水肿与体位有明显的关系 B、于直立或劳累后出现, 休息后减轻或消失 C、以腹水为主要表现 D、指压凹陷不明显

答案: C

6、中等量以上咯血者咯血前的先兆症状为: () A、喉痒、烦躁不安、发绀 B、喉痒、胸闷、咳嗽 C、喉痒、咳嗽、呛咳 D、胸闷、咳嗽、发绀

答案: B

7、咯血直接致死的重要原因为: () A、肺部感染 B、窒息 C、肺不张 D、失血性休克

答案: B

8、鉴别深昏迷与浅昏迷最有价值的项目是: () A、能否被唤醒 B、深浅反射是否全部消失 C、有否排便、排尿失禁 D、肌肉松弛与否

答案: B

9、严重吸人性呼吸困难的特征为: () A、端坐呼吸 B、鼻翼煽动 C、“三凹症” D、哮鸣音

答案: C

10、呼气性呼吸困难常见于: () A、喉痉挛 B、胸腔积液 C、气管异物 D、支气管哮喘

答案: D

11、出现黑便提示一次上消化道出血量达: () A、10~30ml 以上 B、30~50ml 以上 C、50~70ml 以上 D、70~90ml 以上

答案: C

12、患者一般护理记录单的记录频率, 依病情而定, 一般要求三级护理患者至少: () A、每日 1 次 B、每日 2 次 C、每周 1 次 D、每周 2 次

答案: C

13、患者一般护理记录单的记录频率, 依病情而定, 一般要求二级护理患者至少: () A、每日 1 次 B、每日 2 次 C、每周 1 次 D、每周 2 次

答案: D

14、下列各项属于主观资料的是: () A、肝脏肿大 B、肝功能异常 C、蜘蛛痣 D、恶心

答案: D

15、在有危险的护理诊断中, 导致个体、家庭和社区健康状况改变发生可能性增加的因素, 称为: () A、定义 B、诊断依据 C、相关因素 D、危险因素

答案: C

16、关于问诊, 下列错误的是: () A、问诊是采集健康史的重要手段 B、问诊一般从主诉开始, 有目的、有序的进行 C、问诊要全面, 危重病人更应详细询问后再处理 D、问诊中应注意与病人的非语言沟通

答案: C

17、正常心电图的范围是: () A、 $0\sim 90^\circ$ B、 $0\sim 30^\circ$ C、 $30\sim -90^\circ$ D、 $-30\sim 120^\circ$

答案: C

18、所示的心电图可诊断为: () A、房性期前收缩 B、室性期前收缩 C、窦性期前收缩 D、房室交界性期前收缩

答案: B

19、正常成人在任一导联中, ST 段压低不能: () A、 >0.05 mV B、 >0.1 mV C、 >0.25 mV D、 >0.15 mV

答案: A

20、I 导联是较深的负向波, III 导联是正向波, 电轴: () A、正常 B、左偏 C、右偏 D、极度右偏

答案: C

21、所示的心电图可诊断为: () A、一度房室传导阻滞 B、二度 I 型房室传导阻滞 C、二度 II 型房室传导阻滞 D、三度房室传导阻滞

答案: A

22、下列属于焦虑和抑郁共有症状的是: () A、惊慌 B、易激惹 C、无助感 D、睡眠障碍

答案: D

23、自我概念的组成中最不稳定, 易受疾病、手术或外伤影响的部分是 () A、身体意象 B、社会认同 C、自我认同 D、自尊

答案: A

24、下列属于自我概念的分类的是: () A、真实自我、社会自我、表现自我 B、真实自我、期望自我、表现自我 C、真实自我、期望自我、社会自我 D、表现自我、期望

自我、社会自我

答案: B

25、第一心音减弱可见于: () A、动脉硬化 B、二尖瓣狭窄 C、甲亢 D、二尖瓣关闭不全

答案: D

26、肺部叩诊呈鼓音, 见于: () A、肺空洞 B、肺气肿 C、气胸 D、肺癌

答案: C

27、强迫仰卧位见于: () A、急性腹膜炎 B、胆道蛔虫症 C、心、肺功能不全 D、脊椎疾病

答案: A

28、确定第一心音最有价值的是: () A、持续时间长 B、心尖部声音最强 C、音调比第二心音低 D、与心尖搏动同时出现

答案: D

29、右锁骨上淋巴结肿大常见的癌肿转移为: () A、肺癌 B、胃或食管癌 C、乳腺癌 D、肝癌

答案: A

30、双侧胸廓扩张受限多见于: () A、胸膜炎 B、肺气肿 C、肺炎 D、肺不张

答案: B

31、肠鸣音亢进见于: () A、急性肠炎 B、机械性肠梗阻 C、腹泻 D、胃肠道大出血

答案: B

32、上肢扑翼样震颤见于: () A、肝昏迷 B、甲状腺功能亢进 C、糖尿病酮症酸中毒昏迷 D、震颤性麻痹

答案: B

33、消瘦是指体重低于标准体重的: () A、10% B、20% C、30% D、40%

答案: A

34、正常情况下, 叩诊清音见于: () A、肝脏 B、心脏 C、肺 D、腹部

答案: C

35、强迫坐位见于: () A、心绞痛 B、胆道蛔虫症 C、心、肺功能不全 D、脊椎疾病

答案: C

36、双肺闻及干啰音可见于: () A、胸腔积液 B、肺炎 C、气胸 D、支气管哮喘

答案: D

37、心尖部第一心音增强见于: () A、二尖瓣狭窄 B、二尖瓣关闭不全 C、主动脉瓣关闭不全 D、甲亢

答案: A

38、脑膜刺激征见于: () A、脑脊液压力增高 B、锥体束受损 C、小脑疾病 D、震颤麻痹

答案: A

39、腹部叩诊鼓音范围明显缩小, 可见于: () A、胃肠高度胀气 B、胃肠穿孔 C、人工气腹 D、腹腔内大量积液

答案: D

40、锥体束损害时最易引出的病理反射是: () A、Gordon征 B、Babinski征 C、Chaddock征 D、Oppenheim征

答案: B

41、Murphy征阳性见于: () A、急性肝炎 B、急性阑尾炎 C、急性胆囊炎 D、急性腹膜炎

答案: C

42、反跳痛表示炎症累及: () A、脏器浆膜层 B、腹壁皮肤 C、腹膜脏层 D、腹膜壁层

答案: D

43、全身软组织均可见明显水肿, 指压后出现较深的凹陷, 平复缓慢, 其水肿程度为: () A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案: B

44、腹式呼吸消失可见于: () A、腹水 B、急性腹膜炎 C、肠麻痹 D、腹腔内巨大肿块

答案: B

45、下列最易出现触觉语颤增强的是: () A、肺组织实变 B、肺泡含气量增多 C、皮下气肿 D、大量胸水

答案: A

46、冷汗见于: () A、结核病 B、虚脱 C、甲状腺功能亢进 D、维生素A缺乏

答案: B

47、肠鸣音活跃见于: () A、胃肠道大出血 B、机械性肠梗阻 C、便秘 D、急性腹膜炎

答案: A

48、双侧瞳孔散大伴对光反射消失见于: () A、有机磷农药中毒 B、阿托品药物反应 C、毒蕈中毒 D、濒死状态

答案: D

49、大量腹水患者仰卧时, 腹部外形呈: () A、球状腹 B、蛙腹 C、舟状腹 D、平坦腹

答案: B

50、颈静脉怒张提示: () A、静脉压增高 B、静脉压降低 C、脉压增高 D、脉压变窄

答案: A

健康评估卷包-004 试卷号: 22840

- 单选题 1、社会评估的目的不包括: () A、评估个体的角色功能 B、评估个体的文化背景 C、评估个体的性格 D、评估个体的家庭
答案: C
- 2、角色冲突是指: () A、角色期望与角色表现差距太大 B、角色期望不明确 C、对角色期望过高或过低 D、角色期望与角色自我能力不匹配
答案: A
- 3、角色适应不良产生的原因是: () A、角色期望与角色认知有差异 B、角色期望与角色模仿不一致 C、角色表现与角色期望不协调 D、角色表现与角色认知不协调
答案: C
- 4、分泌性腹泻的特点为: () A、腹泻量大呈水样 B、多有黏液与脓血 C、与进食有关 D、常伴里急后重
答案: A
- 5、以口腔温度为例, 超高热是指体温在: () A、37.3~38℃ B、38.1~39℃ C、39.1~40℃ D、41℃以上
答案: D
- 6、呼气性呼吸困难常见于: () A、喉痉挛 B、胸腔积液 C、气管异物 D、支气管哮喘
答案: D
- 7、病人处于病理性睡眠状态, 唤醒后能正确回答问题和作出各种反应, 刺激停止后又很快入睡, 称为: () A、意识模糊 B、嗜睡 C、昏睡 D、谵妄
答案: B
- 8、鉴别深昏迷与浅昏迷最有价值的项目是: () A、能否被唤醒 B、深浅反射是否全部消失 C、有否排便、排尿失禁 D、肌肉松弛与否
答案: B
- 9、肝源性水肿的特点为: () A、水肿与体位有明显的关系 B、于直立或劳累后出现, 休息后减轻或消失 C、以腹水为主要表现 D、指压凹陷不明显
答案: C
- 10、严重吸气性呼吸困难的特征为: () A、端坐呼吸 B、鼻翼煽动 C、“三凹症” D、哮鸣音
答案: C
- 11、咳粉红色泡沫样痰见于: () A、支气管扩张 B、大叶性肺炎 C、肺水肿 D、肺梗死
答案: C
- 12、患者一般护理记录单的记录频率, 依病情而定, 一般要求二级护理患者至少: () A、每日 1 次 B、每日 2 次 C、每周 1 次 D、每周 2 次
答案: D
- 13、因长期卧床皮肤受压导致的“有皮肤完整性受损的危险”属: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题
答案: B
- 14、下列各项属于主观资料的是: () A、肝脏肿大 B、肝功能异常 C、蜘蛛痣 D、恶心
答案: D
- 15、三部分护理诊断的陈述多用于: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题
答案: A
- 16、采集病史过程中, 下列提问不妥的是: () A、你病了多长时间了? B、你感到哪儿不舒服? C、你的粪便发黑吗? D、你一般在什么时候发热?
答案: C
- 17、关于心电图操作时的病人准备, 错误的是: () A、受检者休息片刻, 取平卧位 B、不必介意检查前病人是否饱餐或吸烟
答案: B
- 18、所示的心电图可诊断为: () A、房性期前收缩 B、室性期前收缩 C、窦性期前收缩 D、房室交界性期前收缩
答案: B
- 19、正常 P 波时间: () A、<0.04 秒 B、<0.08 秒 C、<0.10 秒 D、<0.12 秒
答案: D
- 20、正常心电轴的范围是: () A、0~90° B、0~30° C、30~-90° D、-30~120°
答案: D
- 21、正常成人在任一导联中, ST 段压低不能: () A、>0.05 mv B、>0.1 mv C、>0.25 mv D、>0.15 mv
答案: A
- 22、下列属于自我概念的分类的是: () A、真实自我、社会自我、表现自我 B、真实自我、期望自我、表现自我
答案: B
- 23、能反映个体思维能力的是: () A、自我概念 B、认知水平 C、情绪与情感 D、压力应对
答案: B
- 24、人的基本心理活动为: () A、认知、情感和能力 B、认知、情感和意志 C、知识、情感和意志 D、知识、情感和能力
答案: B
- 25、全身软组织均可见明显水肿, 指压后出现较深的凹陷, 平复缓慢, 其水肿程度为: () A、轻度水肿 B、中度水

肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案: B

26、肺部叩诊呈过清音见于: () A、肺气肿 B、肺部大片炎症 C、肺空洞 D、气胸

答案: B

27、双肺闻及干啰音可见于: () A、胸腔积液 B、肺炎 C、气胸 D、支气管哮喘

答案: D

28、肠鸣音消失常见于: () A、机械性肠梗阻 B、麻痹性肠梗阻 C、幽门梗阻 D、大量腹水

答案: B

29、水肿仅发生于眼睑、眶下软组织,胫骨前及踝部皮下组织,指压后组织轻度凹陷,平复较快,其水肿程度为:

() A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案: A

30、盗汗多见于: () A、结核病 B、虚脱 C、甲状腺功能亢进 D、维生素 A 缺乏

答案: A

31、反跳痛表示炎症累及: () A、脏器浆膜层 B、腹壁皮肤 C、腹膜脏层 D、腹膜壁层

答案: D

32、腹部叩诊鼓音范围明显缩小,可见于: () A、胃肠高度胀气 B、胃肠穿孔 C、人工气腹 D、腹腔内大量积液

答案: D

33、锥体束损害时最易引出的病理反射是: () A、Gordon 征 B、Babinski 征 C、Chaddock 征 D、Oppenheim 征

答案: B

34、上肢平伸时手指细微震颤见于: () A、肝昏迷 B、甲状腺功能亢进 C、糖尿病酮症酸中毒昏迷 D、震颤性麻痹

答案: B

35、口唇呈樱桃红色见于: () A、一氧化碳中毒 B、心功能不全 C、肺功能不全 D、高铁血红蛋白血症

答案: A

36、肺部叩诊呈鼓音,见于: () A、肺空洞 B、肺气肿 C、气胸 D、肺癌

答案: C

37、严重代谢性酸中毒时的呼吸特征为: () A、呼吸浅快 B、呼吸深快 C、有呼吸暂停现象 D、呼吸急促,有屏气呼吸

答案: B

38、提示下呼吸道部分阻塞、痉挛或狭窄的呼吸音是 () A、肺泡呼吸音增强 B、肺泡呼吸音消失 C、呼气音延长 D、

支气管呼吸音

答案: C

39、全身组织严重水肿,身体低垂部位皮肤紧张发亮,甚至有液体渗出,可伴有胸腔、腹腔、鞘膜腔积液,外阴部也可有明显水肿,其水肿程度为: () A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案: C

40、肿大的淋巴结常位于颈部,呈多发性,质地较硬,大小不等,可互相粘连,或与周围组织粘连,常见于: () A、淋巴瘤 B、恶性肿瘤淋巴结转移 C、淋巴结结核

答案: C

41、多汗见于: () A、休克 B、脱水 C、甲状腺功能亢进 D、维生素 A 缺乏

答案: C

42、正常人心尖搏动的位置为: () A、第 6 肋间、左锁骨中线内 1~1.5cm B、第 5 肋间、左锁骨中线内 1~1.5cm C、第 4 肋间、左锁骨中线内 0.5~1cm D、第 5 肋间、左锁骨中线内 0.5~1cm

答案: D

43、爪形手可见于: () A、类风湿性关节炎 B、正中神经损伤 C、尺神经损伤 D、痛风

答案: C

44、第一心音减弱可见于: () A、动脉硬化 B、二尖瓣狭窄 C、甲亢 D、二尖瓣关闭不全

答案: D

45、右锁骨上淋巴结肿大常见的癌肿转移为: () A、肺癌 B、胃或食管癌 C、乳腺癌 D、肝癌

答案: A

46、下腔静脉阻塞所致的腹壁静脉曲张主要分布于: () A、腹壁两侧 B、以脐为中心向四周放射 C、下腹部

答案: A

47、确定第一心音最有价值的是: () A、持续时间长 B、心尖部声音最强 C、音调比第二心音低 D、与心尖搏动同时出现

答案: D

48、无脉主要见于: () A、心包积液 B、严重休克 C、主动脉瓣狭窄 D、室间隔缺损

答案: B

49、正常人心尖搏动范围为: () A、半径 2-2.5cm B、直径 2-2.5cm C、半径 0.5-1cm D、直径 1-2cm

答案: B

50、腹式呼吸消失可见于: () A、腹水 B、急性腹膜炎 C、肠麻痹 D、腹腔内巨大肿块

答案: B

健康评估卷包-010 试卷号: 22840

单选题 1、以下不是家庭内部资源的是: () C、家庭的文化背景、宗教信仰

答案: C

2、下列最能反应家庭成员间的相互关系的是: () A、权利结构 B、家庭角色 C、家庭内部资源 D、沟通类型

答案: D

3、对个体社会属性的评估的内容应包括: () A、个性、角色、压力、环境 B、情绪情感、角色、家庭、文化 C、角色、文化、家庭、环境 D、文化、语言、家庭、角色

答案: C

4、渗出性腹泻的特点为: () A、水样 B、排便量每日大于 1000ml C、无脓血与粘液 D、多伴腹痛与发热

答案: D

5、呕血提示胃内积血量达: () A、150~200ml B、250~300ml C、350~400ml D、450~500ml

答案: B

6、下列不是中枢性呕吐特点的是: () A、多无恶心先兆 B、剧烈呈喷射状 C、吐后不感轻松 D、与头部位置改变有关

答案: D

7、咯血直接致死的重要原因为: () A、肺部感染 B、窒息 C、肺不张 D、失血性休克

答案: B

8、浅昏迷与昏睡最有价值的鉴别是: () A、对光反射是否存在 B、排便、排尿是否失禁 C、吞咽反射是否存在 D、病人能否被唤醒

答案: D

9、幽门梗阻所致呕吐的特点为: () A、进餐后即刻发生 B、剧烈呈喷射状 C、多为宿食, 常于夜间发生 D、胃排空后仍干呕不止

答案: C

10、干性咳嗽常见于的疾病是: () A、胸膜炎 B、肺炎 C、支气管扩张 D、二尖瓣狭窄

答案: A

11、心源性水肿的特点为: () A、首先出现在身体下垂部位 B、初为眼睑与颜面水肿 C、以腹水为主要表现 D、以口唇、眼睑及下肢胫前较明显, 呈非凹陷性

答案: A

12、下列关于护理诊断“清理呼吸道无效”的相关因素的描述, 错误的是: () A、清理呼吸道无效: 与腹部手术后切口疼痛有关 B、清理呼吸道无效: 与痰液粘稠有关 C、清理呼吸道无效: 与无力咳嗽有关 D、清理呼吸道无效: 与肺气肿伴上呼吸道感染有关

答案: D

13、患者一般护理记录单的记录频率, 依病情而定, 一般要求一级护理患者至少: () A、每日 1 次 B、每日 2 次 C、每周 1 次 D、每周 2 次

答案: A

14、一部分护理诊断的陈述多用于: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题

答案: C

15、三部分护理诊断的陈述多用于: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题

答案: A

16、下列关于一上消化道出血伴柏油样便病人的护理诊断的陈述, 正确的是: () A、上消化道出血: 与消化性溃疡有关 B、排便异常: 柏油样便: 与进食不规则所致消化性溃疡有关 C、上消化道出血: 柏油样便: 与进食不规则所致消化性溃疡有关 D、排便异常: 与消化性溃疡有关

答案: C

17、P 波代表: () A、心房除极 B、心房复极 C、心室除极 D、心室复极

答案: A

18、I 导联是正向波, III 导联是较深的负向波, 电轴: () A、正常 B、左偏 C、右偏 D、极度右偏

答案: B

19、关于心电图操作的环境要求, 错误的是: () A、温暖 B、床的宽度不宜过窄 C、使用直流电源的心电图机必须接地线 D、心电图机旁不要摆放其他电器用具

答案: C

20、QRS 波群代表: () A、心房除极 B、心室除极 C、心室复极快速期 D、心室复极缓慢期

答案: B

21、正常成人 QRS 时间: () A、<0.06 秒 B、<0.08 秒 C、<0.11 秒 D、<0.14 秒

答案: C

22、自我概念的组成中最不稳定, 易受疾病、手术或外伤影响的部分是 () A、身体意象 B、社会认同 C、自我认同 D、自尊

答案: A

23、下列属于自我概念的分类的是: () A、真实自我、社会自我、表现自我 B、真实自我、期望自我、表现自我 C、真实自我、期望自我、社会自我 D、表现自我、期望自我、社会自我

答案: B

24、下列属于焦虑和抑郁共有症状的是: () A、惊慌 B、易激惹 C、无助感 D、睡眠障碍

答案: D

25、肿大的淋巴结常位于颈部,呈多发性,质地较硬,大小不等,可互相粘连,或与周围组织粘连,常见于: () A、淋巴瘤 B、恶性肿瘤淋巴结转移 C、淋巴结结核

答案: C

26、触及奇脉常提示: () A、右心衰 B、主动脉瓣关闭不全 C、缩窄性心包炎 D、左心衰

答案: C

27、双侧瞳孔散大伴对光反射消失见于: () A、有机磷农药中毒 B、阿托品药物反应 C、毒蕈中毒 D、濒死状态

答案: D

28、Murphy 征阳性见于: () A、急性肝炎 B、急性阑尾炎 C、急性胆囊炎 D、急性腹膜炎

答案: C

29、肥胖是指体重超过标准体重的: () A、10%B、20%C、30%D、40%

答案: B

30、正常人心尖搏动范围为: () A、半径 2-2.5cmB、直径 2-2.5cmC、半径 0.5-1cmD、直径 1-2cm

答案: B

31、下腔静脉阻塞所致的腹壁静脉曲张主要分布于: () A、腹壁两侧 B、以脐为中心向四周放射 C、下腹部

答案: A

32、肠鸣音消失常见于: () A、机械性肠梗阻 B、麻痹性肠梗阻 C、幽门梗阻 D、大量腹水

答案: B

33、双肺闻及干啰音可见于: () A、胸腔积液 B、肺炎 C、气胸 D、支气管哮喘

答案: D

34、正常情况下,叩诊鼓音见于: () A、肝脏 B、腹部 C、肺脏 D、心脏

答案: B

35、水肿仅发生于眼睑、眶下软组织,胫骨前及踝部皮下组织,指压后组织轻度凹陷,平复较快,其水肿程度为: () A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿

答案: A

36、不会出现触觉语颤增强的病变是 () A、大叶性肺炎 B、肺栓塞 C、靠近胸壁的肺内巨大空腔 D、大量胸腔积液

答案: D

37、叩诊移动性浊音阳性,提示腹腔内游离腹水达: ()

A、500ml 以上 B、1000ml 以上 C、1500ml 以上 D、2000ml 以上

答案: B

38、肠鸣音亢进见于: () A、急性肠炎 B、机械性肠梗阻 C、腹泻 D、胃肠道大出血

答案: B

39、锥体束损害时最易引出的病理反射是: () A、Gordon 征 B、Babinski 征 C、Chaddock 征 D、Oppenheim 征

答案: B

40、腹部叩诊鼓音范围明显缩小,可见于: () A、胃肠高度胀气 B、胃肠穿孔 C、人工气腹 D、腹腔内大量积液

答案: D

41、双侧眼球下陷见于: () A、严重脱水 B、Horner 综合征 C、眼部炎症 D、甲状腺功能减退

答案: A

42、严重代谢性酸中毒时的呼吸特征为: () A、呼吸浅快 B、呼吸深快 C、有呼吸暂停现象 D、呼吸急促

答案: B

43、心尖部第一心音增强见于: () A、二尖瓣狭窄 B、二尖瓣关闭不全 C、主动脉瓣关闭不全 D、甲亢

答案: A

44、冷汗见于: () A、结核病 B、虚脱 C、甲状腺功能亢进 D、维生素 A 缺乏

答案: B

45、第一心音减弱可见于: () A、动脉硬化 B、二尖瓣狭窄 C、甲亢 D、二尖瓣关闭不全

答案: D

46、口唇呈樱桃红色见于: () A、一氧化碳中毒 B、心功能不全 C、肺功能不全 D、高铁血红蛋白血症

答案: A

47、反跳痛表示炎症累及: () A、脏器浆膜层 B、腹壁皮肤 C、腹膜脏层 D、腹膜壁层

答案: D

48、上肢平伸时手指细微震颤见于: () A、肝昏迷 B、甲状腺功能亢进 C、糖尿病酮症酸中毒昏迷 D、震颤性麻痹

答案: B

49、全身组织严重水肿,身体低垂部位皮肤紧张发亮,甚至有液体渗出,可伴有胸腔、腹腔、鞘膜腔积液,外阴部也可有明显水肿,其水肿程度为: () A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案: C

50、颈静脉怒张提示: () A、静脉压增高 B、静脉压降低 C、脉压增宽 D、脉压变窄

答案: A

健康评估卷包-001 试卷号: 22840

- 单选题 1、对个体社会属性的评估的内容应包括: () A、个性、角色、压力、环境 B、情绪情感、角色、家庭、文化 C、角色、文化、家庭、环境 D、文化、语言、家庭、角色
答案: C
- 2、社会评估的目的不包括: () A、评估个体的角色功能 B、评估个体的文化背景 C、评估个体的性格 D、评估个体的家庭
答案: C
- 3、以下不是家庭内部资源的是: () C、家庭的文化背景、宗教信仰
答案: C
- 4、长期慢性腹泻最易导致: () A、脱水 B、贫血 C、代谢性酸中毒 D、肛周皮肤糜烂
答案: B
- 5、中等量以上咯血者咯血前的先兆症状为: () A、喉痒、烦躁不安、发绀 B、喉痒、胸闷、咳嗽 C、喉痒、咳嗽、呛咳 D、胸闷、咳嗽、发绀
答案: B
- 6、呼气性呼吸困难常见于: () A、喉痉挛 B、胸腔积液 C、气管异物 D、支气管哮喘
答案: D
- 7、导致呕血最常见的胃及十二指肠原因是: () A、消化性溃疡 B、胃底静脉曲张破裂 C、急性胃粘膜病变 D、胃癌
答案: A
- 8、引起发热最多见的原因: () A、感染性发热 B、免疫反应所致发热 C、吸收热 D、自主神经功能紊乱所致发热
答案: A
- 9、周围性发绀的特点为: () A、除四肢及颜面外,亦可见于舌、口腔粘膜和躯干皮肤
答案: C
- 10、肾源性水肿的特点为: () A、常伴颈静脉怒张、肝大等体循环淤血表现 B、初为晨起眼睑与颜面水肿 C、水肿发生前常有消瘦、体重减轻 D、以低垂部位显著
答案: B
- 11、幽门梗阻所致呕吐的特点为: () A、餐后即刻发生 B、剧烈呈喷射状 C、多为宿食,常于夜间发生 D、胃排空后仍干呕不止
答案: C
- 12、患者一般护理记录表的记录频率,依病情而定,一般要求一级护理患者至少: () A、每日 1 次 B、每日 2 次 C、每周 1 次 D、每周 2 次
答案: A
- 13、患者一般护理记录表的记录频率,依病情而定,一般要求三级护理患者至少: () A、每日 1 次 B、每日 2 次 C、每周 1 次 D、每周 2 次
答案: C
- 14、下列各项属于主观资料的是: () A、肝脏肿大 B、肝功能异常 C、蜘蛛痣 D、恶心
答案: D
- 15、“潜在并发症:出血”属于: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题
答案: D
- 16、下列各项属于客观资料的是: () A、头痛 B、关节酸痛 C、肝脏肿大 D、腹泻
答案: C
- 17、I 导联是正向波, III 导联是较深的负向波,电轴: () A、正常 B、左偏 C、右偏 D、极度右偏
答案: B
- 18、所示的心电图可诊断为: () A、一度房室传导阻滞 B、二度 I 型房室传导阻滞 C、二度 II 型房室传导阻滞 D、三度房室传导阻滞
答案: A
- 19、关于心电图操作的环境要求,错误的是: () A、温暖 B、床的宽度不宜过窄 C、使用直流电源的心电图机必须接地线 D、心电图机旁不要摆放其他电器用具
答案: C
- 20、I 导联是较深的负向波, III 导联是正向波,电轴: () A、正常 B、左偏 C、右偏 D、极度右偏
答案: C
- 21、正常心电轴的范围是: () A、 $0^{\circ}\sim 90^{\circ}$ B、 $0^{\circ}\sim 30^{\circ}$ C、 $30^{\circ}\sim -90^{\circ}$ D、 $-30^{\circ}\sim 120^{\circ}$
答案: A
- 22、人的基本心理活动为: () A、认知、情感和能力 B、认知、情感和意志 C、知识、情感和意志 D、知识、情感和能力
答案: B
- 23、能反映个体思维能力的是: () A、自我概念 B、认知水平 C、情绪与情感 D、压力应对
答案: B
- 24、自我概念的组成中最不稳定,易受疾病、手术或外伤影响的部分是 () A、身体意象 B、社会认同 C、自我认同 D、自尊

答案：A

25、肥胖是指体重超过标准体重的：（）A、10%B、20%C、30%D、40%

答案：B

26、强迫坐位见于：（）A、心绞痛 B、胆道蛔虫症 C、心、肺功能不全 D、脊椎疾病

答案：C

27、腹部叩诊鼓音范围明显增大，见于：（）A、肝脏极度肿大 B、脾脏极度肿大 C、胃肠高度胀气 D、腹腔内大量积液

答案：C

28、严重代谢性酸中毒时的呼吸特征为：（）A、呼吸浅快 B、呼吸深快 C、有呼吸暂停现象 D、呼吸急促，有屏气呼吸

答案：B

29、口唇呈樱桃红色见于：（）A、一氧化碳中毒 B、心功能不全 C、肺功能不全 D、高铁血红蛋白血症

答案：A

30、抬举样搏动作为可靠体征，发生的病理改变是：（）A、左室肥大 B、右室肥大 C、右房肥大 D、左房肥大

答案：A

31、正常情况下，叩诊鼓音见于：（）A、肝脏 B、腹部 C、肺脏 D、心脏

答案：B

32、大量腹水患者仰卧时，腹部外形呈：（）A、球状腹 B、蛙腹 C、舟状腹 D、平坦腹

答案：B

33、呼吸中枢兴奋性极度降低时，出现的呼吸节律改变称为：（）A、潮式呼吸 B、深快呼吸 C、间停呼吸 D、叹息样呼吸

答案：C

34、正常情况下，叩诊清音见于：（）A、肝脏 B、心脏 C、肺 D、腹部

答案：C

35、正常人心尖搏动范围为：（）A、半径 2-2.5cm B、直径 2-2.5cm C、半径 0.5-1cm D、直径 1-2cm

答案：B

36、脑膜刺激征见于：（）A、脑脊液压力增高 B、锥体束受损 C、小脑疾病 D、震颤麻痹

答案：A

37、肠鸣音活跃见于：（）A、胃肠道大出血 B、机械性肠梗阻 C、便秘 D、急性腹膜炎

答案：A

38、双侧胸廓扩张受限多见于：（）A、胸膜炎 B、肺气

肿 C、肺炎 D、肺不张

答案：B

39、角膜反射完全消失，见于：（）A、深昏迷者 B、浅昏迷者 C、中度昏迷者 D、昏睡者

答案：A

40、全身软组织均可见明显水肿，指压后出现较深的凹陷，平复缓慢，其水肿程度为：（）A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案：B

41、全身组织严重水肿，身体低垂部位皮肤紧张发亮，甚至有液体渗出，可伴有胸腔、腹腔、鞘膜腔积液，外阴部也可有明显水肿，其水肿程度为：（）A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案：C

42、爪形手可见于：（）A、类风湿性关节炎 B、正中神经损伤 C、尺神经损伤 D、痛风

答案：C

43、正常人心尖搏动的位置为：（）A、第 6 肋间、左锁骨中线内 1~1.5cm B、第 5 肋间、左锁骨中线内 1~1.5cm C、第 4 肋间、左锁骨中线内 0.5~1cm D、第 5 肋间、左锁骨中线内 0.5~1cm

答案：D

44、颈项强直见于：（）A、脑膜炎 B、颈肌外伤 C、先天性颈肌挛缩 D、先天性斜颈

答案：A

45、双肺闻及干啰音可见于：（）A、胸腔积液 B、肺炎 C、气胸 D、支气管哮喘

答案：D

46、双侧瞳孔散大伴对光反射消失见于：（）A、有机磷农药中毒 B、阿托品药物反应 C、毒蕈中毒 D、濒死状态

答案：D

47、肺部叩诊呈过清音见于：（）A、肺气肿 B、肺部大片炎症 C、肺空洞 D、气胸

答案：A

48、口腔内有烂苹果味，见于：（）A、有机磷农药中毒 B、糖尿病酮症酸中毒 C、尿毒症 D、肝性昏迷

答案：B

49、强迫仰卧位见于：（）A、急性腹膜炎 B、胆道蛔虫症 C、心、肺功能不全 D、脊椎疾病

答案：A

50、辗转体位见于：（）A、心绞痛 B、胆道蛔虫症 C、心、肺功能不全 D、脊椎疾病

答案：B

健康评估卷包-007 试卷号: 22840

单选题 1、以下不是家庭内部资源的是: () C、家庭的文化背景、宗教信仰

答案: C

2、下列最能反应家庭成员间的相互关系的是: () A、权利结构 B、家庭角色 C、家庭内部资源 D、沟通类型

答案: D

3、对个体社会属性的评估的内容应包括: () A、个性、角色、压力、环境 B、情绪情感、角色、家庭、文化 C、角色、文化、家庭、环境 D、文化、语言、家庭、角色

答案: C

4、渗出性腹泻的特点为: () A、水样 B、排便量每日大于 1000ml C、无脓血与粘液 D、多伴腹痛与发热

答案: D

5、呕血提示胃内积血量达: () A、150~200ml B、250~300ml C、350~400ml D、450~500ml

答案: B

6、下列不是中枢性呕吐特点的是: () A、多无恶心先兆 B、剧烈呈喷射状 C、吐后不感轻松 D、与头部位置改变有关

答案: D

7、咯血直接致死的重要原因为: () A、肺部感染 B、窒息 C、肺不张 D、失血性休克

答案: B

8、浅昏迷与昏睡最有价值的鉴别是: () A、对光反射是否存在 B、排便、排尿是否失禁 C、吞咽反射是否存在 D、病人能否被唤醒

答案: D

9、幽门梗阻所致呕吐的特点为: () A、进餐后即刻发生 B、剧烈呈喷射状 C、多为宿食, 常于夜间发生 D、胃排空后仍干呕不止

答案: C

10、干性咳嗽常见于的疾病是: () A、胸膜炎 B、肺炎 C、支气管扩张 D、二尖瓣狭窄

答案: A

11、心源性水肿的特点为: () A、首先出现在身体下垂部位 B、初为眼睑与颜面水肿 C、以腹水为主要表现 D、以口唇、眼睑及下肢胫前较明显, 呈非凹陷性

答案: A

12、下列关于护理诊断“清理呼吸道无效”的相关因素的描述, 错误的是: () A、清理呼吸道无效: 与腹部手术后切口疼痛有关 B、清理呼吸道无效: 与痰液粘稠有关 C、清理呼吸道无效: 与无力咳嗽有关 D、清理呼吸道无效: 与肺气肿伴上呼吸道感染有关

答案: D

13、患者一般护理记录单的记录频率, 依病情而定, 一般要求一级护理患者至少: () A、每日 1 次 B、每日 2 次 C、每周 1 次 D、每周 2 次

答案: A

14、一部分护理诊断的陈述多用于: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题

答案: C

15、三部分护理诊断的陈述多用于: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作性问题

答案: A

16、下列关于一上消化道出血伴柏油样便病人的护理诊断的陈述, 正确的是: () A、上消化道出血: 与消化性溃疡有关 B、排便异常: 柏油样便: 与进食不规则所致消化性溃疡有关 C、上消化道出血: 柏油样便: 与进食不规则所致消化性溃疡有关 D、排便异常: 与消化性溃疡有关

答案: B

17、P 波代表: () A、心房除极 B、心房复极 C、心室除极 D、心室复极

答案: A

18、I 导联是正向波, III 导联是较深的负向波, 电轴: () A、正常 B、左偏 C、右偏 D、极度右偏

答案: B

19、关于心电图操作的环境要求, 错误的是: () A、温暖 B、床的宽度不宜过窄 C、使用直流电源的心电图机必须接地线 D、心电图机旁不要摆放其他电器用具

答案: C

20、QRS 波群代表: () A、心房除极 B、心室除极 C、心室复极快速期 D、心室复极缓慢期

答案: B

21、正常成人 QRS 时间: () A、<0.06 秒 B、<0.08 秒 C、<0.11 秒 D、<0.14 秒

答案: C

22、自我概念的组成中最不稳定, 易受疾病、手术或外伤影响的部分是 () A、身体意象 B、社会认同 C、自我认同 D、自尊

答案: A

23、下列属于自我概念的分类的是: () A、真实自我、社会自我、表现自我 B、真实自我、期望自我、表现自我 C、真实自我、期望自我、社会自我 D、表现自我、期望自我、社会自我

答案: B

24、下列属于焦虑和抑郁共有症状的是: () A、惊慌 B、易激惹 C、无助感 D、睡眠障碍

答案: D

25、肿大的淋巴结常位于颈部,呈多发性,质地较硬,大小不等,可互相粘连,或与周围组织粘连,常见于: () A、淋巴瘤 B、恶性肿瘤淋巴结转移 C、淋巴结结核

答案: C

26、触及奇脉常提示: () A、右心衰 B、主动脉瓣关闭不全 C、缩窄性心包炎 D、左心衰

答案: C

27、双侧瞳孔散大伴对光反射消失见于: () A、有机磷农药中毒 B、阿托品药物反应 C、毒蕈中毒 D、濒死状态

答案: D

28、Murphy 征阳性见于: () A、急性肝炎 B、急性阑尾炎 C、急性胆囊炎 D、急性腹膜炎

答案: C

29、肥胖是指体重超过标准体重的: () A、10%B、20%C、30%D、40%

答案: B

30、正常人心尖搏动范围为: () A、半径 2-2.5cm B、直径 2-2.5cm C、半径 0.5-1cm D、直径 1-2cm

答案: B

31、下腔静脉阻塞所致的腹壁静脉曲张主要分布于: () A、腹壁两侧 B、以脐为中心向四周放射 C、下腹部 D、上腹部

答案: A

32、肠鸣音消失常见于: () A、机械性肠梗阻 B、麻痹性肠梗阻 C、幽门梗阻 D、大量腹水

答案: B

33、双肺闻及干啰音可见于: () A、胸腔积液 B、肺炎 C、气胸 D、支气管哮喘

答案: D

34、正常情况下,叩诊鼓音见于: () A、肝脏 B、腹

答案: B

35、水肿仅发生于眼睑、眶下软组织,胫骨前及踝部皮下组织,指压后组织轻度凹陷,平复较快,其水肿程度为:

() A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水

答案: A

36、不会出现触觉语颤增强的病变是 () A、大叶性肺炎 B、肺栓塞 C、靠近胸壁的肺内巨大空腔 D、大量胸腔积液

答案: D

37、叩诊移动性浊音阳性,提示腹腔内游离腹水达: ()

A、500ml 以上 B、1000ml 以上 C、1500ml 以上 D、2000ml 以上

答案: B

38、肠鸣音亢进见于: () A、急性肠炎 B、机械性肠梗阻 C、腹泻 D、胃肠道大出血

答案: B

39、锥体束损害时最易引出的病理反射是: () A、Gordon 征 B、Babinski 征 C、Chaddock 征 D、Oppenheim 征

答案: B

40、腹部叩诊鼓音范围明显缩小,可见于: () A、胃肠高度胀气 B、胃肠穿孔 C、人工气腹 D、腹腔内大量积液

答案: D

41、双侧眼球下陷见于: () A、严重脱水 B、Horner 综合征 C、眼部炎症 D、甲状腺功能减退

答案: A

42、严重代谢性酸中毒时的呼吸特征为: () A、呼吸浅快 B、呼吸深快 C、有呼吸暂停现象 D、呼吸急促

答案: B

43、心尖部第一心音增强见于: () A、二尖瓣狭窄 B、二尖瓣关闭不全 C、主动脉瓣关闭不全 D、甲亢

答案: A

44、冷汗见于: () A、结核病 B、虚脱 C、甲状腺功能亢进 D、维生素 A 缺乏

答案: B

45、第一心音减弱可见于: () A、动脉硬化 B、二尖瓣狭窄 C、甲亢 D、二尖瓣关闭不全

答案: D

46、口唇呈樱桃红色见于: () A、一氧化碳中毒 B、心功能不全 C、肺功能不全 D、高铁血红蛋白血症

答案: A

47、反跳痛表示炎症累及: () A、脏器浆膜层 B、腹壁皮肤 C、腹膜脏层 D、腹膜壁层

答案: D

48、上肢平伸时手指细微震颤见于: () A、肝昏迷 B、甲状腺功能亢进 C、糖尿病酮症酸中毒昏迷 D、震颤性

答案: B

49、全身组织严重水肿,身体低垂部位皮肤紧张发亮,甚至有液体渗出,可伴有胸腔、腹腔、鞘膜腔积液,外阴部也可有明显水肿,其水肿程度为: () A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案: C

50、颈静脉怒张提示: () A、静脉压增高 B、静脉压降低 C、脉压增高 D、脉压变窄

答案: A

健康评估卷包-011 试卷号: 22840

单选题 1、角色适应不良产生的原因是: () A、角色期望与角色认知有差异 B、角色期望与角色模仿不一致 C、角色表现与角色期望不协调 D、角色表现与角色认知不协调

答案: C

2、对个体社会属性的评估的内容应包括: () A、个性、角色、压力、环境 B、情绪情感、角色、家庭、文化 C、角色、文化、家庭、环境 D、文化、语言、家庭、角色

答案: 无

3、以下不是家庭内部资源的是: () C、家庭的文化背景、宗教信仰

答案: C

4、分泌性腹泻的特点为: () A、腹泻量大呈水样 B、多有黏液与脓血 C、与进食有关 D、常伴里急后重

答案: A

5、呕血提示胃内积血量达: () A、150~200ml B、250~300ml C、350~400ml D、450~500ml

答案: B

6、鉴别深昏迷与浅昏迷最有价值的项目是: () A、能否被唤醒 B、深浅反射是否全部消失 C、有否排便、排尿失禁 D、肌肉松弛与否

答案: B

7、夜间阵发性呼吸困难常见于: () A、急性左心衰竭 B、右心衰竭 C、支气管哮喘 D、糖尿病酮症酸中毒

答案: A

8、以口腔温度为例,超高热是指体温在: () A、37.3~38℃ B、38.1~39℃ C、39.1~40℃ D、41℃以上

答案: D

9、肾源性水肿的特点为: () A、常伴颈静脉怒张、肝大等体循环淤血表现 B、初为晨起眼睑与颜面水肿 C、水肿发生前常有消瘦、体重减轻 D、以低垂部位显著

答案: B

10、严重吸气性呼吸困难的特征为: () A、端坐呼吸 B、鼻翼煽动 C、“三凹症” D、哮鸣音

答案: C

11、导致呕血最常见的胃及十二指肠原因是: () A、消化性溃疡 B、胃底静脉曲张破裂 C、急性胃粘膜病变 D、胃癌

答案: A

12、患者一般护理记录单的记录频率,依病情而定,一般要求一级护理患者至少: () A、每日1次 B、每日2次 C、每周1次 D、每周2次

答案: A

13、患者一般护理记录单的记录频率,依病情而定,一般

要求三级护理患者至少: () A、每日1次 B、每日2次 C、每周1次 D、每周2次

答案: C

14、在现存的护理诊断中,导致个体、家庭或社区健康状况改变的因素,称为: () A、定义 B、诊断依据 C、相关因素 D、危险因素

答案: 无

15、下列各项属于客观资料的是: () A、头痛 B、关节酸痛 C、肝脏肿大 D、腹泻

答案: C

16、下列各项属于主观资料的是: () A、肝脏肿大 B、肝功能异常 C、蜘蛛痣 D、恶心

答案: A

17、I导联是正向波,III导联是较深的负向波,电轴: () A、正常 B、左偏 C、右偏 D、极度右偏

答案: B

18、P波代表: () A、心房除极 B、心房复极 C、心室除极 D、心室复极

答案: A

19、所示的心电图可诊断为: () A、房性期前收缩 B、室性期前收缩 C、窦性期前收缩 D、房室交界性期前收缩

答案: B

20、I导联是较深的负向波,III导联是正向波,电轴: () A、正常 B、左偏 C、右偏 D、极度右偏

答案: C

21、肢导联电极安放的正确方法是自右上肢开始顺时针方向依次为: () A、红、黄、绿、黑 B、黄、绿、黑、红 C、绿、黑、红、黄 D、黑、红、黄、绿

答案: A

22、下列属于自我概念的分类的是: () A、真实自我、社会自我、表现自我 B、真实自我、期望自我、表现自我 C、真实自我、期望自我、社会自我 D、表现自我、期望自我、社会自我

答案: B

23、心理评估最基本的方法为: () A、会谈 B、观察 C、心理测量学方法 D、医学检测法

答案: A

24、下列属于焦虑和抑郁共有症状的是: () A、惊慌 B、易激惹 C、无助感 D、睡眠障碍

答案: D

25、颈静脉怒张提示: () A、静脉压增高 B、静脉压降低 C、脉压增宽 D、脉压变窄

答案: A

26、脑膜刺激征见于：（）A、脑脊液压力增高 B、锥体束受损 C、小脑疾病 D、震颤麻痹

答案：A

27、下腔静脉阻塞所致的腹壁静脉曲张主要分布于：（）A、腹壁两侧 B、以脐为中心向四周放射 C、下腹部 D、上腹部

答案：A

28、肠鸣音亢进见于：（）A、急性肠炎 B、机械性肠梗阻 C、腹泻 D、胃肠道大出血

答案：B

29、触及奇脉常提示：（）A、右心衰 B、主动脉瓣关闭不全 C、缩窄性心包炎 D、左心衰

答案：C

30、肿大的淋巴结常位于颈部，呈多发性，质地较硬，大小不等，可互相粘连，或与周围组织粘连，常见于：（）A、淋巴瘤 B、恶性肿瘤淋巴结转移 C、淋巴结结核 D、白血病

答案：C

31、辗转体位见于：（）A、心绞痛 B、胆道蛔虫症 C、心、肺功能不全 D、脊椎疾病

答案：B

32、提示下呼吸道部分阻塞、痉挛或狭窄的呼吸音是（）A、肺泡呼吸音增强 B、肺泡呼吸音消失 C、呼气音延长 D、支气管呼吸音

答案：无

33、心尖部第一心音增强见于：（）A、二尖瓣狭窄 B、二尖瓣关闭不全 C、主动脉瓣关闭不全 D、甲亢

答案：A

34、板状腹见于：（）A、急性弥漫性腹膜炎 B、结核性腹膜炎 C、癌性腹膜炎 D、大量腹水

答案：A

35、角膜反射完全消失，见于：（）A、深昏迷者 B、浅昏迷者 C、中度昏迷者 D、昏睡者

答案：A

36、腹部叩诊鼓音范围明显缩小，可见于：（）A、胃肠高度胀气 B、胃肠穿孔 C、人工气腹 D、腹腔内大量积液

答案：D

37、肺部叩诊呈浊音或实音多见于：（）A、肺气肿 B、肺部大片炎症 C、肺空洞 D、气胸

答案：B

38、盗汗多见于：（）A、结核病 B、虚脱 C、甲状腺功能亢进 D、维生素 A 缺乏

答案：A

39、全身软组织均可见明显水肿，指压后出现较深的凹陷，

平复缓慢，其水肿程度为：（）A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案：B

40、全身组织严重水肿，身体低垂部位皮肤紧张发亮，甚至有液体渗出，可伴有胸腔、腹腔、鞘膜腔积液，外阴部也可有明显水肿，其水肿程度为：（）A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案：C

41、叩诊移动性浊音阳性，提示腹腔内游离腹水达：（）A、500ml 以上 B、1000ml 以上 C、1500ml 以上 D、2000ml 以上

答案：B

42、双侧瞳孔散大伴对光反射消失见于：（）A、有机磷农药中毒 B、阿托品药物反应 C、毒蕈中毒 D、濒死状态

答案：D

43、扪及交替脉常提示：（）A、右心功能不全 B、主动脉瓣关闭不全 C、左心功能不全 D、缩窄性心包炎

答案：C

44、确定第一心音最有价值的是：（）A、持续时间长 B、心尖部声音最强 C、音调比第二心音低 D、与心尖搏动同时出现

答案：D

45、上肢平伸时手指细微震颤见于：（）A、肝昏迷 B、甲状腺功能亢进 C、糖尿病酮症酸中毒昏迷 D、震颤性麻痹

答案：B

46、腹部叩诊鼓音范围明显增大，见于：（）A、肝脏极度肿大 B、脾脏极度肿大 C、胃肠高度胀气 D、腹腔内大量积液

答案：C

47、锥体束损害时最易引出的病理反射是：（）A、Gordon 征 B、Babinski 征 C、Chaddock 征 D、Oppenheim 征

答案：B

48、不会出现触觉语颤增强的病变是（）A、大叶性肺炎 B、肺栓塞 C、靠近胸壁的肺内巨大空腔 D、大量胸腔积液

答案：D

49、口腔内有烂苹果味，见于：（）A、有机磷农药中毒 B、糖尿病酮症酸中毒 C、尿毒症 D、肝性昏迷

答案：B

50、正常人心尖搏动的位置为：（）A、第 6 肋间、左锁骨中线内 1~1.5cm B、第 5 肋间、左锁骨中线内 1~1.5cm C、第 4 肋间、左锁骨中线内 0.5~1cm D、第 5 肋间、左锁骨中线内 0.5~1cm

答案：D

健康评估卷包-014 试卷号: 22840

- 单选题 1、对个体社会属性的评估的内容应包括: () A、个性、角色、压力、环境 B、情绪情感、角色、家庭、文化 C、角色、文化、家庭、环境 D、文化、语言、家庭
答案: C
- 2、下列最能反应家庭成员间的相互关系的是: () A、权利结构 B、家庭角色 C、家庭内部资源 D、沟通类型
答案: D
- 3、社会评估的目的不包括: () A、评估个体的角色功能 B、评估个体的文化背景 C、评估个体的性格 D、评估个体的家庭
答案: C
- 4、长期慢性腹泻最易导致: () A、脱水 B、贫血 C、代谢性酸中毒 D、肛周皮肤糜烂
答案: B
- 5、肝源性水肿的特点为: () A、水肿与体位有明显的关系 B、于直立或劳累后出现, 休息后减轻或消失 C、以腹水为主要表现 D、指压凹陷不明显
答案: C
- 6、咳粉红色泡沫样痰见于: () A、支气管扩张 B、大叶性肺炎 C、肺水肿 D、肺梗死
答案: C
- 7、夜间阵发性呼吸困难常见于: () A、急性左心衰竭 B、右心衰竭 C、支气管哮喘 D、糖尿病酮症酸中毒
答案: A
- 8、呕血提示胃内积血量达: () A、150~200ml B、250~300ml C、350~400ml D、450~500ml
答案: B
- 9、呼气性呼吸困难常见于: () A、喉痉挛 B、胸腔积液 C、气管异物 D、支气管哮喘
答案: D
- 10、肾源性水肿的特点为: () A、常伴颈静脉怒张、肝大等体循环淤血表现 B、初为晨起眼睑与颜面水肿 C、水肿发生前常有消瘦、体重减轻 D、以低垂部位显著
答案: B
- 11、引起发热最常见的原因: () A、感染性发热 B、免疫反应所致发热 C、吸收热 D、自主神经功能紊乱所致发热
答案: A
- 12、患者一般护理记录单的记录频率, 依病情而定, 一般要求二级护理患者至少: () A、每日 1 次 B、每日 2 次 C、每周 1 次 D、每周 2 次
答案: D
- 13、因医嘱或因无法避免的肌肉、骨骼不能活动可能导致的“有废用综合征的危险”属: () A、现存的护理诊断 B、有危险的护理诊断 C、健康的护理诊断 D、医护合作
答案: B
- 14、关于问诊, 下列错误的是: () A、问诊是采集健康史的重要手段 B、问诊一般从主诉开始, 有目的、有序的进行 C、问诊要全面, 危重病人更应详细询问后再处理 D、问诊中应注意与病人的非语言沟通
答案: C
- 15、在有危险的护理诊断中, 导致个体、家庭和社区健康状况改变发生可能性增加的因素, 称为: () A、定义 B、诊断依据 C、相关因素 D、危险因素
答案: C
- 16、下列关于一上消化道出血伴柏油样便病人的护理诊断的陈述, 正确的是: () A、上消化道出血: 与消化性溃疡有关 B、排便异常: 柏油样便: 与进食不规则所致消化性溃疡有关 C、上消化道出血: 柏油样便: 与进食不规则所致消化性溃疡有关 D、排便异常: 与消化性溃疡有关
答案: B
- 17、关于心电图操作时的病人准备, 错误的是: () A、受检者休息片刻, 取平卧位 B、不必介意检查前病人是否饱餐或吸烟
答案: B
- 18、心电图 T 波代表: () A、心室快速复极 B、心室缓慢复极 C、心室除极 D、心房复极
答案: A
- 19、正常心电轴的范围是: () A、 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ B、 $0^{\circ} \sim 30^{\circ}$ C、 $30^{\circ} \sim -90^{\circ}$ D、 $-30^{\circ} \sim 120^{\circ}$
答案: C
- 20、P 波代表: () A、心房除极 B、心房复极 C、心室除极 D、心室复极
答案: A
- 21、正常成人在任一导联中, ST 段压低不能: () A、 >0.05 mv B、 >0.1 mv C、 >0.25 mv D、 >0.15 mv
答案: A
- 22、自我概念的组成中最不稳定, 易受疾病、手术或外伤影响的部分是 () A、身体意象 B、社会认同 C、自我认同 D、自尊
答案: A
- 23、心理评估最基本的方法为: () A、会谈 B、观察 C、心理测量学方法 D、医学检测法
答案: A
- 24、下列属于焦虑和抑郁共有症状的是: () A、惊慌 B、易激惹 C、无助感 D、睡眠障碍

答案: D

25、爪形手可见于: () A、类风湿性关节炎 B、正中神经损伤 C、尺神经损伤 D、痛风

答案: C

26、肺部叩诊呈浊音或实音多见于: () A、肺气肿 B、肺部大片炎症 C、肺空洞 D、气胸

答案: D

27、消瘦是指体重低于标准体重的: () A、10% B、20% C、30% D、40%

答案: A

28、提示下呼吸道部分阻塞、痉挛或狭窄的呼吸音是 () A、肺泡呼吸音增强 B、肺泡呼吸音消失 C、呼气音延长 D、支气管呼吸音

答案: C

29、肺部叩诊呈鼓音, 见于: () A、肺空洞 B、肺气肿 C、气胸 D、肺癌

答案: C

30、脑膜刺激征见于: () A、脑脊液压力增高 B、锥体束受损 C、小脑疾病 D、震颤麻痹

答案: A

31、抬举样搏动作为可靠体征, 发生的病理改变是: () A、左室肥大 B、右室肥大 C、右房肥大 D、左房肥大

答案: A

32、不会出现触觉语颤增强的病变是 () A、大叶性肺炎 B、肺栓塞 C、靠近胸壁的肺内巨大空腔 D、大量胸腔积液

答案: D

33、叩诊移动性浊音阳性, 提示腹腔内游离腹水达: () A、500ml 以上 B、1000ml 以上 C、1500ml 以上 D、2000ml 以上

答案: B

34、肠鸣音亢进见于: () A、急性肠炎 B、机械性肠梗阻 C、腹泻 D、胃肠道大出血

答案: B

35、锥体束损害时最易引出的病理反射是: () A、Gordon 征 B、Babinski 征 C、Chaddock 征 D、Oppenheim 征

答案: B

36、腹部叩诊鼓音范围明显缩小, 可见于: () A、胃肠高度胀气 B、胃肠穿孔 C、人工气腹 D、腹腔内大量积液

答案: A

37、全身组织严重水肿, 身体低垂部位皮肤紧张发亮, 甚至有液体渗出, 可伴有胸腔、腹腔、鞘膜腔积液, 外阴部也可有明显水肿, 其水肿程度为: () A、轻度水肿 B、中度水肿 C、重度水肿 D、极重度水肿

答案: C

38、反跳痛表示炎症累及: () A、脏器浆膜层 B、腹壁皮肤 C、腹膜脏层 D、腹膜壁层

答案: D

39、扪及交替脉常提示: () A、右心功能不全 B、主动脉瓣关闭不全 C、左心功能不全 D、缩窄性心包炎

答案: C

40、角膜反射完全消失, 见于: () A、深昏迷者 B、浅昏迷者 C、中度昏迷者 D、昏睡者

答案: A

41、呼吸中枢兴奋性极度降低时, 出现的呼吸节律改变称为: () A、潮式呼吸 B、深快呼吸 C、间停呼吸 D、叹息样呼吸

答案: C

42、颈静脉怒张提示: () A、静脉压增高 B、静脉压低 C、脉压增宽 D、脉压变窄

答案: A

43、双侧胸廓扩张受限多见于: () A、胸膜炎 B、肺气肿 C、肺炎 D、肺不张

答案: B

44、正常情况下, 叩诊鼓音见于: () A、肝脏 B、腹部 C、肺脏 D、心脏

答案: B

45、下腔静脉阻塞所致的腹壁静脉曲张主要分布于: () A、腹壁两侧 B、以脐为中心向四周放射 C、下腹部 D、上腹部

答案: A

46、双侧瞳孔大小不等见于: () A、阿托品药物反应 B、脑疝 C、濒死状态 D、有机磷农药中毒

答案: B

47、上肢扑翼样震颤见于: () A、肝昏迷 B、甲状腺功能亢进 C、糖尿病酮症酸中毒昏迷 D、震颤性麻痹

答案: B

48、第一心音减弱可见于: () A、动脉硬化 B、二尖瓣狭窄 C、甲亢 D、二尖瓣关闭不全

答案: D

49、肠鸣音消失常见于: () A、机械性肠梗阻 B、麻痹性肠梗阻 C、幽门梗阻 D、大量腹水

答案: B

50、辗转体位见于: () A、心绞痛 B、胆道蛔虫症 C、心、肺功能不全 D、脊椎疾病

答案: B