

内科护理学卷包-001 试卷号: 22841

- 1、病人体力活动明显受限, 轻于日常的活动即可引起乏力、心悸、呼吸困难, 说明此时病人心功能处于 () A、I 级 B、II 级 C、III 级 D、IV 级
答案: C
- 2、预防哮喘发作最有效的措施是 () A、预防感冒 B、回避激发因素 C、吸入糖皮质激素 D、每日用风速仪监测病情变化
答案: B
- 3、特发性血小板减少性紫癜首选治疗是 () A、脾切除 B、大剂量丙种球蛋白 C、糖皮质激素 D、长春新碱
答案: C
- 4、诊断肾病综合征所必须的条件是 () A、大量蛋白尿+血尿 B、大量蛋白尿+低蛋白血症 C、低蛋白血症+贫血 D、水肿+高血压
答案: B
- 5、Oddi 括约肌位于 () A、食管下端 B、幽门 C、十二指肠 D、胰腺
答案: C
- 6、关于痛风的治疗, 错误的是 () A、不使用抑制尿酸排泄的药物 B、控制总热量摄入, 限制高嘌呤食物 C、急性痛风性关节炎期迅速给予非甾体类抗炎药 D、急性痛风性关节炎期迅速给予糖皮质激素
答案: D
- 7、判断糖尿病控制程度较好的指标是 () A、空腹血糖 B、餐后血糖 C、糖化血红蛋白 D、空腹血浆胰岛素含量
答案: C
- 8、房颤患者出现的脉搏短绌是指 () A、脉率缓慢 B、脉率少于心率 C、脉搏微弱 D、无法触及到脉搏
答案: B
- 9、呼吸衰竭时的氧疗, 错误的是 () A、氧疗可通过多种途径进行 B、吸入氧气必须先加温、湿化 C、吸入高浓度氧时, 应严格控制吸氧时间 D、氧疗的目标是使患者的 PaO₂ 维持在正常范围
答案: D
- 2/210、患者, 女性, 40 岁, 不明原因牙龈渗血 3 月, 月经量增多, 诊断为特发性血小板减少性紫癜, 下列实验室检查不支持该诊断的是 () A、血小板计数减少 B、血小板相关免疫球蛋白增高 C、出血时间正常 D、血小板寿命缩短
答案: C
- 11、慢性肾炎治疗的主要目的是 () A、消除血尿 B、控制感染 C、防止或延缓肾功能衰竭 D、消除蛋白尿
答案: C
- 12、克罗恩病最常见的并发症是 () A、肠梗阻 B、肠穿孔 C、结肠癌变 D、腹腔内脓肿
答案: A
- 13、胰岛素最常见的不良反应是 () A、过敏反应 B、注射部位皮下脂肪萎缩或增生 C、视力模糊 D、低血糖反应
答案: D
- 14、典型心绞痛病人含用硝酸甘油后疼痛缓解时间多在 () A、几秒钟内 B、1-5 分钟 C、10-15 分钟 D、20 分钟左右
答案: B
- 15、下列易于诱发革兰阴性杆菌肺炎的因素中, 错误的是 () A、慢性疾病 B、长期使用肾上腺皮质激素、免疫抑制剂 C、使用机械呼吸器、雾化吸入器 D、静脉输液
答案: D
- 16、再障最主要的诊断依据是 () A、网织红细胞减少 B、肝脾淋巴结不肿大 C、骨髓增生不良 D、全血细胞减少
答案: C
- 17、慢性肾盂肾炎患者经系统治疗, 尿常规已正常, 为判断治疗效果, 还应做的检查是 () A、定期复查尿常规 B、静脉肾盂造影 C、检查肾区有无叩痛 D、尿细菌培养
答案: D
- 18、不符合急性胰腺炎腹痛的特征是 () A、疼痛常位于上腹正中 B、疼痛剧烈而持续 C、向腰部放射 D、进食后疼痛可缓解
答案: D
- 19、对怀疑有心梗的病人, 入院时最主要的护理评估内容是 () A、病人疼痛的情况 B、是否有心梗的诱因 C、以往用药情况 D、血清心肌酶水平
答案: D
- 20、诊断呼吸衰竭最主要的依据是 () A、有引起肺功能严重障碍的原发病 B、意识障碍 C、端坐呼吸、发绀 D、血气分析
答案: D
- 21、肾病综合征最常见的并发症是 () A、循环衰竭 B、肾功能不全 C、感染 D、静脉血栓形成
答案: C
- 22、下面有关肝性脑病患者饮食护理的措施, 错误的是 () A、开始数日内禁食蛋白质, 以碳水化合物为主要饮食 B、神志清楚后, 可逐步增加蛋白质至 40~60g/dC、蛋白质以动物蛋白质为好 D、显著腹水者钠量应限制在 250mg/d
答案: C
- 23、下列易发生洋地黄中毒的原因中, 不准确的是 () A、机体代谢率明显增高时 B、心肌严重受损时 C、低血钾或严重缺氧时 D、在肝、肾功能下降时
答案: A
- 24、治疗肺炎球菌肺炎最常用的抗生素是 () A、红霉素 B、克林霉素 C、青霉素 D、磺胺类药物
答案: C
- 25、肝性脑病患者使用精氨酸的目的是 () A、使肠内呈酸性, 减少氨吸收 B、保护肝细胞 C、与游离氨结合, 从而降低血氨 D、抑制脑内假神经递质合成
答案: C

26、右心功能不全时较早出现的临床表现是 () A、上腹胀满 B、颈静脉充盈和怒张 C、肝大 D、对称性凹陷性水肿

答案: B

27、女性, 30岁, 5天前淋雨后发冷发热、胸痛、咳嗽、气短, 既往有结核病史。查体: 左肺下部叩浊, 可闻水泡音, 痰结核菌集菌阴性, 白细胞 $32 \times 10^9/L$, 胸片左肺下叶大片状致密阴影, 考虑诊断为 () A、浸润型肺结核 B、阻塞性肺炎 C、肺脓肿 D、肺炎球菌肺炎

答案: D

28、交感神经兴奋时循环系统的表现是 () A、心率减慢, 血压降低 B、心率加快, 血压升高 C、心率减慢, 血压升高 D、心率加快, 血压降低

答案: B

29、肺性脑病不能用高浓度吸氧的主要原因是 () A、诱发代谢性碱中毒 B、可引起氧中毒 C、解除了颈动脉窦的兴奋性 D、促使二氧化碳排出过快

答案: C

30、肝性脑病的发病机制是 () A、氨中毒 B、假神经递质 C、氨基酸代谢不平衡 D、上述多种因素综合作用所致

答案: D

31、心绞痛发作的典型部位是 () A、剑突下 B、心前区向上臂放射 C、胸骨下段后 D、胸骨上、中段后

答案: D

32、支气管扩张的主要发病因素是 () A、先天性发育缺损 B、有害气体的吸入 (大气污染) C、长期大量的吸烟 D、支气管肺组织的感染和支气管阻塞

答案: D

33、支气管扩张症最常见的病因是 () A、婴幼儿期的麻疹、支气管肺炎 B、肺结核 C、COPD、支气管肺癌

答案: A

34、肝硬化患者消化系统特征性的症状是 () A、反酸 B、反复呕吐 C、食欲下降 D、厌油腻食物

答案: D

35、慢性支气管炎最主要的病因是 () A、过敏因素 B、环境污染 C、气候因素 D、长期吸烟

答案: D

36、上消化道出血最常见的病因是 () A、消化性溃疡 B、胆道疾病 C、贲门黏膜撕裂症 D、肝硬化食道静脉曲张破裂

答案: A

37、左心功能不全的典型表现是 () A、肝肿大 B、胸痛 C、呼吸困难 D、少尿

答案: C

38、肝性脑病前驱期的临床表现有 () A、可有扑翼样震颤 B、脑电图异常 C、定向力减退 D、昏睡

答案: A

39、长期卧床的心力衰竭病人, 其水肿最易出现的部位是 () A、胫前

B、踝部 C、腹部 D、腰骶部

答案: D

40、下列不属于门脉高压症临床表现的是 () A、脾肿大 B、腹水 C、肝掌 D、食道、胃底静脉曲张

答案: C

41、下列关于正常窦性心律的描述, 错误的是 () A、冲动起源于窦房结 B、频率为 $60 \sim 100$ 次/分 C、心率绝对匀齐 D、PR 间期 $0.12 \sim 0.20$ 秒

答案: C

42、下列有关心脏传导系统的叙述, 错误的是 () A、心脏正常的起搏点位于窦房结 B、心脏传导系统的主要功能是产生并传导冲动, 维持心脏正常节律 C、传导系统由窦房结、结间束、房室结、希斯束、左右束支和浦肯野氏纤维 D、只有窦房结能发出冲动, 引起心脏收缩

答案: D

43、心脏的正常起搏点位于 () A、窦房结 B、房室结 C、房室束 D、浦肯野纤维

答案: A

44、休克的最主要特征是 () A、心输出量降低 B、动脉血压降低 C、组织微循环灌流量锐减 D、外周阻力升高

答案: C

45、下列关于心脏骤停抢救的叙述, 错误的是 () A、应将病人头后仰, 颈部上抬以保持呼吸道通畅 B、注意头部保暖, 以利于扩张头部血管增加血流量 C、开放两条静脉通道以保证抢救药物的输入 D、注意尿量监测, 防止肾衰发生

答案: B

46、限制钠盐摄入、运动等非药物治疗方法适用于 () A、全部高血压病患者 B、只适用于轻度高血压病患者 C、只适用于原发性高血压病患者 D、只适用于高血压病的预防

答案: A

47、下列药物中, 能溶解心肌梗病人冠状动脉中的血栓, 使濒死心肌得以存活的药物是 () A、杜冷丁 B、静脉用硝酸甘油 C、利多卡因 D、尿激酶

答案: D

48、大便隐血试验呈阳性时, 上消化道出血的量最少达到 () A、1ml B、5ml C、10ml D、20ml

答案: B

49、男性, 35岁, 有胃溃疡病史, 今日早餐后突然上腹部疼痛, 拒按。查体: 全腹呈板状硬, 可能的诊断为 () A、阑尾炎 B、胰腺炎 C、胆囊炎 D、溃疡穿孔

答案: D

50、消化性溃疡最常见的并发症是 () A、出血 B、感染 C、幽门梗阻 D、癌变

答案: A

内科护理学卷包-008 试卷号: 22841

- 1、长期血压增高容易引起一些脏器出现并发症, 这些脏器是 () A、心、肝、肾 B、心、脑、肾 C、心、脑、肺 D、脑、肝、肾
答案: B
- 2、慢性肺心病急性加重期的最常见诱因是 () A、过劳 B、大量利尿 C、使用镇静剂 D、呼吸道感染
答案: D
- 3、再障最主要的诊断依据是 () A、网织红细胞减少 B、肝脾淋巴结不肿大 C、骨髓增生不良 D、全血细胞减少
答案: C
- 4、慢性肾炎临床表现错误的是 () A、贫血 B、轻、中度水肿 C、高血压 D、不会导致肾功能不全
答案: D
- 5、确诊消化性溃疡出血最可靠的方法是 () A、胃液分析 B、钡餐透视 C、便潜血 D、急诊胃镜检查
答案: D
- 6、关于痛风的治疗, 错误的是 () A、不使用抑制尿酸排泄的药物 B、控制总热量摄入, 限制高嘌呤食物 C、急性痛风性关节炎期迅速给予非甾体类抗炎药 D、急性痛风性关节炎期迅速给予糖皮质激素
答案: D
- 7、甲亢时最有诊断意义的体征是 () A、心率加快 B、弥漫性甲状腺肿伴血管杂音 C、突眼 D、心脏增大
答案: B
- 8、对于心源性水肿病人的护理诊断, 不正确的是 () A、尿潴留 B、体液过多 C、有皮肤完整性受损的危险 D、潜在并发症: 电解质紊乱(低钾)
答案: A
- 9、恶性程度最高的肺癌是 () A、腺癌 B、鳞癌 C、大细胞肺癌 D、小细胞肺癌
答案: D
- 10、特发性血小板减少性紫癜首选治疗是 () A、脾切除 B、大剂量丙种球蛋白 C、糖皮质激素 D、长春新碱
答案: C
- 11、急性肾小球肾炎的治疗原则是 () A、以休息及对症处置为主 B、以减轻水肿利尿为主 C、以止血、治疗血尿为主 D、以治疗并发症为主
答案: A
- 12、下面关于胃溃疡的叙述, 不正确的是 () A、可见于任何年龄, 青少年多 B、慢性病程 C、周期性发作 D、节律性上腹痛
答案: D
- 13、胰岛素最常见的不良反应是 () A、过敏反应 B、注射部位皮下脂肪萎缩或增生 C、视力模糊 D、低血糖反应
答案: D
- 14、急性左心功能不全发生时, 病人需采取的体位是 () A、平卧位 B、半卧位 C、头高脚高位 D、坐位, 两腿下垂
答案: B
- 15、判断肺结核病人有无传染性的依据是 () A、做结核菌素试验 B、查痰结核菌 C、拍胸片检查有无空洞 D、检查病人有无发热
答案: B
- 16、高热病人饮食及入量护理措施中, 不正确的是 () A、进食高蛋白、高热量、易消化食物 B、少量多餐、多喝水 C、出汗多时应多饮水 D、必要时遵医嘱静脉补液以保证入量
答案: C
- 17、女性, 24岁, 突然出现尿频尿痛进而发热, 化验尿常规蛋白(+), 红细胞 5-7个/HP, 白细胞 20-30个/HP。诊断为急性肾盂肾炎, 感染途径考虑为 () A、血行感染 B、上行感染 C、淋道感染 D、直接感染
答案: B
- 18、下面有关肝性脑病患者饮食护理的措施, 错误的是 () A、开始数日内禁食蛋白质, 以碳水化合物为主要饮食 B、神志清楚后, 可逐步增加蛋白质至 40~60g/d C、蛋白质以动物蛋白质为好 D、显著腹水者钠量应限制在 250mg/d
答案: A
- 19、典型心绞痛病人含用硝酸甘油后疼痛缓解时间多在 () A、几秒钟内 B、1-5分钟 C、10-15分钟 D、20分钟左右
答案: B
- 20、慢性支气管炎最常见的并发症是 () A、慢性肺心病 B、自发性气胸 C、阻塞性肺气肿 D、支气管扩张
答案: C
- 21、慢性肾盂肾炎患者经系统治疗, 尿常规已正常, 为判断治疗效果, 还应做的检查是 () A、定期复查尿常规 B、静脉肾盂造影 C、检查肾区有无叩痛 D、尿细菌培养
答案: D
- 22、与消化性溃疡复发关系最为密切的病原菌是 () A、大肠杆菌 B、幽门螺旋杆菌 C、结核杆菌 D、肺炎克雷白杆菌
答案: B
- 23、心功能不全时下述减轻心脏负荷的治疗措施中, 不正确的是 () A、根据病情适当安排生活、劳动和休息 B、凡是心功能不全的病人都应卧床休息 C、控制钠盐摄入 D、合理应用利尿剂
答案: A
- 24、治疗肺炎球菌肺炎最常用的抗生素是 () A、红霉素 B、克林霉素 C、青霉素 D、磺胺类药物
答案: C
- 25、肝性脑病患者使用精氨酸的目的是 () A、使肠内呈酸性, 减少氨吸收 B、保护肝细胞 C、与游离氨结合, 从而降低血氨 D、抑制脑内假神经递质合成
答案: C
- 26、右心功能不全时较早出现的临床表现是 () A、上腹胀满 B、颈静脉充盈和怒张 C、肝大 D、对称性凹陷性水肿

答案: B

27、支气管扩张症的治疗主要是 () A、手术治疗 B、气功锻炼 C、保持呼吸道通畅和控制感染 D、预防应用气管炎疫苗

答案: C

28、心绞痛发作的典型部位是 () A、剑突下 B、心前区向上臂放射 C、胸骨下段后 D、胸骨上、中段后

答案: B

29、肺性脑病不能用高浓度吸氧的主要原因是 () A、诱发代谢性碱中毒 B、可引起氧中毒 C、解除了颈动脉窦的兴奋性 D、促使二氧化碳排出过快

答案: C

30、下列不属于肝性脑病发生诱因的是 () A、感染 B、腹泻 C、上消化道出血 D、高蛋白饮食

答案: B

31、休克的最主要特征是 () A、心输出量降低 B、动脉血压降低 C、组织微循环灌流量锐减 D、外周阻力升高

答案: C

32、下列药物不会引起肝功能损害的是 () A、异烟肼 B、利福平 C、乙胺丁醇 D、吡嗪酰胺

答案: C

33、引起肺炎的病原体主要是 () A、细菌 B、病毒 C、支原体 D、真菌

答案: A

34、肝硬化患者消化系统特征性的症状是 () A、反酸 B、反复呕吐 C、食欲下降 D、厌油腻食物

答案: D

35、慢性肺心病最常见的病因是 () A、慢性阻塞性肺疾病 B、肺脓肿 C、脊柱严重畸形 D、支气管扩张症

答案: A

36、正常人消化道内铁吸收率最高的部位是 () A、胃 B、十二指肠及空肠上部 C、回盲部 D、回肠

答案: B

37、左心功能不全的典型表现是 () A、肝肿大 B、胸痛 C、呼吸困难 D、少尿

答案: C

38、男性, 35 岁, 有胃溃疡病史, 今日早饭后突然上腹部疼痛, 拒按。查体: 全腹呈板状硬, 可能的诊断为 () A、阑尾炎 B、胰腺炎 C、胆囊炎 D、溃疡穿孔

答案: D

39、长期卧床的心力衰竭病人, 其水肿最易出现的部位是 () A、胫前 B、踝部 C、腹部 D、腰骶部

答案: D

40、肝硬化最突出的临床表现是 () A、蜘蛛痣 B、腹水 C、脾肿大 D、腹壁静脉曲张

答案: B

41、下列关于正常窦性心律的描述, 错误的是 () A、冲动起源于窦房结 B、频率为 60~100 次/分 C、心率绝对不齐 D、PR 间期 0.12~0.20 秒

答案: C

42、下列有关心脏传导系统的叙述, 错误的是 () A、心脏正常的起搏点位于窦房结 B、心脏传导系统的主要功能是产生并传导冲动, 维持心脏正常节律 C、传导系统由窦房结、结间束、房室结、希斯束、左右束支和浦肯野氏纤维 D、只有窦房结能发出冲动, 引起心脏收缩

答案: D

43、心脏的营养供应是来自 () A、主动脉 B、肺动脉 C、颈动脉 D、冠状动脉

答案: D

44、下列有关心悸内容的叙述, 错误的是 () A、心悸是指病人自觉心跳或心慌并伴心前区不适感 B、心悸的出现表明心脏有器质性病变 C、心动过缓也会导致心悸发生 D、心悸常使病人产生紧张不安感

答案: B

45、诊断急性肺水肿最具有特征意义的依据是 () A、严重的呼吸困难、发绀 B、心尖部舒张早期奔马率 C、交替脉 D、严重呼吸困难伴粉红色泡沫样痰

答案: D

46、左心功能不全时, 肺部啰音的特点是 () A、两肺散在干、湿啰音 B、两肺满布干湿啰音 C、固定性局限性肺部湿啰音 D、湿啰音常见于两肺底, 并随体位变化而改变

答案: D

47、心绞痛病人在接受硝酸甘油静脉点滴治疗时, 出现颜面潮红, 头痛症状, 应向患者解释 () A、由于病人对硝酸甘油产生过敏反应, 应立即停用 B、药物剂量不足, 应加快速度 C、硝酸甘油致面部血管扩张所致, 是常见副作用 D、这些症状很严重, 需要立即通知医生处理

答案: C

48、胃溃疡节律性疼痛的特点是 () A、餐后半小时至一小时出现疼痛 B、空腹疼 C、餐时疼 D、夜间疼

答案: A

49、肝性脑病前驱期的临床表现有 () A、可有扑翼样震颤 B、脑电图异常 C、定向力减退 D、昏睡

答案: A

50、我国急性胰腺炎最常见的病因是 () A、胆道疾病 B、腹部钝挫伤 C、酗酒和暴饮暴食 D、急性病毒感染

答案: A

内科护理学卷包-010 试卷号: 22841

- 1、诊断急性肺水肿最具有特征意义的依据是 () A、严重的呼吸困难、发绀 B、心尖部舒张早期奔马率 C、交替脉 D、严重呼吸困难伴粉红色泡沫样痰
答案: D
- 2、慢性肺心病病人痰液黏稠, 首选的治疗措施是 () A、气管插管 B、气管切开 C、肾上腺皮质激素吸入 D、雾化吸入
答案: D
- 3、再障最主要的诊断依据是 () A、网织红细胞减少 B、肝脾淋巴结不肿大 C、骨髓增生不良 D、全血细胞减少
答案: C
- 4、诊断肾病综合征所必须的条件是 () A、大量蛋白尿+血尿 B、大量蛋白尿+低蛋白血症 C、低蛋白血症+贫血 D、水肿+高血压
答案: B
- 5、治疗肝性脑病时, 灌肠时禁用 () A、肥皂水 B、生理盐水 C、石蜡油 D、新霉素液
答案: A
- 6、关于痛风的治疗, 错误的是 () A、不使用抑制尿酸排泄的药物 B、控制总热量摄入, 限制高嘌呤食物 C、急性痛风性关节炎期迅速给予非甾体类抗炎药 D、急性痛风性关节炎期迅速给予糖皮质激素
答案: D
- 7、甲亢时最有诊断意义的体征是 () A、心率加快 B、弥漫性甲状腺肿伴血管杂音 C、突眼 D、心脏增大
答案: B
- 8、下列关于心脏骤停抢救的叙述, 错误的是 () A、应将病人头后仰, 颈部上抬以保持呼吸道通畅 B、注意头部保暖, 以利于扩张头部血管增加血流量 C、开放两条静脉通道以保证抢救药物的输入 D、注意尿量监测, 防止肾衰发生
答案: B
- 9、慢性肺心病急性加重期的最常见诱因是 () A、过劳 B、大量利尿 C、使用镇静剂 D、呼吸道感染
答案: D
- 10、特发性血小板减少性紫癜首选治疗是 () A、脾切除 B、大剂量丙种球蛋白 C、糖皮质激素 D、长春新碱
答案: C
- 11、慢性肾炎治疗的主要目的是 () A、消除血尿 B、控制感染 C、防止或延缓肾功能衰竭 D、消除蛋白尿
答案: C
- 12、关于上消化道出血的叙述, 错误的是 () A、均有黑便和呕血 B、有黑便不一定有呕血 C、有呕血一定有黑便 D、呕血会出现暗红色
答案: A
- 13、判断糖尿病控制程度较好的指标是 () A、空腹血糖 B、餐后血糖 C、糖化血红蛋白 D、空腹血浆胰岛素含量
答案: C
- 14、心肌梗死 24 小时内应避免使用的药物是 () A、洋地黄 B、罂粟碱 C、速尿 D、吗啡
答案: A
- 15、呼吸衰竭时的氧疗, 错误的是 () A、氧疗可通过多种途径进行 B、吸入氧气必须事先加温、湿化 C、吸入高浓度氧时, 应严格控制吸氧时间 D、氧疗的目标是使患者的 PaO₂ 维持在正常范围
答案: D
- 2/216、高热病人饮食及入量护理措施中, 不正确的是 () A、进食高蛋白、高热量、易消化食物 B、少量多餐、多饮水 C、出汗多时应多饮糖水 D、必要时遵医嘱静脉补液以保证入量
答案: C
- 17、慢性肾盂肾炎患者经系统治疗, 尿常规已正常, 为判断治疗效果, 还应做的检查是 () A、定期复查尿常规 B、静脉肾盂造影 C、检查肾区有无叩痛 D、尿细菌培养
答案: D
- 18、诊断胃溃疡恶变最有价值的是 () A、便潜血持续阳性 B、胃液分析 C、钡餐透视造影大于 2cm D、胃镜见溃疡形状不规则, 底部凹凸不平
答案: D
- 19、心脏骤停早期诊断最佳指标是 () A、瞳孔突然明显散大 B、测不到血压 C、颈动脉和股动脉搏动消失 D、呼吸停止
答案: C
- 20、肺心病的最常见的死亡原因是 () A、心律失常 B、肺性脑病 C、休克 D、出血
答案: B
- 21、女性, 24 岁, 突然出现尿频尿痛进而发热, 化验尿常规蛋白 (+), 红细胞 5-7 个/HP, 白细胞 20-30 个/HP。诊断为急性肾盂肾炎, 感染途径考虑为 () A、血行感染 B、上行感染 C、淋巴道感染 D、直接感染
答案: B
- 22、一病人呕吐症状重, 且呕吐量大, 并含有隔夜食物及腐臭味, 此时应考虑可能的诊断是 () A、急性胃炎 B、急性胆囊炎 C、慢性胆囊炎 D、幽门梗阻
答案: D
- 23、左心功能不全与支气管哮喘的主要鉴别点为 () A、夜间呼吸困难 B、伴咳嗽 C、咳白色泡沫样痰 D、坐起时能够缓解呼吸困难
答案: D
- 24、支气管扩张症的治疗主要是 () A、手术治疗 B、气功锻炼 C、保持呼吸道通畅和控制感染 D、预防应用气管炎疫苗
答案: C
- 25、肝性脑病患者使用精氨酸的目的是 () A、使肠内呈酸性, 减少氨吸收 B、保护肝细胞 C、与游离氨结合, 从而降低血氨 D、抑制脑内假神经递质合成
答案: C

26、护理服用洋地黄制剂的病人时，不正确的措施为（）A、给洋地黄前先数脉搏，若小于60次/分不能给药B、观察心电图变化C、如果上一顿药物漏服，下一顿应加倍剂量D、发现洋地黄中毒表现及时通知医生

答案：C

27、治疗肺炎球菌肺炎最常用的抗生素是（）A、红霉素B、克林霉素C、青霉素D、磺胺类药物

答案：C

28、心绞痛发作的典型部位是（）A、剑突下B、心前区向上臂放射C、胸骨下段后D、胸骨上、中段后

答案：B

29、肺性脑病不能用高浓度吸氧的主要原因是（）A、诱发代谢性碱中毒B、可引起氧中毒C、解除了颈动脉窦的兴奋性D、促使二氧化碳排出过快

答案：C

30、不同病期溃疡性结肠炎患者均具有的症状是（）A、高热B、关节痛C、全腹痛D、腹泻

答案：D

31、下列有关心悸内容的叙述，错误的是（）A、心悸是指病人自觉心跳或心慌并伴心前区不适感B、心悸的出现表明心脏有器质性病变C、心动过缓也会导致心悸发生D、心悸常使病人产生紧张不安感

答案：B

32、ARDS的肺水肿属于（）A、心源性肺水肿B、神经性肺水肿C、中毒性肺水肿D、渗透性肺水肿

答案：D

33、支气管扩张症最常见的病因是（）A、婴幼儿期的麻疹、支气管肺炎B、肺结核C、COPDD、支气管肺癌

答案：A

34、消化性溃疡最常见的并发症是（）A、出血B、感染C、幽门梗阻D、癌变

答案：C

35、慢性支气管炎最主要的病因是（）A、过敏因素B、环境污染C、气候因素D、长期吸烟

答案：D

36、肝硬化患者消化系统特征性的症状是（）A、反酸B、反复呕吐C、食欲下降D、厌油腻食物

答案：D

37、左心功能不全的典型表现是（）A、肝肿大B、胸痛C、呼吸困难D、少尿

答案：C

38、肝性脑病时出现的震颤为（）A、双臂强直痉挛B、手指不规则细颤C、双臂节律性抽搐D、扑翼样震颤

答案：D

39、长期卧床的心力衰竭病人，其水肿最易出现的部位是（）A、胫前B、踝部C、腹部D、腰骶部

答案：D

40、肝性脑病最早出现的症状是（）A、昏睡B、反射亢进C、性格和行为异常D、定向力障碍

答案：C

41、下列关于正常窦性心律的描述，错误的是（）A、冲动起源于窦房结B、频率为60~100次/分C、心率绝对不齐D、PR间期0.12~0.20秒

答案：C

42、下列有关心脏传导系统的叙述，错误的是（）A、心脏正常的起搏点位于窦房结B、心脏传导系统的主要功能是产生并传导冲动，维持心脏正常节律C、传导系统由窦房结、结间束、房室结、希斯束、左右束支和浦肯野氏纤维D、只有窦房结能发出冲动，引起心脏收缩

答案：D

43、1999年世界卫生组织和国际高血压学会（WHO/ISH）制定和修改的新的正常人血压标准为（）A、BP<120/80mmHgB、BP<130/85mmHgC、BP<140/90mmHgD、BP<160/100mmHg

答案：B

44、临床上最常见的心律失常为（）A、阵发性心动过速B、过早搏动C、房颤D、室颤

答案：B

45、长期血压增高容易引起一些脏器出现并发症，这些脏器是（）A、心、肝、肾B、心、脑、肾C、心、脑、肺D、脑、肝、肾

答案：B

46、男性，56岁，患高血压性心脏病6年，近一年来，每天从事原有日常活动时出现心悸，气短，休息后好转，可判定为（）A、心功能I级B、心功能II级C、心功能III级D、以上都不是

答案：B

47、诊断右心功能不全时，最可靠的体征是（）A、肝颈静脉回流征阳性B、肝肿大C、下肢浮肿D、腹水

答案：A

48、消化性溃疡的主要症状是（）A、厌食、消瘦B、恶心、呕吐C、呕血、黑便D、上腹疼痛

答案：D

49、大便隐血试验呈阳性时，上消化道出血的量最少达到（）A、1mlB、5mlC、10mlD、20ml

答案：B

50、上消化道出血最常见的病因是（）A、消化性溃疡B、胆道疾病C、贲门黏膜撕裂症D、肝硬化食道静脉曲张破裂

答案：A

内科护理学卷包-007 试卷号: 22841

- 1、下列心功能不全治疗方案中,可以起到减轻心脏负荷作用的是()
A、休息、限盐 B、使用利尿剂 C、使用血管扩张药 D、以上都可以
答案: D
- 2、判断肺结核病人有无传染性的依据是() A、做结核菌素试验 B、查痰结核菌 C、拍胸片检查有无空洞 D、检查病人有无发热
答案: B
- 3、再障最主要的诊断依据是() A、网织红细胞减少 B、肝脾淋巴结不肿大 C、骨髓增生不良 D、全血细胞减少
答案: C
- 4、女性, 24岁, 突然出现尿频尿痛进而发热, 化验尿常规蛋白(+), 红细胞 5-7个/HP, 白细胞 20-30个/HP。诊断为急性肾盂肾炎, 感染途径考虑为() A、血行感染 B、上行感染 C、淋巴道感染 D、直接感染
答案: B
- 5、与消化性溃疡复发关系最为密切的病原菌是() A、大肠杆菌 B、幽门螺旋杆菌 C、结核杆菌 D、肺炎克雷白杆菌
答案: A
- 6、关于痛风的治疗, 错误的是() A、不使用抑制尿酸排泄的药物 B、控制总热量摄入, 限制高嘌呤食物 C、急性痛风性关节炎期迅速给予非甾体类抗炎药 D、急性痛风性关节炎期迅速给予糖皮质激素
答案: D
- 7、判断糖尿病控制程度较好的指标是() A、空腹血糖 B、餐后血糖 C、糖化血红蛋白 D、空腹血浆胰岛素含量
答案: C
- 8、诊断急性肺水肿最具有特征意义的依据是() A、严重的呼吸困难、发绀 B、心尖部舒张早期奔马率 C、交替脉 D、严重呼吸困难伴粉红色泡沫样痰
答案: D
- 9、慢性支气管炎最常见的并发症是() A、慢性肺心病 B、自发性气胸 C、阻塞性肺气肿 D、支气管扩张
答案: C
- 10、患者, 女性, 40岁, 不明原因牙龈渗血3月, 月经量增多, 诊断为特发性血小板减少性紫癜, 下列实验室检查不支持该诊断的是() A、血小板计数减少 B、血小板相关免疫球蛋白增高 C、出血时间正常 D、血小板寿命缩短
答案: C
- 11、急性肾小球肾炎的治疗原则是() A、以休息及对症处置为主 B、以减轻水肿利尿为主 C、以止血、治疗血尿为主 D、以治疗并发症为主
答案: A
- 12、一病人呕吐症状重, 且呕吐量大, 并含有隔夜食物及腐臭味, 此时应考虑可能的诊断是() A、急性胃炎 B、急性胆囊炎 C、慢性胆囊炎 D、幽门梗阻
答案: D
- 13、甲亢时有最诊断意义的体征是() A、心率加快 B、弥漫性甲状腺肿伴血管杂音 C、突眼 D、心脏增大
答案: B
- 14、下列有关心律失常护理的描述, 错误的是() A、评估时, 除了解心悸情况外, 还应询问病人有无乏力、头晕、晕厥的表现 B、教会病人自己测脉率 C、一旦发现病人出现室速必须立即进行电除颤
答案: C
- 15、慢性肺心病病人痰液黏稠, 首选的治疗措施是() A、气管插管 B、气管切开 C、肾上腺皮质激素吸入 D、雾化吸入
答案: D
- 16、特发性血小板减少性紫癜首选治疗是() A、脾切除 B、大剂量丙种球蛋白 C、糖皮质激素 D、长春新碱
答案: C
- 17、肾病综合征最常见的并发症是() A、循环衰竭 B、肾功能不全 C、感染 D、静脉血栓形成
答案: C
- 18、西咪替丁治疗消化性溃疡的机理是() A、质子泵阻滞剂 B、受体拮抗剂 C、制酸剂 D、加速胃排空
答案: B
- 19、对于心源性水肿病人的护理诊断, 不正确的是() A、尿潴留 B、体液过多 C、有皮肤完整性受损的危险 D、潜在并发症: 电解质紊乱(低钾)
答案: A
- 20、对于痰液过多且无力咳嗽的患者, 为防止窒息, 护士在翻身前首先应() A、给患者吸氧 B、给患者吸痰 C、指导患者有效咳嗽 D、给患者雾化吸入
答案: B
- 21、慢性肾炎治疗的主要目的是() A、消除血尿 B、控制感染 C、防止或延缓肾功能衰竭 D、消除蛋白尿
答案: C
- 22、男性, 34岁, 腹泻8年, 每日3次无脓血, 无发热, 结肠镜检查示: 直肠、乙状结肠黏膜多发浅溃疡, 伴充血, 水肿, 诊断应为() A、肠结核 B、疑诊为溃疡性结肠炎 C、确诊为溃疡性结肠炎 D、胃肠功能紊乱
答案: C
- 23、女性, 35岁, 既往风湿性关节炎病史10年, 劳累后心悸、气促4年, 近来加重, 夜间不能平卧。查体: 心尖部隆隆样杂音, 肺底可听到细小水泡音, 腹胀, 双下肢浮肿。该患者心功能不全的类型为() A、左心功能不全 B、右心功能不全 C、全心功能不全 D、右心功能不全伴肺部感染
答案: C
- 24、下列诊断支气管哮喘的依据中, 错误的是() A、阵发性吸呼气性呼吸困难 B、发作时有呼气性呼吸困难 C、肺部满布哮鸣音 D、支气管扩张药治疗有效

答案: A

25、肝性脑病患者使用精氨酸的目的是 () A、使肠内呈酸性,减少氨吸收 B、保护肝细胞 C、与游离氨结合,从而降低血氨 D、抑制脑内假神经递质合成

答案: C

26、下列有利于室性心动过速与室上性心动过速鉴别的选项是 () D、心电图有室室夺获及室性融合波

答案: D

27、治疗肺炎球菌肺炎最常用的抗生素是 () A、红霉素 B、克林霉素 C、青霉素 D、磺胺类药物

答案: C

28、下列有关心悸内容的叙述,错误的是 () A、心悸是指病人自觉心跳或心慌并伴心前区不适感 B、心悸的出现表明心脏有器质性病变 C、心动过缓也会导致心悸发生 D、心悸常使病人产生紧张不安感

答案: B

29、肺性脑病不能用高浓度吸氧的主要原因是 () A、诱发代谢性碱中毒 B、可引起氧中毒 C、解除了颈动脉窦的兴奋性 D、促使二氧化碳排出过快

答案: C

30、引起肝性脑病患者血氨增高的因素,不包括 () A、上消化道出血 B、便秘 C、过度精神紧张 D、高蛋白饮食

答案: C

31、心绞痛发作的典型部位是 () A、剑突下 B、心前区向上臂放射 C、胸骨下段后 D、胸骨上、中段后

答案: B

32、支气管扩张的主要发病因素是 () A、先天性发育缺损 B、有害气体的吸入 (大气污染) C、长期大量的吸烟 D、支气管肺组织的感染和支气管阻塞

答案: D

33、引起肺炎的病原体主要是 () A、细菌 B、病毒 C、支原体 D、真菌

答案: A

34、肝硬化患者消化系统特征性的症状是 () A、反酸 B、反复呕吐 C、食欲下降 D、厌油腻食物

答案: D

35、慢性肺心病最常见的病因是 () A、慢性阻塞性肺疾病 B、肺脓肿 C、脊柱严重畸形 D、支气管扩张症

答案: A

36、正常人消化道内铁吸收率最高的部位是 () A、胃 B、十二指肠及空肠上部 C、回盲部 D、回肠

答案: B

37、长期卧床的心力衰竭病人,其水肿最易出现的部位是 () A、胫前 B、踝部 C、腹部 D、腰骶部

答案: D

38、消化性溃疡的主要症状是 () A、厌食、消瘦 B、恶心、呕吐 C、呕血、黑便 D、上腹疼痛

答案: D

39、左心功能不全的典型表现是 () A、肝肿大 B、胸痛 C、呼吸困难 D、少尿

答案: C

40、大便隐血试验呈阳性时,上消化道出血的量最少达到 () A、1ml B、5ml C、10ml D、20ml

答案: B

41、下列关于正常窦性心律的描述,错误的是 () A、冲动起源于窦房结 B、频率为 60~100 次/分 C、心率绝对匀齐 D、PR 间期 0.12~0.20 秒

答案: C

42、下列有关心脏传导系统的叙述,错误的是 () D、只有窦房结能发出冲动,引起心脏收缩

答案: D

43、由于心排出量突然下降而出现的晕厥称为 () A、心脏骤停 B、病窦综合征 C、阿-斯综合征 D、倾倒综合征

答案: C

44、双相波非同步电除颤的能量选择是 () A、150~200J B、360J C、100J D、250J

答案: A

45、诊断右心功能不全时,最可靠的体征是 () A、肝颈静脉回流征阳性 B、肝肿大 C、下肢浮肿 D、腹水

答案: A

46、在心跳呼吸骤停紧急处理原则中,错误的是 () A、首先必须心电图确诊,然后处理 B、迅速有效的人工呼吸 C、立即进行有效的胸外按压 D、立即建立静脉通道

答案: A

47、心绞痛病人在接受硝酸甘油静脉点滴治疗时,出现颜面潮红,头痛症状,应向患者解释 () A、由于病人对硝酸甘油产生过敏反应,应立即停用 B、药物剂量不足,应加快速度 C、硝酸甘油致面部血管扩张所致,是常见副作用 D、这些症状很严重,需要立即通知医生处理

答案: C

48、下列不属于门脉高压症临床表现的是 () A、脾肿大 B、腹水 C、肝掌 D、食道、胃底静脉曲张

答案: C

49、消化性溃疡药物治疗中抑酸作用最强的是 () A、雷尼替丁 B、奥美拉唑 C、西咪替丁 D、法莫替丁

答案: B

50、上消化道出血最常见的病因是 () A、消化性溃疡 B、胆道疾病 C、贲门黏膜撕裂症 D、肝硬化食道静脉曲张破裂

答案: A

内科护理学卷包-003 试卷号: 22841

- 1、下列药物中,能溶解心肌梗病人冠状动脉中的血栓,使濒死心肌得以存活的药物是 () A、杜冷丁 B、静脉用硝酸甘油 C、利多卡因 D、尿激酶
答案: C
- 2、25岁男性支气管哮喘病人,于一阵剧烈咳嗽后,出现短暂意识丧失,应考虑的诊断是 () A、痰液窒息 B、哮喘严重发作 C、咳嗽性晕厥 D、呼吸衰竭
答案: C
- 3、高热病人饮食及入量护理措施中,不正确的是 () A、进食高蛋白、高热量、易消化食物 B、少量多餐、多饮水 C、出汗多时应多饮糖水 D、必要时遵医嘱静脉补液以保证入量
答案: C
- 4、慢性肾炎治疗的主要目的是 () A、消除血尿 B、控制感染 C、防止或延缓肾功能衰竭 D、消除蛋白尿
答案: C
- 5、消化性溃疡所引起的疼痛,最具有的特点是 () A、中上腹疼痛 B、饥饿性疼痛 C、反复发作性疼痛 D、节律性疼痛
答案: D
- 6、关于痛风的治疗,错误的是 () A、不使用抑制尿酸排泄的药物 B、控制总热量摄入,限制高嘌呤食物 C、急性痛风性关节炎期迅速给予非甾体类抗炎药 D、急性痛风性关节炎期迅速给予糖皮质激素
答案: D
- 7、判断糖尿病控制程度较好的指标是 () A、空腹血糖 B、餐后血糖 C、糖化血红蛋白 D、空腹血浆胰岛素含量
答案: C
- 8、病人体力活动明显受限,轻于日常的活动即可引起乏力、心悸、呼吸困难,说明此时病人心功能处于 () A、I级 B、II级 C、III级 D、IV级
答案: D
- 9、判断肺结核病人有无传染性的依据是 () A、做结核菌素试验 B、查痰结核菌 C、拍胸片检查有无空洞 D、检查病人有无发热
答案: B
- 10、患者,女性,40岁,不明原因牙龈渗血3月,月经量增多,诊断为特发性血小板减少性紫癜,下列实验室检查不支持该诊断的是 () A、血小板计数减少 B、血小板相关免疫球蛋白增高 C、出血时间正常 D、血小板寿命缩短
答案: C
- 11、诊断肾病综合征所必须的条件是 () A、大量蛋白尿+血尿 B、大量蛋白尿+低蛋白血症 C、低蛋白血症+贫血 D、水肿+高血压
答案: B
- 12、下列不属于溃疡性结肠炎治疗原则的是 () A、控制急性发作 B、缓解病情 C、防止并发症 D、早期手术切除全结肠可根治本病
答案: D
- 13、胰岛素最常见的不良反应是 () A、过敏反应 B、注射部位皮下脂肪萎缩或增生 C、视力模糊 D、低血糖反应
答案: D
- 14、心肌梗死24小时内应避免使用的药物是 () A、洋地黄 B、罂粟碱 C、速尿 D、吗啡
答案: A
- 15、诊断呼吸衰竭最主要的依据是 () A、有引起肺功能严重障碍的原发病 B、意识障碍 C、端坐呼吸、发绀 D、血气分析
答案: D
- 16、特发性血小板减少性紫癜首选治疗是 () A、脾切除 B、大剂量丙种球蛋白 C、糖皮质激素 D、长春新碱
答案: C
- 17、女性,24岁,突然出现尿频尿痛进而发热,化验尿常规蛋白(+),红细胞5-7个/HP,白细胞20-30个/HP。诊断为急性肾盂肾炎,感染途径考虑为 () A、血行感染 B、上行感染 C、淋巴道感染 D、直接感染
答案: B
- 18、易并发中毒性结肠扩张的疾病是 () A、溃疡型肠结核 B、溃疡性结肠炎 C、血吸虫病 D、增生型肠结核
答案: B
- 19、下列关于心脏骤停抢救的叙述,错误的是 () A、应将病人头后仰,颈部上抬以保持呼吸道通畅 B、注意头部保暖,以利于扩张头部血管增加血流量 C、开放两条静脉通道以保证抢救药物的输入 D、注意尿量监测,防止肾衰发生
答案: B
- 20、恶性程度最高的肺癌是 () A、腺癌 B、鳞癌 C、大细胞肺癌 D、小细胞肺癌
答案: D
- 21、肾病综合征最常见的并发症是 () A、循环衰竭 B、肾功能不全 C、感染 D、静脉血栓形成
答案: C
- 22、对于溃疡性结肠炎病人腹泻的护理,错误的是 () A、注意补充水、电解质 B、按医嘱选用止泻药 C、便后温水坐浴 D、高热量、高维生素、高纤维素饮食
答案: D
- 23、护理服用洋地黄制剂的病人时,不正确的措施为 () A、给洋地黄前先数脉搏,若小于60次/分不能给药 B、观察心电图变化 C、如果上一顿药物漏服,下一顿应加倍剂量 D、发现洋地黄中毒表现及时通知医生
答案: C
- 24、治疗肺炎球菌肺炎最常用的抗生素是 () A、红霉素 B、克林霉素 C、青霉素 D、磺胺类药物
答案: C
- 25、肝性脑病患者使用精氨酸的目的是 () A、使肠内呈酸性,减少氨

吸收 B、保护肝细胞 C、与游离氨结合，从而降低血氨 D、抑制脑内假神经递质合成

答案：C

26、左心功能不全与支气管哮喘的主要鉴别点为（）A、夜间呼吸困难 B、伴咳嗽 C、咳白色泡沫样痰 D、坐起时能够缓解呼吸困难

答案：D

27、女性，30岁，5天前淋雨后发冷发热、胸痛、咳嗽、气短，既往有结核病史。查体：左肺下部叩浊，可闻水泡音，痰结核菌集菌阴性，白细胞 $32\times 10^9/L$ ，胸片左肺下叶大片状致密阴影，考虑诊断为（）A、浸润型肺结核 B、阻塞性肺炎 C、肺脓肿 D、肺炎球菌肺炎

答案：D

28、有关高血压病患者的饮食护理，不正确的是（）A、限制钠盐摄入，每日应低于6g B、保证足够绿叶蔬菜、豆、乳类含钾、钙食品 C、限酒 D、进食肉类、猪肝等食物

答案：D

29、下列药物不会引起肝功能损害的是（）A、异烟肼 B、利福平 C、乙胺丁醇 D、吡嗪酰胺

答案：C

30、下列不属于肝性脑病发生诱因的是（）A、感染 B、腹泻 C、上消化道出血 D、高蛋白饮食

答案：B

31、双相波非同步电除颤的能量选择是（）A、150~200J B、360J C、100J D、250J

答案：A

32、肺性脑病不能用高浓度吸氧的主要原因是（）A、诱发代谢性碱中毒 B、可引起氧中毒 C、解除了颈动脉窦的兴奋性 D、促使二氧化碳排出过快

答案：B

33、对于心绞痛症状描述，不正确的是（）A、疼痛部位主要在胸骨体中上段之后，或心前区，界限不很清楚，常放射至其它部位 B、疼痛性质常为压迫样、憋闷感或紧缩样感，也可有烧灼感 C、疼痛性质针刺或刀割样锐性痛，偶伴濒死感 D、常见诱因为体力劳动、情绪激动、寒冷等

答案：C

34、支气管扩张症最常见的病因是（）A、婴幼儿期的麻疹、支气管肺炎 B、肺结核 C、COPD D、支气管肺癌

答案：A

35、肝硬化患者消化系统特征性的症状是（）A、反酸 B、反复呕吐 C、食欲下降 D、厌油腻食物

答案：D

36、慢性肺心病最常见的病因是（）A、慢性阻塞性肺疾病 B、肺脓肿 C、脊柱严重畸形 D、支气管扩张症

答案：A

37、消化性溃疡最常见的并发症是（）A、出血 B、感染 C、幽门梗阻

D、癌变

答案：A

38、左心功能不全的典型表现是（）A、肝肿大 B、胸痛 C、呼吸困难 D、少尿

答案：C

39、下列不属于门脉高压症临床表现的是（）A、脾肿大 B、腹水 C、肝掌 D、食道、胃底静脉曲张

答案：C

40、长期卧床的心力衰竭病人，其水肿最易出现的部位是（）A、胫前 B、踝部 C、腹部 D、腰骶部

答案：D

41、肝性脑病前驱期的临床表现有（）A、可有扑翼样震颤 B、脑电图异常 C、定向力减退 D、昏睡

答案：A

42、下列关于正常窦性心律的描述，错误的是（）A、冲动起源于窦房结 B、频率为60~100次/分 C、心率绝对不齐 D、PR间期0.12~0.20秒

答案：C

43、下列有关心脏传导系统的叙述，错误的是（）A、心脏正常的起搏点位于窦房结 B、心脏传导系统的主要功能是产生并传导冲动，维持心脏正常节律 C、传导系统由窦房结、结间束、房室结、希斯束、左右束支和浦肯野氏纤维 D、只有窦房结能发出冲动，引起心脏收缩

答案：D

44、由于心排出量突然下降而出现的晕厥称为（）A、心脏骤停 B、病窦综合征 C、阿-斯综合征 D、倾倒综合征

答案：C

45、临床上最常见的心律失常为（）A、阵发性心动过速 B、过早搏动 C、房颤 D、室颤

答案：B

46、典型心绞痛病人含用硝酸甘油后疼痛缓解时间多在（）A、几秒钟内 B、1-5分钟 C、10-15分钟 D、20分钟左右

答案：B

47、典型心肌梗塞与典型心绞痛病人在症状上最大区别是（）A、疼痛的性质 B、疼痛的时间 C、疼痛的部位 D、疼痛的放射部位

答案：B

48、肝硬化最突出的临床表现是（）A、蜘蛛痣 B、腹水 C、脾肿大 D、腹壁静脉曲张

答案：B

49、大便隐血试验呈阳性时，上消化道出血的量最少达到（）A、1ml B、5ml C、10ml D、20ml

答案：B

50、与消化性溃疡复发关系最为密切的病原菌是（）A、大肠杆菌 B、幽门螺旋杆菌 C、结核杆菌 D、肺炎克雷白杆菌

答案：B

内科护理学卷包-013 试卷号: 22841

- 1、下列心功能不全治疗方案中,可以起到减轻心脏负荷作用的是()
A、休息、限盐 B、使用利尿剂 C、使用血管扩张药 D、以上都可以
答案: D
- 2、肺心病的最常见的死亡原因是() A、心律失常 B、肺性脑病 C、休克 D、出血
答案: B
- 3、特发性血小板减少性紫癜首选治疗是() A、脾切除 B、大剂量丙种球蛋白 C、糖皮质激素 D、长春新碱
答案: C
- 4、慢性肾炎临床表现错误的是() A、贫血 B、轻、中度水肿 C、高血压 D、不会导致肾功能不全
答案: D
- 5、一病人呕吐症状重,且呕吐量大,并含有隔夜食物及腐臭味,此时应考虑可能的诊断是() A、急性胃炎 B、急性胆囊炎 C、慢性胆囊炎 D、幽门梗阻
答案: D
- 6、关于痛风的治疗,错误的是() A、不使用抑制尿酸排泄的药物 B、控制总热量摄入,限制高嘌呤食物 C、急性痛风性关节炎期迅速给予非甾体类抗炎药 D、急性痛风性关节炎期迅速给予糖皮质激素
答案: D
- 7、判断糖尿病控制程度较好的指标是() A、空腹血糖 B、餐后血糖 C、糖化血红蛋白 D、空腹血浆胰岛素含量
答案: C
- 8、诊断急性肺水肿最具有特征意义的依据是() A、严重的呼吸困难、发绀 B、心尖部舒张早期奔马率 C、交替脉 D、严重呼吸困难伴粉红色泡沫样痰
答案: D
- 9、判断肺结核病人有无传染性的依据是() A、做结核菌素试验 B、查痰结核菌 C、拍胸片检查有无空洞 D、检查病人有无发热
答案: B
- 10、再障最主要的诊断依据是() A、网织红细胞减少 B、肝脾淋巴结不肿大 C、骨髓增生不良 D、全血细胞减少
答案: C
- 11、女性,24岁,突然出现尿频尿痛进而发热,化验尿常规蛋白(+),红细胞5-7个/HP,白细胞20-30个/HP。诊断为急性肾盂肾炎,感染途径考虑为() A、血行感染 B、上行感染 C、淋巴道感染 D、直接感染
答案: B
- 12、溃疡性结肠炎最严重的并发症是() A、结肠假性息肉形成 B、结肠狭窄 C、瘘管形成 D、中毒性结肠扩张
答案: D
- 13、胰岛素最常见的不良反应是() A、过敏反应 B、注射部位皮下脂肪萎缩或增生 C、视力模糊 D、低血糖反应
答案: D
- 14、诊断右心功能不全时,最可靠的体征是() A、肝颈静脉回流征阳性 B、肝肿大 C、下肢浮肿 D、腹水
答案: A
- 15、25岁男性支气管哮喘病人,于一阵剧烈咳嗽后,出现短暂意识丧失,应考虑的诊断是() A、痰液窒息 B、哮喘严重发作 C、咳嗽性晕厥 D、呼吸衰竭
答案: C
- 16、高热病人饮食及入量护理措施中,不正确的是() A、进食高蛋白、高热量、易消化食物 B、少量多餐、多饮水 C、出汗多时应多饮糖水 D、必要时遵医嘱静脉补液以保证入量
答案: C
- 17、肾病综合征最常见的并发症是() A、循环衰竭 B、肾功能不全 C、感染 D、静脉血栓形成
答案: C
- 18、与消化性溃疡复发关系最为密切的病原菌是() A、大肠杆菌 B、幽门螺旋杆菌 C、结核杆菌 D、肺炎克雷白杆菌
答案: B
- 19、男性,65岁,诊断为急性心肌梗死入院,住院第3天患者突然呼吸困难,青紫,神志不清,四肢抽搐,听诊心音消失,颈动脉搏动消失。此时首选() A、立即作心电图,了解是否停搏或室颤 B、安置心脏起搏器 C、心内注射肾上腺素 D、胸外心脏按压及人工呼吸
答案: D
- 20、下列易于诱发革兰阴性杆菌肺炎的因素中,错误的是() A、慢性疾病 B、长期使用肾上腺皮质激素、免疫抑制剂 C、使用机械呼吸器、雾化吸入器 D、静脉输液
答案: D
- 21、慢性肾盂肾炎患者经系统治疗,尿常规已正常,为判断治疗效果,还应做的检查是() A、定期复查尿常规 B、静脉肾盂造影 C、检查肾区有无叩痛 D、尿细菌培养
答案: D
- 22、患者的大便呈黑便,提示其出血量最少约为() A、5ml B、50ml C、300ml D、500ml
答案: B
- 23、治疗洋地黄中毒伴心率缓慢者时宜选用() A、利多卡因 B、阿托品 C、苯妥英钠 D、心得安
答案: B
- 24、为预防结核病的发生与流行,最关键的措施是() A、出生后开始定期接种卡介苗 B、隔离肺结核排菌病人 C、合理化疗治愈肺结核排菌病人 D、给易感者及接触肺结核排菌病人预防投药
答案: C
- 25、肝性脑病患者使用精氨酸的目的是() A、使肠内呈酸性,减少氨吸收 B、保护肝细胞 C、与游离氨结合,从而降低血氨 D、抑制脑内假神经递质合成

答案: C

26、目前发现心肌缺血及诊断心绞痛最常用的无创性检查方法是() A、心电图 B、放射性核素 C、冠状动脉造影 D、胸片

答案: A

27、下列诊断支气管哮喘的依据中,错误的是() A、阵发性吸气性呼吸困难 B、发作时有呼气性呼吸困难 C、肺部满布哮鸣音 D、支气管扩张药治疗有效

答案: A

28、有关高血压病患者的饮食护理,不正确的是() A、限制钠盐摄入,每日应低于 6g B、保证足够绿叶蔬菜、豆、乳类含钾、钙食品 C、限酒 D、进食肉类、猪肝等食物

答案: D

29、下列药物不会引起肝功能损害的是() A、异烟肼 B、利福平 C、乙胺丁醇 D、吡嗪酰胺

答案: C

30、不同病期溃疡性结肠炎患者均具有的症状是() A、高热 B、关节痛 C、全腹痛 D、腹泻

答案: D

31、下列有关心悸内容的叙述,错误的是() A、心悸是指病人自觉心跳或心慌并伴心前区不适感 B、心悸的出现表明心脏有器质性病变 C、心动过缓也会导致心悸发生 D、心悸常使病人产生紧张不安感

答案: B

32、肺性脑病不能用高浓度吸氧的主要原因是() A、诱发代谢性碱中毒 B、可引起氧中毒 C、解除了颈动脉窦的兴奋性 D、促使二氧化碳排出过快

答案: C

33、对于心绞痛症状描述,不正确的是() A、疼痛部位主要在胸骨体中上段之后,或心前区,界限不很清楚,常放射至其它部位 B、疼痛性质常为压迫样、憋闷感或紧缩样感,也可有烧灼感 C、疼痛性质针刺或刀割样锐性痛,偶伴濒死感

答案: C

34、引起肺炎的病原体主要是() A、细菌 B、病毒 C、支原体 D、真菌

答案: A

35、上消化道出血最常见的病因是() A、消化性溃疡 B、胆道疾病 C、贲门黏膜撕裂症 D、肝硬化食道静脉曲张破裂

答案: A

36、慢性呼吸衰竭最常见的病因是() A、重症肺结核 B、胸廓病变 C、阻塞性肺疾病 D、肺间质纤维化

答案: C

37、我国急性胰腺炎最常见的病因是() A、胆道疾病 B、腹部钝挫伤 C、酗酒和暴饮暴食 D、急性病毒感染

答案: A

38、左心功能不全的典型表现是() A、肝肿大 B、胸痛 C、呼吸困难

D、少尿

答案: C

39、男性,35岁,有胃溃疡病史,今日早饭后突然上腹部疼痛,拒按。查体:全腹呈板状硬,可能的诊断为() A、阑尾炎 B、胰腺炎 C、胆囊炎 D、溃疡穿孔

答案: D

40、长期卧床的心力衰竭病人,其水肿最易出现的部位是() A、胫前 B、踝部 C、腹部 D、腰骶部

答案: D

41、下列不属于门脉高压症临床表现的是() A、脾肿大 B、腹水 C、肝掌 D、食道、胃底静脉曲张

答案: C

42、下列关于正常窦性心律的描述,错误的是() A、冲动起源于窦房结 B、频率为 60~100 次/分 C、心率绝对匀齐 D、PR 间期 0.12~0.20 秒

答案: C

43、下列有关心脏传导系统的叙述,错误的是() A、心脏正常的起搏点位于窦房结 B、心脏传导系统的主要功能是产生并传导冲动,维持心脏正常节律 C、传导系统由窦房结、结间束、房室结、希斯束、左右束支和浦肯野氏纤维 D、只有窦房结能发出冲动,引起心脏收缩

答案: D

44、心脏的营养供应是来自() A、主动脉 B、肺动脉 C、颈动脉 D、冠状动脉

答案: D

45、缺血性心脏病最常见的病因是() A、主动脉瓣狭窄 B、心肌梗厚 C、严重贫血 D、冠状动脉粥样硬化

答案: D

46、急性心梗病人突然出现明显呼吸困难,两肺满布湿啰音,心率 100 次/分,律齐。此时首先应考虑的诊断是() A、肺部感染 B、肺梗塞 C、急性左心衰 D、心脏破裂

答案: C

47、对怀疑有心梗的病人,入院时最主要的护理评估内容是() A、病人疼痛的情况 B、是否有心梗的诱因 C、以往用药情况 D、血清心肌酶水平

答案: A

48、肝性脑病前驱期的临床表现有() A、可有扑翼样震颤 B、脑电图异常 C、定向力减退 D、昏睡

答案: A

49、肝性脑病最早出现的症状是() A、昏睡 B、反射亢进 C、性格和行为异常 D、定向力障碍

答案: C

50、不符合急性胰腺炎腹痛的特征是() A、疼痛常位于上腹正中 B、疼痛剧烈而持续 C、向腰部放射 D、进食后疼痛可缓解

答案: D

内科护理学卷包-012 试卷号: 22841

- 1、急性心梗病人突然出现明显呼吸困难,两肺满布湿啰音,心率 100 次/分,律齐。此时首先应考虑的诊断是 () A、肺部感染 B、肺梗塞 C、急性左心衰 D、心脏破裂
答案: C
- 2、预防哮喘发作最有效的措施是 () A、预防感冒 B、回避激发因素 C、吸入糖皮质激素 D、每日用风速仪监测病情变化
答案: B
- 3、患者,女性,40岁,不明原因牙龈渗血3月,月经量增多,诊断为特发性血小板减少性紫癜,下列实验室检查不支持该诊断的是 () A、血小板计数减少 B、血小板相关免疫球蛋白增高 C、出血时间正常 D、血小板寿命缩短
答案: C
- 4、诊断肾病综合征所必须的条件是 () A、大量蛋白尿+血尿 B、大量蛋白尿+低蛋白血症 C、低蛋白血症+贫血 D、水肿+高血压
答案: B
- 5、下列不属于溃疡性结肠炎治疗原则的是 () A、控制急性发作 B、缓解病情 C、防止并发症 D、早期手术切除全结肠可根治本病
答案: D
- 6、关于痛风的治疗,错误的是 () A、不使用抑制尿酸排泄的药物 B、控制总热量摄入,限制高嘌呤食物 C、急性痛风性关节炎期迅速给予非甾体类抗炎药 D、急性痛风性关节炎期迅速给予糖皮质激素
答案: D
- 7、甲亢时最有诊断意义的体征是 () A、心率加快 B、弥漫性甲状腺肿大伴血管杂音 C、突眼 D、心脏增大
答案: B
- 8、心绞痛病人在接受硝酸甘油静脉点滴治疗时,出现颜面潮红,头痛症状,应向患者解释 () A、由于病人对硝酸甘油产生过敏反应,应立即停用 B、药物剂量不足,应加快速度 C、硝酸甘油致面部血管扩张所致,是常见副作用 D、这些症状很严重,需要立即通知医生处理
答案: C
- 9、慢性肺心病心衰病人最常见的护理诊断是 () A、体液不足 B、体液过多 C、有感染的危险 D、有外伤的危险
答案: B
- 10、高热病人饮食及入量护理措施中,不正确的是 () A、进食高蛋白、高热量、易消化食物 B、少量多餐、多饮水 C、出汗多时应多饮糖水 D、必要时遵医嘱静脉补液以保证入量
答案: C
- 11、急性肾小球肾炎的治疗原则是 () A、以休息及对症处置为主 B、以减轻水肿利尿为主 C、以止血、治疗血尿为主 D、以治疗并发症为主
答案: A
- 12、一病人呕吐症状重,且呕吐量大,并含有隔夜食物及腐臭味,此时应考虑可能的诊断是 () A、急性胃炎 B、急性胆囊炎 C、慢性胆囊炎 D、幽门梗阻
答案: D
- 13、判断糖尿病控制程度较好的指标是 () A、空腹血糖 B、餐后血糖 C、糖化血红蛋白 D、空腹血浆胰岛素含量
答案: C
- 14、心肌梗死 24 小时内应避免使用的药物是 () A、洋地黄 B、罂粟碱 C、速尿 D、吗啡
答案: A
- 15、判断肺结核病人有无传染性的依据是 () A、做结核菌素试验 B、查痰结核菌 C、拍胸片检查有无空洞 D、检查病人有无发热
答案: B
- 16、特发性血小板减少性紫癜首选治疗是 () A、脾切除 B、大剂量丙种球蛋白 C、糖皮质激素 D、长春新碱
答案: C
- 17、女性,24岁,突然出现尿频尿痛进而发热,化验尿常规蛋白(+),红细胞 5-7 个/HP,白细胞 20-30 个/HP。诊断为急性肾盂肾炎,感染途径考虑为 () A、血行感染 B、上行感染 C、淋巴道感染 D、直接感染
答案: B
- 18、下面关于胃溃疡的叙述,不正确的是 () A、可见于任何年龄,青少年多 B、慢性病程 C、周期性发作 D、节律性上腹痛
答案: D
- 19、男性,56岁,患高血压性心脏病6年,近一年来,每天从事原有日常活动时出现心悸,气短,休息后好转,可判定为 () A、心功能 I 级 B、心功能 II 级 C、心功能 III 级 D、以上都不是
答案: B
- 20、恶性程度最高的肺癌是 () A、腺癌 B、鳞癌 C、大细胞肺癌 D、小细胞肺癌
答案: D
- 21、慢性肾炎治疗的主要目的是 () A、消除血尿 B、控制感染 C、防止或延缓肾功能衰竭 D、消除蛋白尿
答案: C
- 22、易并发中毒性结肠扩张的疾病是 () A、溃疡型肠结核 B、溃疡性结肠炎 C、血吸虫病 D、增生型肠结核
答案: B
- 23、血管扩张药治疗心功能不全的主要机制是 () A、增强心肌收缩力 B、改善心肌供血 C、降低心脏前、后负荷 D、增加心肌耗氧量
答案: C
- 24、治疗肺炎球菌肺炎最常用的抗生素是 () A、红霉素 B、克林霉素 C、青霉素 D、磺胺类药物
答案: C
- 25、肝性脑病患者使用精氨酸的目的是 () A、使肠内呈酸性,减少氨吸收 B、保护肝细胞 C、与游离氨结合,从而降低血氨 D、抑制脑内假神经递质合成

答案: C

26、女性, 35岁, 既往风湿性关节炎病史10年, 劳累后心悸、气促4年, 近来加重, 夜间不能平卧。查体: 心尖部隆隆样杂音, 肺底可听到细小水泡音, 腹胀, 双下肢浮肿。该患者心功能不全的类型为() A、左心功能不全 B、右心功能不全 C、全心功能不全 D、右心功能不全伴肺部感染

答案: C

27、女性, 30岁, 5天前淋雨后发冷发热、胸痛、咳嗽、气短, 既往有结核病史。查体: 左肺下部叩浊, 可闻水泡音, 痰结核菌集菌阴性, 白细胞32x, 胸片左肺下叶大片状致密阴影, 考虑诊断为() A、浸润型肺结核 B、阻塞性肺炎 C、肺脓肿 D、肺炎球菌肺炎

答案: D

28、有关高血压病患者的饮食护理, 不正确的是() A、限制钠盐摄入, 每日应低于6g B、保证足够绿叶蔬菜、豆、乳类含钾、钙食品 C、限酒 D、进食肉类、猪肝等食物

答案: D

29、ARDS的肺水肿属于() A、心源性肺水肿 B、神经性肺水肿 C、中毒性肺水肿 D、渗透性肺水肿

答案: D

30、下列不属于肝性脑病发生诱因的是() A、感染 B、腹泻 C、上消化道出血 D、高蛋白饮食

答案: B

31、交感神经兴奋时循环系统的表现是() A、心率减慢, 血压降低 B、心率加快, 血压升高 C、心率减慢, 血压升高 D、心率加快, 血压降低

答案: B

32、下列药物不会引起肝功能损害的是() A、异烟肼 B、利福平 C、乙胺丁醇 D、吡嗪酰胺

答案: C

33、对于心绞痛症状描述, 不正确的是() A、疼痛部位主要在胸骨体中上段之后, 或心前区, 界限不很清楚, 常放射至其它部位 B、疼痛性质常为压迫样、憋闷感或紧缩样感, 也可有烧灼感 C、疼痛性质针刺或刀割样锐性痛, 偶伴濒死感

答案: C

34、引起肺炎的病原体主要是() A、细菌 B、病毒 C、支原体 D、真菌

答案: A

35、正常人消化道中铁吸收率最高的部位是() A、胃 B、十二指肠及空肠上部 C、回盲部 D、回肠

答案: B

36、支气管扩张症最常见的病因是() A、婴幼儿期的麻疹、支气管肺炎 B、肺结核 C、COPDD、支气管肺癌

答案: A

37、上消化道出血最常见的病因是() A、消化性溃疡 B、胆道疾病 C、贲门黏膜撕裂症 D、肝硬化食道静脉曲张破裂

答案: A

38、左心功能不全的典型表现是() A、肝肿大 B、胸痛 C、呼吸困难 D、少尿

答案: C

39、肝硬化最突出的临床表现是() A、蜘蛛痣 B、腹水 C、脾肿大 D、腹壁静脉曲张

答案: B

40、长期卧床的心力衰竭病人, 其水肿最易出现的部位是() A、胫前 B、踝部 C、腹部 D、腰骶部

答案: D

41、消化性溃疡药物治疗中抑酸作用最强的是() A、雷尼替丁 B、奥美拉唑 C、西咪替丁 D、法莫替丁

答案: B

42、下列关于正常窦性心律的描述, 错误的是() A、冲动起源于窦房结 B、频率为60~100次/分 C、心率绝对匀齐 D、PR间期0.12~0.20秒

答案: C

43、下列有关心脏传导系统的叙述, 错误的是() A、心脏正常的起搏点位于窦房结 B、心脏传导系统的主要功能是产生并传导冲动, 维持心脏正常节律 C、传导系统由窦房结、结间束、房室结、希斯束、左右束支和浦肯野氏纤维 D、只有窦房结能发出冲动, 引起心脏收缩

答案: D

44、1999年世界卫生组织和国际高血压学会(WHO/ISH)制定和修改的新的正常人血压标准为() A、BP<120/80mmHg B、BP<130/85mmHg C、BP<140/90mmHg D、BP<160/100mmHg

答案: B

45、双相波非同步电除颤的能量选择是() A、150~200J B、360J C、100J D、250J

答案: A

46、左心功能不全时, 肺部啰音的特点是() A、两肺散在干、湿啰音 B、两肺满布干湿啰音 C、固定性局限性肺部湿啰音 D、湿啰音常见于两肺底, 并随体位变化而改变

答案: D

47、急性左心功能不全, 高度呼吸困难, 烦躁不安时立即给予() A、吸氧 B、安定肌肉注射 C、吗啡皮下注射 D、氨茶碱静脉注射

答案: C

48、大便隐血试验呈阳性时, 上消化道出血的量最少达到() A、1ml B、5ml C、10ml D、20ml

答案: B

49、肝性脑病最早出现的症状是() A、昏睡 B、反射亢进 C、性格和行为异常 D、定向力障碍

答案: C

50、下列关于肝性脑病的治疗, 错误的是() A、肥皂水灌肠 B、生理盐水灌肠 C、弱酸性溶液灌肠 D、乳果糖灌肠

答案: A

内科护理学卷包-017 试卷号: 22841

1. 心肌梗死 24 小时内应避免使用的药物是 () A、洋地黄 B、罂粟碱 C、速尿 D、吗啡
答案: A
2. 预防哮喘发作最有效的措施是 () A、预防感冒 B、回避激发因素 C、吸入糖皮质激素 D、每日用风速仪监测病情变化
答案: B
3. 特发性血小板减少性紫癜首选治疗是 () A、脾切除 B、大剂量丙种球蛋白 C、糖皮质激素 D、长春新碱
答案: C
4. 诊断肾病综合征所必须的条件是 () A、大量蛋白尿+血尿 B、大量蛋白尿+低蛋白血症 C、低蛋白血症+贫血 D、水肿+高血压
答案: B
5. Oddi 括约肌位于 () A、食管下端 B、幽门 C、十二指肠 D、胰腺
答案: C
6. 关于痛风的治疗, 错误的是 () A、不使用抑制尿酸排泄的药物 B、控制总热量摄入, 限制高嘌呤食物 C、急性痛风性关节炎期迅速给予非甾体类抗炎药 D、急性痛风性关节炎期迅速给予糖皮质激素
答案: D
7. 下列有关糖尿病的饮食治疗, 正确的是 () A、无论病情轻重都需饮食治疗 B、病情轻可以不用饮食治疗 C、有并发症者不用饮食治疗 D、用药治疗时不用饮食治疗
答案: A
8. 下列心功能不全治疗方案中, 可以起到减轻心脏负荷作用的是 () A、休息、限盐 B、使用利尿剂 C、使用血管扩张药 D、以上都可以
答案: D
9. 慢性支气管炎最常见的并发症是 () A、慢性肺心病 B、自发性气胸 C、阻塞性肺气肿 D、支气管扩张
答案: C
10. 高热病人饮食及入量护理措施中, 不正确的是 () A、进食高蛋白、高热量、易消化食物 B、少量多餐、多饮水 C、出汗多时应多饮糖水 D、必要时遵医嘱静脉补液以保证入量
答案: C
11. 急性肾小球肾炎的治疗原则是 () A、以休息及对症处置为主 B、以减轻水肿利尿为主 C、以止血、治疗血尿为主 D、以治疗并发症为主
答案: A
12. 确诊消化性溃疡出血最可靠的方法是 () A、胃液分析 B、钡餐透视 C、便潜血 D、急诊胃镜检查
答案: D
13. 甲亢时最有诊断意义的体征是 () A、心率加快 B、弥漫性甲状腺肿伴血管杂音 C、突眼 D、心脏增大
答案: B
14. 心脏骤停的诊断要点不包括 () A、意识丧失 B、颈动脉搏动消失 C、呼吸断续或停止 D、心电图显示室性心动过速
答案: D
15. 判断肺结核病人有无传染性的依据是 () A、做结核菌素试验 B、查痰结核菌 C、拍胸片检查有无空洞 D、检查病人有无发热
答案: B
16. 患者, 女性, 40 岁, 不明原因牙龈渗血 3 月, 月经量增多, 诊断为特发性血小板减少性紫癜, 下列实验室检查不支持该诊断的是 () A、血小板计数减少 B、血小板相关免疫球蛋白增高 C、出血时间正常 D、血小板寿命缩短
答案: C
17. 女性, 24 岁, 突然出现尿频尿痛进而发热, 化验尿常规蛋白 (+), 红细胞 5-7 个/HP, 白细胞 20-30 个/HP。诊断为急性肾盂肾炎, 感染途径考虑为 () A、血行感染 B、上行感染 C、淋巴道感染 D、直接感染
答案: B
18. 消化性溃疡所引起的疼痛, 最具有的特点是 () A、中上腹疼痛 B、饥饿性疼痛 C、反复发作性疼痛 D、节律性疼痛
答案: D
19. 典型心肌梗塞与典型心绞痛病人在症状上最大区别是 () A、疼痛的性质 B、疼痛的时间 C、疼痛的部位 D、疼痛的放射部位
答案: B
20. 慢性肺心病病人最常见的护理诊断是 () A、体液不足 B、体液过多 C、有感染的危险 D、有外伤的危险
答案: B
21. 慢性肾盂肾炎患者经系统治疗, 尿常规已正常, 为判断治疗效果, 还应做的检查是 () A、定期复查尿常规 B、静肾盂造影 C、检查肾区有无叩痛 D、尿细菌培养
答案: D
22. 不符合急性胰腺炎腹痛的特征是 () A、疼痛常位于上腹正中 B、疼痛剧烈而持续 C、向腰部放射 D、进食后疼痛可缓解
答案: D
23. 右心功能不全时较早出现的临床表现是 () A、上腹胀满 B、颈静脉充盈和怒张 C、肝大 D、对称性凹陷性水肿
答案: B
24. 支气管扩张症的治疗主要是 () A、手术治疗 B、气功锻炼 C、保持呼吸道通畅和控制感染 D、预防应用气管炎疫苗
答案: C
25. 肝性脑病患者使用精氨酸的目的是 () A、使肠内呈酸性, 减少氨吸收 B、保护肝细胞 C、与游离氨结合, 从而降低血氨 D、抑制脑内假神经递质合成
答案: C
26. 治疗洋地黄中毒伴心率缓慢者时宜选用 () A、利多卡因 B、阿托品 C、苯妥英钠 D、心得安
答案: B
27. 对肺癌的诊断及分型具有重要意义的检查方法是 () A、胸部影像

学检查 B、纤维支气管镜检查 C、痰癌细胞检查 D、经胸壁穿刺活检

答案: B

28、由心脏病引起的心脏骤停中,最常见的病因是 () A、急性心肌炎 B、冠心病 C、风心病 D、心肌病

答案: B

29、下列药物不会引起肝功能损害的是 () A、异烟肼 B、利福平 C、乙胺丁醇 D、吡嗪酰胺

答案: C

30、下列各因素均是粘膜的损害因素,除了 () A、非甾体类药物 B、吸烟 C、过度精神紧张 D、前列腺素

答案: D

31、有关高血压患者的饮食护理,不正确的是 () A、限制钠盐摄入,每日应低于 6g B、保证足够绿叶蔬菜、豆、乳类含钾、钙食品 C、限酒 D、进食肉类、猪肝等食物

答案: D

32、肺性脑病不能用高浓度吸氧的主要原因是 () A、诱发代谢性碱中毒 B、可引起氧中毒 C、解除了颈动脉窦的兴奋性 D、促使二氧化碳排出过快

答案: C

33、对于心绞痛症状描述,不正确的是 () A、疼痛部位主要在胸骨体中上段之后,或心前区,界限不很清楚,常放射至其它部位 B、疼痛性质常为压迫样、憋闷感或紧缩样感,也可有烧灼感 C、疼痛性质针刺或刀割样锐性痛,偶伴濒死感 D、常见诱因因为体力劳动、情绪激动、寒冷等

答案: C

34、慢性呼吸衰竭最常见的病因是 () A、重症肺结核 B、胸廓病变 C、阻塞性肺疾病 D、肺间质纤维化

答案: C

35、肝硬化患者消化系统特征性的症状是 () A、反酸 B、反复呕吐 C、食欲下降 D、厌油腻食物

答案: D

36、引起肺炎的病原体主要是 () A、细菌 B、病毒 C、支原体 D、真菌

答案: A

37、正常人消化道内铁吸收率最高的部位是 () A、胃 B、十二指肠及空肠上部 C、回盲部 D、回肠

答案: B

38、长期卧床的心力衰竭病人,其水肿最易出现的部位是 () A、胫前 B、踝部 C、腹部 D、腰骶部

答案: D

39、肝性脑病前驱期的临床表现有 () A、可有扑翼样震颤 B、脑电图异常 C、定向力减退 D、昏睡

答案: A

40、左心功能不全的典型表现是 () A、肝肿大 B、胸痛 C、呼吸困难 D、少尿

答案: C

41、肝性脑病最早出现的症状是 () A、昏睡 B、反射亢进 C、性格和行为异常 D、定向力障碍

答案: C

42、下列关于正常窦性心律的描述,错误的是 () A、冲动起源于窦房结 B、频率为 60~100 次/分 C、心率绝对匀齐 D、PR 间期 0.12~0.20 秒

答案: C

43、下列有关心脏传导系统的叙述,错误的是 () A、心脏正常的起搏点位于窦房结 B、心脏传导系统的主要功能是产生并传导冲动,维持心脏正常节律 C、传导系统由窦房结、结间束、房室结、希斯束、左右束支和浦肯野氏纤维 D、只有窦房结能发出冲动,引起心脏收缩

答案: D

44、由于心排出量突然下降而出现的晕厥称为 () A、心脏骤停 B、病窦综合征 C、阿-斯综合征 D、倾倒综合征

答案: C

45、双相波非同步电除颤的能量选择是 () A、150~200J B、360J C、100J D、250J

答案: A

46、在心跳呼吸骤停紧急处理原则中,错误的是 () A、首先必须心电图确诊,然后处理 B、迅速有效的人工呼吸 C、立即进行有效的胸外按压 D、立即建立静脉通道

答案: A

47、男性,65 岁,诊断为急性心肌梗死入院,住院第 3 天患者突然呼吸困难,青紫,神志不清,四肢抽搐,听诊心音消失,颈动脉搏动消失。此时首选 () A、立即作心电图,了解是否停搏或室颤 B、安置心脏起搏器 C、心内注射肾上腺素 D、胸外心脏按压及人工呼吸

答案: D

48、胃溃疡节律性疼痛的特点是 () A、餐后半小时至一小时出现疼痛 B、空腹疼 C、餐时疼 D、夜间疼

答案: A

49、肝硬化最突出的临床表现是 () A、蜘蛛痣 B、腹水 C、脾肿大 D、腹壁静脉曲张

答案: B

50、男性,34 岁,腹泻 8 年,每日 3 次无脓血,无发热,结肠镜检查示:直肠、乙状结肠黏膜多发浅溃疡,伴充血,水肿,诊断应为 () A、肠结核 B、疑诊为溃疡性结肠炎 C、确诊为溃疡性结肠炎 D、胃肠功能紊乱

答案: C

内科护理学卷包-006 试卷号: 22841

- 1、下列关于心脏骤停抢救的叙述,错误的是() A、应将病人头后仰,颈部上抬以保持呼吸道通畅 B、注意头部保暖,以利于扩张头部血管增加血流量 C、开放两条静脉通道以保证抢救药物的输入 D、注意尿量监测,防止肾衰发生
答案: B
- 2、男性,67岁,原有肺心病,受凉后加重,咳脓性痰,伴发热、烦躁、呼吸困难,入院前4小时神志模糊,嗜睡。查体:明显发绀,昏迷,血压100/60mmHg,无病理反射。可能的并发症是() A、休克 B、肺性脑病 C、消化道出血 D、肺癌
答案: B
- 3、特发性血小板减少性紫癜首选治疗是() A、脾切除 B、大剂量丙种球蛋白 C、糖皮质激素 D、长春新碱
答案: C
- 4、诊断肾病综合征所必须的条件是() A、大量蛋白尿+血尿 B、大量蛋白尿+低蛋白血症 C、低蛋白血症+贫血 D、水肿+高血压
答案: B
- 5、Oddi括约肌位于() A、食管下端 B、幽门 C、十二指肠 D、胰腺
答案: C
- 6、关于痛风的治疗,错误的是() A、不使用抑制尿酸排泄的药物 B、控制总热量摄入,限制高嘌呤食物 C、急性痛风性关节炎期迅速给予非甾体类抗炎药 D、急性痛风性关节炎期迅速给予糖皮质激素
答案: D
- 7、下列有关糖尿病的饮食治疗,正确的是() A、无论病情轻重都需饮食治疗 B、病情轻可以不用饮食治疗 C、有并发症者不用饮食治疗 D、用药治疗时可以用不用饮食治疗
答案: A
- 8、急性左心功能不全发生时,病人需采取的体位是() A、平卧位 B、半卧位 C、头高脚高位 D、坐位,两腿下垂
答案: D
- 9、判断肺结核病人有无传染性的依据是() A、做结核菌素试验 B、查痰结核菌 C、拍胸片检查有无空洞 D、检查病人有无发热
答案: B
- 10、再障最主要的诊断依据是() A、网织红细胞减少 B、肝脾淋巴结不肿大 C、骨髓增生不良 D、全血细胞减少
答案: C
- 11、急性肾小球肾炎的治疗原则是() A、以休息及对症处置为主 B、以减轻水肿利尿为主 C、以止血、治疗血尿为主 D、以治疗并发症为主
答案: A
- 12、肝性脑病人恢复期护理措施中,最主要的是() A、注意休息与保暖 B、保持大便通畅 C、加强支持疗法 D、防止各种诱发因素
答案: D
- 13、甲亢时最有诊断意义的体征是() A、心率加快 B、弥漫性甲状腺肿伴血管杂音 C、突眼 D、心脏增大
答案: B
- 14、诊断急性肺水肿最具有特征意义的依据是() A、严重的呼吸困难、发绀 B、心尖部舒张早期奔马率 C、交替脉 D、严重呼吸困难伴粉红色泡沫样痰
答案: D
- 15、呼吸衰竭时的氧疗,错误的是() A、氧疗可通过多种途径进行 B、吸入氧气必须先加温、湿化 C、吸入高浓度氧时,应严格控制吸氧时间 D、氧疗的目标是使患者的 PaO₂ 维持在正常范围
答案: D
- 2/216、高热病人饮食及入量护理措施中,不正确的是() A、进食高蛋白、高热量、易消化食物 B、少量多餐、多饮水 C、出汗多时应多饮糖水 D、必要时遵医嘱静脉补液以保证入量
答案: C
- 17、肾病综合征最常见的并发症是() A、循环衰竭 B、肾功能不全 C、感染 D、静脉血栓形成
答案: C
- 18、急性胰腺炎禁用的镇痛药物是() A、山莨菪碱 B、哌替啶 C、吗啡 D、阿托品
答案: C
- 19、下列有关心律失常护理的描述,错误的是() A、评估时,除了心悸情况外,还应询问病人有无乏力、头晕、晕厥的表现 B、教会病人自己测脉率 C、一旦发现病人出现室速必须立即进行电除颤 D、应告诉心动过缓病人避免屏气用力动作以免加重病情
答案: C
- 20、25岁男性支气管哮喘病人,于一阵剧烈咳嗽后,出现短暂意识丧失,应考虑的诊断是() A、痰液窒息 B、哮喘严重发作 C、咳嗽性晕厥 D、呼吸衰竭
答案: C
- 21、慢性肾盂肾炎患者经系统治疗,尿常规已正常,为判断治疗效果,还应做的检查是() A、定期复查尿常规 B、静肾盂造影 C、检查肾区有无叩痛 D、尿细菌培养
答案: D
- 22、对于溃疡性结肠炎病人腹泻的护理,错误的是() A、注意补充水、电解质 B、按医嘱选用止泻药 C、便后温水坐浴 D、高热量、高维生素、高纤维素饮食
答案: D
- 23、下列与洋地黄中毒无关的选项是() A、恶心、呕吐 B、右束支传导阻滞 C、频发室性早搏 D、III度房室传导阻滞
答案: B
- 24、支气管扩张症的治疗主要是() A、手术治疗 B、气功锻炼 C、保持呼吸道通畅和控制感染 D、预防应用气管炎疫苗
答案: C
- 25、肝性脑病患者使用精氨酸的目的是() A、使肠内呈酸性,减少氨

吸收 B、保护肝细胞 C、与游离氨结合，从而降低血氨 D、抑制脑内假神经递质合成

答案：C

26、下列有利于室性心动过速与室上性心动过速鉴别的选项是（）A、心室率 160 次/分 B、心电图 QRS 波宽大畸形 C、过去发生室早 D、心电图有心室夺获及室性融合波

答案：D

27、治疗肺炎球菌肺炎最常用的抗生素是（）A、红霉素 B、克林霉素 C、青霉素 D、磺胺类药物

答案：C

28、有关高血压病患者的饮食护理，不正确的是（）A、限制钠盐摄入，每日应低于 6g B、保证足够绿叶蔬菜、豆、乳类含钾、钙食品 C、限酒 D、进食肉类、猪肝等食物

答案：D

29、下列药物不会引起肝功能损害的是（）A、异烟肼 B、利福平 C、乙胺丁醇 D、吡嗪酰胺

答案：C

30、肝性脑病的发病机制是（）A、氨中毒 B、假神经递质 C、氨基酸代谢不平衡 D、上述多种因素综合作用所致

答案：D

31、双相波非同步电除颤的能量选择是（）A、150~200J B、360J C、100J D、250J

答案：A

32、支气管扩张的主要发病因素是（）A、先天性发育缺损 B、有害气体的吸入（大气污染） C、长期大量的吸烟 D、支气管肺组织的感染和支气管阻塞

答案：D

33、对于心绞痛症状描述，不正确的是（）A、疼痛部位主要在胸骨体中上段之后，或心前区，界限不很清楚，常放射至其它部位 B、疼痛性质常为压迫样、憋闷感或紧缩样感，也可有烧灼感 C、疼痛性质针刺或刀割样锐性痛，偶伴濒死感

2、答案：C

34、支气管扩张症最常见的病因是（）A、婴幼儿期的麻疹、支气管肺炎 B、肺结核 C、COPDD、支气管肺癌

答案：A

35、肝硬化患者消化系统特征性的症状是（）A、反酸 B、反复呕吐 C、食欲下降 D、厌油腻食物

答案：D

36、慢性支气管炎最主要的病因是（）A、过敏因素 B、环境污染 C、气候因素 D、长期吸烟

答案：D

37、正常人消化道中铁吸收率最高的部位是（）A、胃 B、十二指肠及空肠上部 C、回盲部 D、回肠

答案：B

38、左心功能不全的典型表现是（）A、肝肿大 B、胸痛 C、呼吸困难 D、少尿

答案：C

39、肝性脑病最早出现的症状是（）A、昏睡 B、反射亢进 C、性格和行为异常 D、定向力障碍

答案：C

40、长期卧床的心力衰竭病人，其水肿最易出现的部位是（）A、胫前 B、踝部 C、腹部 D、腰骶部

答案：D

41、下列不属于门脉高压症临床表现的是（）A、脾肿大 B、腹水 C、肝掌 D、食道、胃底静脉曲张

答案：C

42、下列关于正常窦性心律的描述，错误的是（）A、冲动起源于窦房结 B、频率为 60~100 次/分 C、心率绝对不齐 D、PR 间期 0.12~0.20

答案：C

43、下列有关心脏传导系统的叙述，错误的是（）A、心脏正常的起搏点位于窦房结 B、心脏传导系统的主要功能是产生并传导冲动，维持心脏正常节律 C、传导系统由窦房结、结间束、房室结、希斯束、左右束支和浦肯野氏纤维 D、只有窦房结能发出冲动，引起心脏收缩

答案：D

44、由于心排出量突然下降而出现的晕厥称为（）A、心脏骤停 B、病窦综合征 C、阿-斯综合征 D、倾倒综合征

答案：C

45、心衰患者使用利尿剂的目的是（）A、减轻心脏前负荷 B、减轻心脏后负荷 C、减轻心脏前、后负荷 D、加强心肌收缩力

答案：A

46、在心跳呼吸骤停紧急处理原则中，错误的是（）A、首先必须心电图确诊，然后处理 B、迅速有效的人工呼吸 C、立即进行有效的胸外按压 D、立即建立静脉通道

答案：A

47、男性，65 岁，诊断为急性心肌梗死入院，住院第 3 天患者突然呼吸困难，青紫，神志不清，四肢抽搐，听诊心音消失，颈动脉搏动消失。此时首选（）A、立即作心电图，了解是否停搏或室颤 B、安置心脏起搏器 C、心内注射肾上腺素 D、胸外心脏按压及人工呼吸

答案：D

48、肝性脑病前驱期的临床表现有（）A、可有扑翼样震颤 B、脑电图异常 C、定向力减退 D、昏睡

答案：A

49、肝硬化最突出的临床表现是（）A、蜘蛛痣 B、腹水 C、脾肿大 D、腹壁静脉曲张

答案：B

50、消化性溃疡所引起的疼痛，最具有的特点是（）A、中上腹疼痛 B、饥饿性疼痛 C、反复发作性疼痛 D、节律性疼痛

答案：D

内科护理学卷包-005 试卷号: 22841

- 1、左心功能不全时,肺部啰音的特点是() A、两肺散在干、湿啰音
B、两肺满布干湿啰音 C、固定性局限性肺部湿啰音 D、湿啰音常见于两肺底,并随体位变化而改变
答案: D
- 2、诊断呼吸衰竭最主要的依据是() A、有引起肺功能严重障碍的原发病 B、意识障碍 C、端坐呼吸、发绀 D、血气分析
答案: D
- 3、再障最主要的诊断依据是() A、网织红细胞减少 B、肝脾淋巴结不肿大 C、骨髓增生不良 D、全血细胞减少
答案: C
- 4、肾病综合征最常见的并发症是() A、循环衰竭 B、肾功能不全 C、感染 D、静脉血栓形成
答案: C
- 5、治疗肝性脑病时,灌肠时禁用() A、肥皂水 B、生理盐水 C、石蜡油 D、新霉素液
答案: A
- 6、关于痛风的治疗,错误的是() A、不使用抑制尿酸排泄的药物 B、控制总热量摄入,限制高嘌呤食物 C、急性痛风性关节炎期迅速给予非甾体类抗炎药 D、急性痛风性关节炎期迅速给予糖皮质激素
答案: D
- 7、下列有关糖尿病的饮食治疗,正确的是() A、无论病情轻重都需饮食治疗 B、病情轻可以不用饮食治疗 C、有并发症者不用饮食治疗 D、用药治疗时可以用饮食治疗
答案: A
- 8、心脏骤停复苏后最易出现() A、心肌损伤 B、肺水肿 C、肾小管坏死 D、脑损伤
答案: D
- 9、慢性肺心病心衰病人最常见的护理诊断是() A、体液不足 B、体液过多 C、有感染的危险 D、有外伤的危险
答案: B
- 10、高热病人饮食及入量护理措施中,不正确的是() A、进食高蛋白、高热量、易消化食物 B、少量多餐、多饮水 C、出汗多时应多饮糖水 D、必要时遵医嘱静脉补液以保证入量
答案: C
- 11、慢性肾炎治疗的主要目的是() A、消除血尿 B、控制感染 C、防止或延缓肾功能衰竭 D、消除蛋白尿
答案: C
- 12、患者的大便呈黑便,提示其出血量最少约为() A、5ml B、50ml C、300ml D、500ml
答案: B
- 13、胰岛素最常见的不良反应是() A、过敏反应 B、注射部位皮下脂肪萎缩或增生 C、视力模糊 D、低血糖反应
答案: D
- 14、男性,56岁,患高血压性心脏病6年,近一年来,每天从事原有日常活动时出现心悸,气短,休息后好转,可判定为() A、心功能I级 B、心功能II级 C、心功能III级 D、以上都不是
答案: B
- 15、肺心病的最常见的死亡原因是() A、心律失常 B、肺性脑病 C、休克 D、出血
答案: B
- 16、特发性血小板减少性紫癜首选治疗是() A、脾切除 B、大剂量丙种球蛋白 C、糖皮质激素 D、长春新碱
答案: C
- 17、女性,24岁,突然出现尿频尿痛进而发热,化验尿常规蛋白(+),红细胞5-7个/HP,白细胞20-30个/HP。诊断为急性肾盂肾炎,感染途径考虑为() A、血行感染 B、上行感染 C、淋巴道感染 D、直接感染
答案: B
- 18、急性胰腺炎禁用的镇痛药物是() A、山莨菪碱 B、哌替啶 C、吗啡 D、阿托品
答案: C
- 19、诊断右心功能不全时,最可靠的体征是() A、肝颈静脉回流征阳性 B、肝肿大 C、下肢浮肿 D、腹水
答案: A
- 20、慢性支气管炎最常见的并发症是() A、慢性肺心病 B、自发性气胸 C、阻塞性肺气肿 D、支气管扩张
答案: C
- 21、急性肾小球肾炎的治疗原则是() A、以休息及对症处置为主 B、以减轻水肿利尿为主 C、以止血、治疗血尿为主 D、以治疗合并症为主
答案: A
- 22、与消化性溃疡复发关系最为密切的病原菌是() A、大肠杆菌 B、幽门螺旋杆菌 C、结核杆菌 D、肺炎克雷白杆菌
答案: B
- 23、男性,30岁,阵发性心悸2年,每次突然发生,持续30分钟~1小时不等。查体:心率200次/分,律齐,心电图示:QRS波型正常,P波不能明确查见,诊断为() A、心房颤动 B、窦性心动过速 C、阵发性室上性心动过速 D、阵发性室性心动过速
答案: C
- 24、女性,30岁,5天前淋雨后发冷发热、胸痛、咳嗽、气短,既往有结核病史。查体:左肺下部叩浊,可闻水泡音,痰结核菌集菌阴性,白细胞32x,胸片左肺下叶大片状致密阴影,考虑诊断为() A、浸润型肺结核 B、阻塞性肺炎 C、肺脓肿 D、肺炎球菌肺炎
答案: D
- 25、肝性脑病患者使用精氨酸的目的是() A、使肠内呈酸性,减少氨吸收 B、保护肝细胞 C、与游离氨结合,从而降低血氨 D、抑制脑内假神经递质合成
答案: C

26、风湿性心瓣膜病心房颤动的病人，若发生栓塞，最多见的部位是
() A、肺动脉 B、肺静脉 C、脑动脉 D、下肢动脉

答案：C

27、为预防结核病的发生与流行，最关键的措施是 () A、出生后开始定期接种卡介苗 B、隔离结核排菌病人 C、合理化疗治愈结核排菌病人 D、给易感者及接触结核排菌病人预防投药

答案：C

28、有关高血压病患者的饮食护理，不正确的是 () A、限制钠盐摄入，每日应低于 6g B、保证足够绿叶蔬菜、豆、乳类含钾、钙食品 C、限酒 D、进食肉类、猪肝等食物

答案：D

29、支气管扩张的主要发病因素是 () A、先天性发育缺损 B、有害气体的吸入 (大气污染) C、长期大量的吸烟 D、支气管肺组织的感染和支气管阻塞

答案：D

30、急性胰腺炎患者多数需禁食 () A、不超过 12 小时 B、1~3 天 C、4~5 天 D、5~7 天

答案：B

31、交感神经兴奋时循环系统的表现是 () A、心率减慢，血压降低 B、心率加快，血压升高 C、心率减慢，血压升高 D、心率加快，血压降低

答案：B

32、ARDS 的肺水肿属于 () A、心源性肺水肿 B、神经性肺水肿 C、中毒性肺水肿 D、渗透性肺水肿

答案：D

33、对于心绞痛症状描述，不正确的是 () A、疼痛部位主要在胸骨体中上段之后，或心前区，界限不很清楚，常放射至其它部位 B、疼痛性质常为压迫性、憋闷感或紧缩样感，也可有烧灼感 C、疼痛性质针刺或刀割样锐性痛，偶伴濒死感 D、常见诱因因为体力劳动、情绪激动、寒冷等

答案：C

34、慢性呼吸衰竭最常见的病因是 () A、重症肺结核 B、胸廓病变 C、阻塞性肺疾病 D、肺间质纤维化

答案：C

35、消化性溃疡最常见的并发症是 () A、出血 B、感染 C、幽门梗阻 D、癌变

答案：A

36、引起肺炎的病原体主要是 () A、细菌 B、病毒 C、支原体 D、真菌

答案：A

37、上消化道出血最常见的病因是 () A、消化性溃疡 B、胆道疾病 C、贲门黏膜撕裂症 D、肝硬化食道静脉曲张破裂

答案：A

38、左心功能不全的典型表现是 () A、肝肿大 B、胸痛 C、呼吸困难 D、少尿

答案：C

39、胃溃疡节律性疼痛的特点是 () A、餐后半小时至一小时出现疼痛 B、空腹疼 C、餐时疼 D、夜间疼

答案：A

40、长期卧床的心力衰竭病人，其水肿最易出现的部位是 () A、胫前 B、踝部 C、腹部 D、腰骶部

答案：D

41、男性，35 岁，有胃溃疡病史，今日早餐后突然上腹部疼痛，拒按。查体：全腹呈板状硬，可能的诊断为 () A、阑尾炎 B、胰腺炎 C、胆囊炎 D、溃疡穿孔

答案：D

42、下列关于正常窦性心律的描述，错误的是 () A、冲动起源于窦房结 B、频率为 60~100 次/分 C、心率绝对匀齐 D、PR 间期 0.12~0.20 秒

答案：C

43、下列有关心脏传导系统的叙述，错误的是 () A、心脏正常的起搏点位于窦房结 B、心脏传导系统的主要功能是产生并传导冲动，维持心脏正常节律 C、传导系统由窦房结、结间束、房室结、希斯束、左右束支和浦肯野氏纤维 D、只有窦房结能发出冲动，引起心脏收缩

答案：D

44、心脏的营养供应是来自 () A、主动脉 B、肺动脉 C、颈动脉 D、冠状动脉

答案：D

45、临床上最常见的心律失常为 () A、阵发性心动过速 B、过早搏动 C、房颤 D、室颤

答案：B

46、心脏骤停早期诊断最佳指标是 () A、瞳孔突然明显散大 B、测不到血压 C、颈动脉和股动脉搏动消失 D、呼吸停止

答案：C

47、急性心梗病人突然出现明显呼吸困难，两肺满布湿啰音，心率 100 次/分，律齐。此时首先应考虑的诊断是 () A、肺部感染 B、肺梗塞 C、急性左心衰 D、心脏破裂

答案：C

48、肝硬化最突出的临床表现是 () A、蜘蛛痣 B、腹水 C、脾肿大 D、腹壁静脉曲张

答案：B

49、肝性脑病前驱期的临床表现有 () A、可有扑翼样震颤 B、脑电图异常 C、定向力减退 D、昏睡

答案：A

50、男性，34 岁，腹泻 8 年，每日 3 次无脓血，无发热，结肠镜检查：直肠、乙状结肠黏膜多发浅溃疡，伴充血，水肿，诊断应为 () A、肠结核 B、疑诊为溃疡性结肠炎 C、确诊为溃疡性结肠炎 D、胃肠功能紊乱

答案：C