

## 单选题

1、1999年世界卫生组织和国际高血压学会(WHO/ISH)制定和修改的新的正常人血压标准为( )

正确选项 1. BP<130/85mmHg(V)

2、25岁男性支气管哮喘病人,于一阵剧烈咳嗽后,出现短暂意识丧失,应考虑的诊断是( )

正确选项 1. 咳嗽性晕厥(V)

3、病人体力活动明显受限,轻于日常的活动即可引起乏力、心悸、呼吸困难,说明此时病人心功能处于( )

正确选项 1. III级(V)

4、不符合急性胰腺炎腹痛的特征是( )

正确选项 1. 进食后疼痛可缓解(V)

5、大咯血病人发生窒息时,首要的护理措施是( )

正确选项 1. 维持气道通畅(V)

6、典型心肌梗塞与典型心绞痛病人在症状上最大区别是( )

正确选项 1. 疼痛的时间(V)

7、典型心绞痛病人含用硝酸甘油后疼痛缓解时间多在( )

正确选项 1. 1-5分钟(V)

8、窦性心动过速的频率范围多为( )

正确选项 1. 100~150次/分(V)

9、对肺癌的诊断及分型具有重要意义的检查方法是( )

正确选项 1. 纤维支气管镜检查(V)

10、对怀疑有心梗的病人,入院时最主要的护理评估内容是( )

正确选项 1. 血清心肌酶水平(V)

11、肺心病的最常见的死亡原因是( )

正确选项 1. 肺性脑病(V)

12、肺性脑病不能用高浓度吸氧的主要原因是( )

正确选项 1. 解除了颈动脉窦的兴奋性(V)

13、风湿性心瓣膜病心房颤动的病人,若发生栓塞,最多见的部位是( )

正确选项 1. 脑动脉(V)

14、肝性脑病病人恢复期护理措施中,最主要的是( )

正确选项 1. 防止各种诱发因素(V)

15、肝性脑病的发病机制是( )

正确选项 1. 上述多种因素综合作用所致(V)

16、肝性脑病患者使用精氨酸的目的是( )

正确选项 1. 与游离氨结合,从而降低血氨(V)

17、肝性脑病前驱期的临床表现有( )

正确选项 1. 可有扑翼样震颤(V)

18、肝性脑病时出现的震颤为( )

正确选项 1. 扑翼样震颤(V)

19、肝性脑病最早出现的症状是( )

正确选项 1. 性格和行为异常(V)

20、肝硬化最突出的临床表现是( )

正确选项 1. 腹水(V)

21、急性肾小球肾炎的治疗原则是( )

正确选项 1. 以休息及对症处置为主(V)

22、急性心梗病人突然出现明显呼吸困难,两肺满布湿啰音,心率100次/分,律齐。此时首先应考虑的诊断是( )

正确选项 1. 急性左心衰(V)

23、急性胰腺炎禁用的镇痛药物是( )

正确选项 1. 吗啡(V)

24、急性左心功能不全,高度呼吸困难,烦躁不安时立即给予( )

正确选项 1. 吗啡皮下注射(V)

25、急性左心功能不全发生时,病人需采取的体位是( )

正确选项 1. 坐位,两腿下垂(V)

26、甲亢时最有诊断意义的体征是( )

正确选项 1. 弥漫性甲状腺肿伴血管杂音(V)

27、交感神经兴奋时循环系统的表现是( )

正确选项 1. 心率加快,血压升高(V)

28、溃疡性结肠炎最严重的并发症是( )

正确选项 1. 中毒性结肠扩张(V)

29、慢性肺心病心衰病人最常见的护理诊断是( )

正确选项 1. 体液过多(V)

30、慢性肺心病最常见的病因是( )

正确选项 1. 慢性阻塞性肺疾病(V)

31、慢性呼吸衰竭最常见的病因是( )

正确选项 1. 阻塞性肺疾病(V)

32、慢性肾炎临床表现错误的是( )

正确选项 1. 不会导致肾功能不全(V)

33、慢性肾炎治疗的主要目的是( )

正确选项 1. 防止或延缓肾功能衰竭(V)

34、慢性心衰患者常易诱发心衰的因素是( )

正确选项 1. 肺部感染(V)

35、慢性支气管炎最常见的并发症是( )

正确选项 1. 阻塞性肺气肿(V)

36、慢性支气管炎最主要的病因是( )

正确选项 1. 长期吸烟(V)

37、目前发现心肌缺血及诊断心绞痛最常用的无创性检查方法是( )

正确选项 1. 心电图(V)

38、男性,30岁,阵发性心悸2年,每次突然发生,持续30分钟~1小时不等。查体:心率200次/分,律齐,心电图示:QRS波型正常,P波不能明确查见,诊断为( )

正确选项 1. 阵发性室上性心动过速(V)

39、男性,34岁,腹泻8年,每日3次无脓血,无发热,结肠镜检示:直肠、乙状结肠黏膜多发浅溃疡,伴充血,水肿,诊断应为( )

正确选项 1. 确诊为溃疡性结肠炎(V)

40、男性,35岁,有胃溃疡病史,今日早餐后突然上腹部疼痛,拒按。查体:全腹呈板状硬,可能的诊断为( )

正确选项 1. 溃疡穿孔(V)

41、男性,56岁,患高血压性心脏病6年,近一年来,每天从事原有日常活动时出现心悸,气短,休息后好转,可判定为( )

正确选项 1. 心功能II级(V)

42、女性,30岁,5天前淋雨后发冷发热、胸痛、咳嗽、气短,既往有结核病史。查体:左肺下部叩浊,可闻水泡音,痰结核菌集菌阴性,白细胞 $32 \times 10^9/L$ ,胸片左肺下叶大片状致密阴影,考虑诊断为( )

正确选项 1. 肺炎球菌肺炎(V)

43、女性,35岁,既往风湿性关节炎病史10年,劳累后心悸、气促4年,近来加重,夜间不能平卧。查体:心尖部隆隆样杂音,肺底可听到细小水泡音,腹胀,双下肢浮肿。该患者心功能不全的类型为( )

正确选项 1. 全心功能不全(V)

44、判断糖尿病控制程度较好的指标是( )

正确选项 1. 糖化血红蛋白(V)

45、缺血性心脏病最常见的病因是( )

正确选项 1. 冠状动脉粥样硬化(V)

46、确诊消化性溃疡出血最可靠的方法是( )

正确选项 1. 急诊胃镜检查(V)

47、上消化道出血最常见的病因是( )

正确选项 1. 消化性溃疡(V)

48、肾病综合征最常见的并发症是( )

正确选项 1. 感染(V)

49、特发性血小板减少性紫癜首选治疗是( )

正确选项 1. 糖皮质激素(V)

50、为预防结核病的发生与流行,最关键的措施是( )

正确选项 1. 合理化疗治愈肺结核排菌病人(V)

51、胃溃疡节律性疼痛的特点是( )

正确选项 1. 餐后半小时至一小时出现疼痛(V)

52、我国急性胰腺炎最常见的病因是( )

正确选项 1. 胆道疾病(V)

53、西咪替丁治疗消化性溃疡的机理是( )

正确选项 1.  $H_2$ 受体拮抗剂(V)

54、下列方法用于治疗窦性心动过缓,除了( )

正确选项 1. 喘定(V)

55、下列各因素均是粘膜的损害因素,除了( )

正确选项 1. 前列腺素(V)

56、下列关于肝性脑病的治疗,错误的是( )

正确选项 1. 肥皂水灌肠(V)

57、下列心功能不全治疗方案中,可以起到减轻心脏负荷作用的是( )

正确选项 1. 以上都可以(V)

58、消化性溃疡的主要症状是( )

正确选项 1. 上腹疼痛(V)

59、心肌梗死 24 小时内应避免使用的药物是 ( )  
正确选项 1. 洋地黄(V)

60、心绞痛病人在接受硝酸甘油静脉点滴治疗时, 出现颜面潮红, 头痛症状, 应向患者解释 ( )  
正确选项 1. 硝酸甘油致头面部血管扩张所致, 是常见副作用(V)

61、心绞痛发作的典型部位是 ( )  
正确选项 1. 胸前区向上臂放散(V)

62、心衰患者使用利尿剂的目的是 ( )  
正确选项 1. 减轻心脏前负荷(V)

63、心脏的营养供应是来自 ( )  
正确选项 1. 冠状动脉(V)

64、心脏的正常起搏点位于 ( )  
正确选项 1. 窦房结(V)

65、心脏骤停的诊断要点不包括 ( )  
正确选项 1. 心电图显示室性心动过速(V)

66、心脏骤停复苏后最易出现 ( )  
正确选项 1. 脑损伤(V)

67、心脏骤停早期诊断最佳指标是 ( )  
正确选项 1. 颈动脉和股动脉搏动消失(V)

68、血管扩张药治疗心功能不全的主要机制是 ( )  
正确选项 1. 降低心脏前、后负荷(V)

69、一病人呕吐症状重, 且呕吐量大, 并含有隔夜食物及腐臭味, 此时应考虑可能的诊断是 ( )  
正确选项 1. 幽门梗阻(V)

70、易并发中毒性结肠扩张的疾病是 ( )  
正确选项 1. 溃疡性结肠炎(V)

71、引起肺炎的病原体主要是 ( )  
正确选项 1. 细菌(V)

72、引起肝性脑病患者血氨增高的因素, 不包括 ( )  
正确选项 1. 过度精神紧张(V)

73、由于心排出量突然下降而出现的晕厥称为 ( )  
正确选项 1. 阿-斯综合征(V)

74、右心功能不全时较早出现的临床表现是 ( )  
正确选项 1. 颈静脉充盈和怒张(V)

75、预防哮喘发作最有效的措施是 ( )  
正确选项 1. 回避激发因素(V)

76、再障最主要的诊断依据是 ( )  
正确选项 1. 骨髓增生不良(V)

77、长期卧床的心力衰竭病人, 其水肿最易出现的部位是 ( )  
正确选项 1. 腰骶部(V)

78、诊断急性肺水肿最具有特征意义的依据是 ( )  
正确选项 1. 严重呼吸困难伴粉红色泡沫样痰(V)

79、诊断胃溃疡恶变最有价值的是 ( )  
正确选项 1. 胃镜见溃疡形状不规则, 底部凹凸不平(V)

80、诊断右心功能不全时, 最可靠的体征是 ( )

正确选项 1. 肝颈静脉回流征阳性(V)

81、正常人消化道内铁吸收率最高的部位是 ( )  
正确选项 1. 十二指肠及空肠上部(V)

82、支气管扩张的主要发病因素是 ( )  
正确选项 1. 支气管肺组织的感染和支气管阻塞(V)

83、支气管扩张症的治疗主要是 ( )  
正确选项 1. 保持呼吸道通畅和控制感染(V)

84、支气管扩张症最常见的病因是 ( )  
正确选项 1. 婴幼儿期的麻疹、支气管肺炎(V)

85、治疗肺炎球菌肺炎最常用的抗生素是 ( )  
正确选项 1. 青霉素(V)

86、治疗肝性脑病时, 灌肠时禁用 ( )  
正确选项 1. 肥皂水(V)

87、治疗洋地黄中毒伴心率缓慢者时宜选用 ( )  
正确选项 1. 阿托品(V)

88、左心功能不全的典型表现是 ( )  
正确选项 1. 呼吸困难(V)

89、左心功能不全与支气管哮喘的主要鉴别点为 ( )  
正确选项 1. 坐起时能够缓解呼吸困难(V)

90、Oddi 括约肌位于 ( )  
正确选项 1. 十二指肠(V)

91、不同病期溃疡性结肠炎患者均具有的症状是 ( )  
正确选项 1. 腹泻(V)

92、大便隐血试验呈阳性时, 上消化道出血的量最少达到 ( )  
正确选项 1. 5ml(V)

93、对于溃疡性结肠炎病人腹泻的护理, 错误的是 ( )  
正确选项 1. 高热量、高维生素、高纤维素饮食(V)

94、对于痰液过多且无力咳嗽的患者, 为防止窒息, 护士在翻身前首先应 ( )  
正确选项 1. 给患者吸痰(V)

95、对于心绞痛症状描述, 不正确的是 ( )  
正确选项 1. 疼痛性质针刺或刀割样锐性痛, 偶伴濒死感(V)

96、对于心源性水肿病人的护理诊断, 不正确的是 ( )  
正确选项 1. 尿潴留(V)

97、恶性程度最高的肺癌是 ( )  
正确选项 1. 小细胞肺癌(V)

98、房颤患者出现的脉搏短绌是指 ( )  
正确选项 1. 脉率少于心率(V)

99、肝硬化患者消化系统特征性的症状是 ( )  
正确选项 1. 厌油腻食物(V)

100、关于上消化道出血的叙述, 错误的是 ( )  
正确选项 1. 均有黑便和呕血(V)

101、关于痛风的治疗, 错误的是 ( )  
正确选项 1. 急性痛风性关节炎期迅速给予糖皮质激素(V)

102、呼吸衰竭时的氧疗, 错误的是 ( )  
正确选项 1. 氧疗的目标是使患者的 PaO<sub>2</sub> 维持在正常范围(V)

103、患者, 女性, 40 岁, 不明原因牙龈渗血 3 月, 月经量增多, 诊断为特发性血小板减少性紫癜, 下列实验室检查不支持该诊断的是 ( )  
正确选项 1. 出血时间正常(V)

104、患者的大便呈黑便, 提示其出血量最少约为 ( )  
正确选项 1. 50ml(V)

105、急性胰腺炎患者多数需禁食 ( )  
正确选项 1. 1~3 天(V)

106、克罗恩病最常见的并发症是 ( )  
正确选项 1. 肠梗阻(V)

107、临床上最常见的心律失常为 ( )  
正确选项 1. 过早搏动(V)

108、判断肺结核病人有无传染性的依据是 ( )  
正确选项 1. 查痰结核菌(V)

109、双相波非同步电除颤的能量选择是 ( )  
正确选项 1. 150~200J(V)

110、下列不属于肝性脑病发生诱因的是 ( )  
正确选项 1. 腹泻(V)

111、下列不属于门脉高压症临床表现的是 ( )  
正确选项 1. 肝掌(V)

112、下列药物不会引起肝功能损害的是 ( )  
正确选项 1. 乙胺丁醇(V)

113、下列易发生洋地黄中毒的原因中, 不准确的是 ( )  
正确选项 1. 机体代谢率明显增高时(V)

114、下列易于诱发革兰阴性杆菌肺炎的因素中, 错误的是 ( )  
正确选项 1. 静脉输液(V)

115、下列有关糖尿病的饮食治疗, 正确的是 ( )  
正确选项 1. 无论病情轻重都需饮食治疗(V)

116、消化性溃疡药物治疗中抑酸作用最强的是 ( )  
正确选项 1. 奥美拉唑(V)

117、消化性溃疡最常见的并发症是 ( )  
正确选项 1. 出血(V)

118、胰岛素最常见的不良反应是 ( )  
正确选项 1. 低血糖反应(V)

119、由心脏病引起的心脏骤停中, 最常见的病因是 ( )  
正确选项 1. 冠心病(V)

120、有关高血压病患者的饮食护理, 不正确的是 ( )  
正确选项 1. 进食肉类、猪肝等食物(V)

121、与消化性溃疡复发关系最为密切的病原菌是 ( )

正确选项 1. 幽门螺旋杆菌 (V)

122、在心跳呼吸骤停紧急处理原则中, 错误的是 ( )

正确选项 1. 首先必须心电图确诊, 然后处理 (V)

123、诊断呼吸衰竭最主要的依据是 ( )

正确选项 1. 血气分析 (V)

124、诊断肾病综合征所必须的条件是 ( )

正确选项 1. 大量蛋白尿+低蛋白血症 (V)

125、ARDS 的肺水肿属于 ( )

正确选项 1. 渗透性肺水肿 (V)

126、高热病人饮食及入量护理措施中, 不正确的是 ( )

正确选项 1. 出汗多时应多饮糖水 (V)

127、护理服用洋地黄制剂的病人时, 不正确的措施为 ( )

正确选项 1. 如果上一顿药物漏服, 下一顿应加倍剂量 (V)

128、急性心肌梗塞伴发室性早搏的患者, 控制室早应首选的药物是 ( )

正确选项 1. 利多卡因 (V)

129、慢性肺心病病人痰液黏稠, 首选的治疗措施是 ( )

正确选项 1. 雾化吸入 (V)

130、慢性肺心病急性加重期的最常见诱因是 ( )

正确选项 1. 呼吸道感染 (V)

131、慢性肾盂肾炎患者经系统治疗, 尿常规已正常, 为判断治疗效果, 还应做的检查是 ( )

正确选项 1. 尿细菌培养 (V)

132、男性, 65 岁, 诊断为急性心肌梗死入院, 住院第 3 天患者突然呼吸困难, 青紫, 神志不清, 四肢抽搐, 听诊心音消失, 颈动脉搏动消失。此时首选 ( )

正确选项 1. 胸外心脏按压及人工呼吸 (V)

133、男性, 67 岁, 原有肺心病, 受凉后加重, 咳脓性痰, 伴发热、烦躁、呼吸困难, 入院前 4 小时神志模糊, 嗜睡。查体: 明显发绀, 昏迷, 血压 100/60mmHg, 无病理反射。可能的并发症是 ( )

正确选项 1. 肺性脑病 (V)

134、女性, 24 岁, 突然出现尿频尿痛进而发热, 化验尿常规蛋白 (+), 红细胞 5-7 个/HP, 白细胞 20-30 个/HP。诊断为急性肾盂肾炎, 感染途径考虑为 ( )

正确选项 1. 上行感染 (V)

135、下列关于心脏骤停抢救的叙述, 错误的是 ( )

正确选项 1. 注意头部保暖, 以利于扩张头部血管增加血流量 (V)

136、下列关于正常窦性心律的描述, 错误的是 ( )

正确选项 1. 心率绝对匀齐 (V)

137、下列有关心悸内容的叙述, 错误的是 ( )

正确选项 1. 心悸的出现表明心脏有器质性病变 (V)

138、下列有关心律失常护理的描述, 错误的是 ( )

正确选项 1. 一旦发现病人出现室速必须立即进行电除颤 (V)

139、下列有关心脏传导系统的叙述, 错误的是 ( )

正确选项 1. 只有窦房结能发出冲动, 引起心脏收缩 (V)

140、下列有关循环系统的调节的叙述, 不妥的是 ( )

正确选项 1. 钾离子可起到加强心肌收缩力的作用 (V)

141、下列有利于室性心动过速与室上性心动过速鉴别的选项是 ( )

正确选项 1. 心电图有心室夺获及室性融合波 (V)

142、下列与洋地黄中毒无关的选项是 ( )

正确选项 1. 右束支传导阻滞 (V)

143、下列诊断支气管哮喘的依据中, 错误的是 ( )

正确选项 1. 阵发性吸气性呼吸困难 (V)

144、下面关于胃溃疡的叙述, 不正确的是 ( )

正确选项 1. 节律性上腹痛 (V)

145、限制钠盐摄入、运动等非药物治疗方法适用于 ( )

正确选项 1. 全部高血压病患者 (V)

146、消化性溃疡所引起的疼痛, 最具有特点是 ( )

正确选项 1. 节律性疼痛 (V)

147、休克的最主要特征是 ( )

正确选项 1. 组织微循环灌流量锐减 (V)

148、长期血压增高容易引起一些脏器出现并发症, 这些脏器是 ( )

正确选项 1. 心、脑、肾 (V)

149、左心功能不全时, 肺部啰音的特点是 ( )

正确选项 1. 湿啰音常见于两肺底, 并随体位变化而改变 (V)