

《调剂学（本）》课程复习题

一、单项选择题

1. 以下名词的英文缩写不正确的是（ D ）。
 - A. 世界卫生组织 WHO
 - B. 中国药学会医院药学专业委员会 CPAHP
 - C. 国际药学联合会 FIP
 - D. 优良药房工作规范 GMP
2. 促进处方开具、调剂、使用、保存的规范化管理，提高处方质量，促进合理用药，保障患者用药安全的法规是（ D ）。
 - A. 《优良药房工作规范》
 - B. 《处方管理办法》
 - C. 《医疗机构药事管理规定》
 - D. 《医疗机构处方审核规范》
3. 按照《处方管理办法》，处方类别应标明在处方的（ C ）。
 - A. 左上角
 - B. 左下角
 - C. 右上角
 - D. 右下角
4. 关于非处方药品，以下描述不正确的是（ A ）。
 - A. 乙类非处方药须在药房由执业药师或药师指导下购买和使用
 - B. 甲类非处方药品是在具有药品经营许可证配备执业药师或药师以上技术人员的社会药店和医疗机构药房零售的非处方药品
 - C. 可以在经过批准的普通零售商业企业销售的非处方药是乙类非处方药品
 - D. 乙类非处方药安全性更高，无需医师或药师的指导就可以购买和使用
5. 国家药物政策的基本目标不包括（ D ）。
 - A. 药物可供应性

- B. 药物可获得性
C. 保证向公众提供安全、有效、质量合格的药品
D. 促进药品使用量
6. 药师誓言不包括的是（ D ）。
- A. 友爱同仁，尊崇感戴师长 B. 倾我所能，保障用药安全
C. 尽心尽责，服务病患大众 D. 追求新知，提升自我实现能力
7. 社会药房的药品陈列不正确的是（ C ）。
- A. 药品与非药品分开摆放
B. 易串味的药品与一般药品应分开摆放
C. 内服药可与外用药一起存放
D. 按照规定的储存条件存放
8. 从事门诊药房的调剂人员应是（ A ）。
- A. 药学专业院校毕业，并取得相应的药学专业技术职务任职资格的药师
B. 医学专业院校毕业，并取得相应的临床医学专业技术职务任职资格的医师
C. 护理专业院校毕业，并取得相应的护理学专业技术职务任职资格的护士
D. 医学专业院校毕业，并取得执业药师任职资格的药师
9. 非药学技术人员在经过药学专业知识培训后，可从事的药学工作是（ C ）。
- A. 处方调配 B. 处方发药交代
C. 处方统计 D. 处方发药
10. 医疗机构的药剂人员调配处方，不正确的是（ C ）。
- A. 处方必须经过核对 B. 拒绝调配有配伍禁忌处方
C. 更改有错误的处方 D. 发放合格的药品
11. 以下调剂服务模式反映了当代调剂学发展方向的是（ A ）。

A. 知识与技术服务和科研教学型 B. 知识与技术服务型

C. 单纯供应服务型 D. 单纯科研教学型

12. 医师开具处方和药师调剂处方应当遵循（ A ）。

A. 安全、有效、经济和适宜的原则 B. 安全、有效的原则

C. 速效、有效、适宜的原则 D. 安全、有效、适宜的原则

13. 以下说法不正确的是（ C ）。

A. 药师不得擅自更改或者代用处方药品

B. 药品应按药品说明书上的温度要求进行贮存

C. 处方审核、调配、复核、发药均完成之后，再统一由操作者签字或签章

D. 发药时应逐个药品交待使用方法与注意事项

14. 关于住院药房医嘱审核的叙述，正确是（ A ）。

A. 药师应对医嘱的药物过敏相关问题、药物用法用量相关问题、给药途径相关问题、有无重复用药、药物相互作用和配伍禁忌等问题进行审核

B. 药师应对医嘱的药物过敏相关问题、药物用法用量相关问题、给药频度、有无重复用药、药物相互作用和配伍禁忌等问题进行审核

C. 药师应对医嘱的药物过敏相关问题、药物用法用量相关问题、给药途径相关问题、药物使用经济性、药物相互作用和配伍禁忌等问题进行审核

D. 药师应对医嘱的药物过敏相关问题、药物选择是否正确、给药途径相关问题、有无重复用药、药物相互作用和配伍禁忌等问题进行审核

15. 以下对缓 / 控释制剂特点的描述不正确的是（ C ）。

A. 给药次数少 B. 减少了波峰波谷现象

C. 增加了用药总剂量 D. 药物含量大

16. 以下可以掰开服用的剂型是（ D ）。

A. 缓释胶囊 B. 控释片

C. 肠溶片 D. 中间有划痕的控释片

17. 2007年5月1日起施行的《处方管理办法》对小儿处方的书写有明确要求，第六条规定新生儿、婴幼儿写日、月龄，必要时注明（ C ）。

- A. 性别
- B. 种族
- C. 体重
- D. 身高

18. 药师调剂小儿处方时需要注意的事项，不正确的是（ C ）。

- A. 做到“四查十对”
- B. 对小儿的用药剂型和用药剂量要特别关注
- C. 为方便患儿服用，可提示家长将肠溶片研碎给孩子冲服
- D. 重视小儿的日龄、月龄及体重

19. 药师对肝功能不全患者用药的调剂原则，不正确的是（ B ）。

- A. 要严格按照操作规程调剂处方，做到“四查十对”
- B. 要对肝功能不全患者进行用药教育，告知患者绝对不能使用对肝脏有损害的药物
- C. 教育患者注意药物的相互作用，避免或减少肝毒性药物的合并使用
- D. 教育患者养成良好的生活习惯，避免烟酒给身体带来的危害

20. 药师对肾功能不全患者使用对肾脏损害的药物进行调剂时，不正确的是（ A ）。

- A. 青霉素、头孢菌素、林可霉素和异烟肼等药物通过肾脏排泄，对肾脏毒性较大，应调整剂量或监测血药浓度
- B. 应尽量采用对肾损害较小的药物来替代，切不可滥用
- C. 可用减少剂量法，即首剂用量不变，给药间隔不变，但维持剂量减少
- D. 可用延长间隔法，即药物用量不变，但给药间隔延长

21. 装填胶囊的操作，不正确的叙述是（ B ）。

- A. 将固体药粉平铺在适当的平面上轻压紧
- B. 药粉厚度为囊体高度的 $1/5 \sim 1/4$
- C. 戴指套，捏住胶囊体节，切口向下插入物料层

A. 合理用药监测系统不能在单机上独立应用，但可以作为 HIS 的一个组成部分，嵌入 HIS 系统的医生工作站、护士工作站、临床药学工作站和静脉配置中心工作站等子系统中

B. 合理用药监测系统可以进行药物过敏史和注射剂配伍审查

C. 合理用药监测系统不能提示处方药品是否存在与患者病理生理状态相关联的禁忌证和不良反应

D. 合理用药监测系统一般不能提供医药专业信息的在线查询

29. 按《抗菌药物临床应用管理办法》，价格昂贵的抗菌药物是（ C ）。

A. 限制使用级

B. 非限制使用级

C. 特殊使用级

D. 禁止使用级

30. 妊娠禁用药为毒性中药，凡禁用的中药绝不能使用，下列中药材或中药饮片属于妊娠禁用药的是（ C ）。

A. 三七

B. 大黄

C. 巴豆

D. 红花

31. 以下论述不正确的论述是（ C ）。

A. 药师正逐渐从简单的手工调剂工作解放出来，调剂工作的内涵更多地体现在药师

的智力活动中

B. 临床药学是以临床医学和药学为基础，以患者利益为核心，以保障患者临床用药安

全、有效、经济为主要工作内容的应用科学

C. 调剂学基本任务是为了创造在一定时间内用最少的药物剂量提供最大的疗效、最

小的不良反应和最为适宜的给药系统，为满足医疗卫生工作的需要提供质量优良

的药物制剂

D. 药师已不再只是药品的供应和调剂者，无论在医院药房或社会药房，药师都是提供

医疗卫生保健队伍中的一员

32. 关于处方种类与处方颜色，以下表述正确的是(B)。

- A. 急诊处方为白色 B. 儿童处方为淡绿色
C. 第二类精神处方为淡黄色 D. 急诊处方为淡红色

33. 麻醉药品、第一类精神药品处方的右上角标明的文字是(C)。

- A. 麻、精 B. 一精、麻
C. 麻、精一 D. 麻醉、精一

34. 普通处方、急诊处方、儿科处方药品保存期限为(A)。

- A. 1 年 B. 2 年
C. 3 年 D. 永久

35. 非处方药分甲乙二类，分类依据是药品的(C)。

- A. 专属性 B. 经济学
C. 安全性 D. 给药途径

36. 医院药房开办条件不包括(C)。

- A. 医疗机构执业许可证 B. 执业医师执业许可证
C. 执业药师许可证 D. 必要的房屋设施

37. 下列规范性文件中法律效力最强的是(B)。

- A. 《抗菌药物临床应用管理原则》 B. 《麻醉药品和精神药品管理条例》

- C. 《医疗机构药事管理规定》 D. 《处方管理办法》

38. 医院药师要承担的工作不包括(D)。

- A. 新药的遴选、引进
B. 为患者提供安全、有效、价格合理的药品
C. 开展患者处方的审方工作

D. 和临床医生一起诊断患者

39. 下列药品中，在药品标签和说明书中不需要印有特殊标识的是(B)。

A. 医疗用毒性药品 B. 含特殊药品的复方制剂

C. 外用药 D. 麻醉药品和精神药品

40. 抗菌药物调剂资格取消后，在多久内不得恢复其药物调剂资格(C)。

A. 2年内 B. 1年内

C. 半年内 D. 3个月内

41. 国家对药品实行分类管理制度，将药品分为(C)。

A. 特殊药品和一般药品 B. 化学药品和生物制品

C. 处方药和非处方药 D. 新药和上市药品

42. 下列处方书写不符合规则的是(D)。

A. 字迹清楚，不得涂改；如需修改，应当在修改处签名并注明修改日期

B. 不得使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句

C. 西药和中成药可以开具一张处方，中药饮片应当单独开具处方

D. 开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方不得超过3种药品

43. 社会药房处方审核人员是(C)。

A. 坐堂医生 B. 药学技术人员

C. 执业药师 D. 药师以上的药学技术人员

44. 关于药物漏服的说法正确的是(D)。

A. 药物漏服后不用再补服

B. 药物漏服后应立即补服

C. 药物漏服后应在下次服药时将两次剂量合并服用

D. 药物漏服后应视漏服的药品和漏服的时间来确定是否需要补服

45. 口服下列药物时不宜多饮水的是(C)。

A. 硝苯地平控释片 B. 阿仑膦酸钠

C. 川贝止咳糖浆 D. 复方新诺明

46. 以下剂型中，用水吞服时易发生危险的是(B)。

A. 舌下含片 B. 泡腾片

C. 咀嚼片 D. 分散片

47. 滴眼剂使用方法不正确的是(B)。

A. 若同时使用二种滴眼剂，应间隔 10 分钟

B. 先滴患眼，后滴健眼

C. 滴眼剂开封后连续使用 1 个月应不再使用

D. 滴眼剂不应与他人混用。

48. 喹诺酮类药物的禁用范围是(D)。

A. 新生儿 B. 婴幼儿

C. 8 岁以下儿童 D. 18 岁以下儿童

49. 药师在给老年人调剂处方时，不正确的做法是(A)。

A. 老年患者由于记忆力减退，口头交代后很快忘记，故可不进行口头交代

B. 在药品的外包装上详细注明药品的用法用量以提高患者用药的依从性

C. 对记忆力差又无人照看的老人可采用单剂量调配，以保证患者不漏服、错服药物

D. 对记忆力差又无人照看的老人可使用药品分装格，将每日药品事先分装好，以免老年患者忘记

50. 溶液量取要求不正确的是(D)。

A. 读数时，视线应与液体凹液面最低点水平相切

B. 读数时，量器应垂直摆放

C. 尽量倾尽量器中的液体

D. 量取 15 ml 的液体，应选用容量为 50 ml 的量筒

51. 关于药品分装胶囊，不正确的叙述是(C)。
- A. 分装目的是掩盖药物不适宜臭味
 - B. 将粉末状或颗粒状药物装于胶囊中
 - C. 胶囊号越大的装载量越大
 - D. 胶囊规格选择通常选一个剂量使胶囊装满的最小规格
52. 用药咨询服务需重点关注的患者是(D)。
- A. 患有多种疾病或药物治疗方案复杂、效果不佳的患者
 - B. 特殊病生理条件的患者
 - C. 有药物不良反应史的患者
 - D. 以上都是
53. 医生在开具处方时点错了小数点，可能是属于(C)。
- A. 药物错误
 - B. 给药错误
 - C. 剂量错误
 - D. 给药途径错误
54. 医生欲开具氧氟沙星片 0.1X35 片, 5 片, qd, 结果写成氧氟沙星片 0.5X35 片, 5 片, qd。按技术类型分, 这属于(D)。
- A. 信息传递错误
 - B. 其他错误
 - C. 剂型错误
 - D. 剂量错误
55. 需要单独设库储存的药品是(C)。
- A. 化学药品
 - B. 中成药
 - C. 中药饮片
 - D. 注射剂
56. 关于非限制使用级抗菌药物, 以下描述不正确的是(C)。
- A. 长期临床应用证明安全、有效
 - B. 对病原菌耐药性较小
 - C. 价格相对较高
 - D. 列入基本药物目录品种
57. 以下处方保存时限不正确的是(B)。
- A. 医疗用毒性药品处方保存 2 年
 - B. 麻醉药品处方保存 5 年
 - C. 第一类精神药品处方保存 3 年
 - D. 儿科处方保存 1 年

58. 不属于门诊药房调剂智能化系统的特点的是(A)。

- A. 提高经济效益
- B. 减少调剂错误
- C. 提高工作效率
- D. 改善服务质量

59. 并开药名即一名多药，是将多种疗效基本相似或有协同作用的饮片缩写在一起而构

成的药名。多种包含的药物种类有(B)。

- A. 1-2 种
- B. 2-3 种
- C. 4-5 种
- D. 6-7 种

60. 与川乌、草乌、附子不宜同用的药物是(C)。

- A. 益母草
- B. 马钱子
- C. 半夏
- D. 虎杖

61. 以下名词的英文缩写不正确的是(D)。

- A. 世界卫生组织 WHO
- B. 中国药学会医院药学专业委员会 CPAHP
- C. 国际药学联合会 FIP
- D. 优良药房工作规范 GMP

62. 下面对调剂学的描述正确的是(D)。

A. 综合应用社会学、行为学、管理学以及临床医药学、生物科学等学科的最新知识以保障、改善患者药物治疗的科学

B. 它的任务是研究药物的使用，监督和组织协调药物、患者和社会之间的关系

C. 以临床医师和患者为服务对象，涉及医院药品供应、调剂、制剂、药品检验、药事管理及临床药学的药学分支学科

D. 一门以患者为中心、以处方（或医嘱）为导向，以药学诸学和相关人

文科学为基础的综合性、应用性学科

63. 医师开具处方和药师调剂处方应当遵循（ A ）。

- A. 安全、有效、经济和适宜的原则
- B. 安全、有效的原则
- C. 速效、有效、适宜的原则
- D. 安全、有效、适宜的原则

64. 关于处方药和非处方药的分类管理，说法正确的是（ C ）。

- A. 按药品品种、规格、适应证和疗效的不同分类
- B. 按药品类别、规格、适应证和成本效益比的不同分类
- C. 按药品品种，包装规格、适应证、剂量和给药途径的不同分类
- D. 按药品品种、规格、给药途径及疗效的不同分类

65. 非处方药分甲乙二类，分类依据是药品的（ C ）。

- A. 专属性
- B. 经济学
- C. 安全性
- D. 给药途径

66. 医院药房开办条件不包括（ C ）。

- A. 医疗机构执业许可证
- B. 执业医师执业许可证
- C. 执业药师许可证
- D. 必要的房屋设施

67. 医院药房遵守的有关处方管理法规不包括（ B ）。

- A. 《药品管理法》
- B. 《药品注册管理办法》
- C. 《处方管理办法》
- D. 《抗菌药物临床应用指导原则》

68. 药师咨询服务借助的科技手段不包括（ D ）。

- A. app
- B. 微信
- C. 互联网
- D. 咨询窗口

69. 随着医疗卫生体制改革的深入，医院调剂模式已转变成（ C ）。

- A. 窗口供应型、经营型 B. 以“药品供应”为中心
C. “以患者为中心” D. 保证药品供应模式

70. 关于《医疗机构处方审核规范》要求开展处方审核的医疗机构应当满足的条件，不正确的是（ A ）。

- A. 处方审核人员是调剂人员即可
B. 制订本机构的处方审核规范与制度
C. 具备处方审核场所
D. 配备相应的处方审核工具，鼓励医疗机构建立处方审核信息系统

71. 以下调剂服务模式反映了当代调剂学发展方向的是（ A ）。

- A. 知识与技术服务和科研教学型 B. 知识与技术服务型
C. 单纯供应服务型 D. 科研教学型

72. 执业药师在社会药房调剂药品时的做法不正确的是（ B ）。

A. 患者自主选购非处方药尤其是甲类非处方药时，药师要在询问评估患者的症状以及目前正在使用的药品、是否患有其他疾病等情况后，再进行调配

- B. 调配处方时如所列药品缺货，执业药师可以选择其他药品代用
C. 调配时要注意包装相似、品名相近药品的区别，做到“四查十对”

D. 调配人员依据处方内容依次进行调配，多张处方时，先完成一张处方的调配再开始另一张处方的调配，避免错配或漏配

73. 处方审核的内容不包括（ D ）。

- A. 合法性 B. 规范性
C. 适宜性 D. 价格合理性

74. 单剂量调剂的目的，不包括（ D ）。

- A. 减少发药差错
B. 保证药品质量
C. 提高药师业务能力和药学服务水平

D. 降低药品消耗

75. 口服下列药物时不宜多饮水的是 (C)。

A. 硝苯地平控释片 B. 阿仑膦酸钠

C. 川贝止咳糖浆 D. 复方新诺明

76. 以下剂型中，不能用水直接吞服的剂型是 (B)。

A. 舌下含片 B. 泡腾片

C. 咀嚼片 D. 分散片

77. 腔道给药剂型可以用于 (D)。

A. 直肠 B. 阴道或尿道

C. 鼻腔或耳道 D. 以上均可

78. 家长给患儿服药，正确的做法是 (D)。

A. 患儿症状减轻后可以自行减少给药剂量

B. 患儿症状减轻后可擅自改变给药的时间间隔

C. 在服药时哄患儿说这是好吃的糖块

D. 患儿服药后要多加鼓励和安慰

79. 家长给患儿喂口服液体药，正确的做法是 (B)。

A. 将药物直接倒入咽部 B. 混悬剂使用前应充分摇匀

C. 可以使用家庭用的匙子 D. 将药物加入到小儿的牛奶中

80. 一个 10ml 的量杯可以量取的最小体积是 (A)。

A. 1ml B. 2ml

C. 5ml D. 10ml

81. 装填胶囊的操作，不正确的叙述是 (B)。

A. 将固体药粉平铺在适当的平面上轻压紧

B. 药粉厚度为囊体高度的 $1/5 \sim 1/4$

C. 戴指套，捏住胶囊体节，切口向下插入物料层

D. 胶囊体节装满，套上帽节

A. 医生电子处方—电子审方—处方计价收费—患者至药房窗口扫描条码—系统提取数据—自动发药机开始发药—药品传送机构—发药窗口

B. 医生电子处方—处方计价收费—电子审方—患者至药房窗口扫描条码—系统提取数据—自动发药机开始发药—药品传送机构—发药窗口

C. 医生电子处方—电子审方—处方计价收费—系统提取数据—患者至药房窗口扫描条码—自动发药机开始发药—药品传送机构—发药窗口

D. 医生电子处方—电子审方—患者至药房窗口扫描条码—处方计价收费—系统提取数据—自动发药机开始发药—药品传送机构—发药窗口

90. 下列斗谱编排原则正确的是（ A ）。

A. 常用饮片放在斗架的中层，便于调剂时称取

B. 不常用者、质量较轻且用量较少的饮片应放在斗架的低层

C. 质地松泡且用量大的饮片应放在斗架中间层的大药斗内

D. 质重饮片（包括矿石类、化石类和贝壳类）和易于造成污染的饮片（炭药类）应放在斗架的高层

91. 促进处方开具、调剂、使用、保存的规范化管理，提高处方质量，促进合理用药，保障患者用药安全的法规是（ B ）。

A. 《优良药房工作规范》 B. 《处方管理办法》

C. 《医疗机构药事管理规定》 D. 《医疗机构处方审核规范》

92. 以下调剂服务模式反映了当代调剂学发展方向的是（ A ）。

A. 知识与技术服务和科研教学型

B. 知识与技术服务型

C. 单纯供应服务型

D. 科研教学型

93. 麻醉药品、第一类精神药品处方的右上角标明的文字是（ C ）。

A. 麻、精

B. -精、麻

C. 麻、精—

D. 麻醉、精—

- C. 更改有错误的处方
D. 发放合格的药品
101. 社会药房须遵守的法律、法规及行业规范不包括(C)。
- A. 《药品管理法》 B. 《药品经营许可证管理办法》
C. 《麻醉药品临床应用指导原则》 D. 《优良药房工作规范(试行)》
102. 制定本机构药品处方集的是(C)。
- A. 医疗机构制剂室职责
B. 医疗机构临床药师职责
C. 医疗机构药事管理与药物治疗委员会职责
D. 医疗机构临床医生职责
103. 社会药房处方审核人员是(C)。
- A. 坐堂医生 B. 药学技术人员
C. 执业药师 D. 药师以上的药学技术人员
104. 关于药物漏服的说法正确的是(D)。
- A. 药物漏服后不用再补服
B. 药物漏服后应立即补服
C. 药物漏服后应在下次服药时将两次剂量合并服用
D. 药物漏服后应视漏服的药品和漏服的时间来确定是否需要补服
105. 口服下列药品时对饮水量有要求的是(A)。
- A. 阿仑膦酸钠 B. 苯妥英钠
C. 硝酸甘油 D. 奥美拉唑
106. 影响药物经皮渗透吸收的因素有(D)。
- A. 角质层的厚度 B. 皮肤的温度
C. 皮肤的水化 D. 以上都是
107. 可以腔道给药的剂型有(D)。
- A. 栓剂 B. 泡腾片

C. 气雾剂

D. 以上均可

108. 家长给患儿喂口服药时，正确的做法是(D)。

A. 给熟睡或哭闹的小儿使用维生素 AD 滴剂

B. 将药发给小儿自己服用

C. 捏住宝宝的鼻子喂药

D. 药物从嘴角灌入，使药到达舌根部后即可咽下

109. 药师对肝功能不全患者用药的调剂原则，不正确的是(B)。

A. 要严格按照操作规程调剂处方，做到“四查十对”

B. 要对肝功能不全患者进行用药教育，告知患者绝对不能使用对肝脏有损害的药物

C. 注意药物的相互作用，避免或减少肝毒性药物的合并使用

D. 养成良好的生活习惯，避免烟酒给身体带来的危害

110. 药师对肾功能不全患者进行药品调剂时，不正确的是(A)。

A. 青霉素、头孢菌素和异烟肼等药物，应调整剂量或监测血药浓度

B. 应尽量采用对肾损害较小的药物来替代，切不可滥用

C. 如必须使用对肾脏有损害的药物时，可用减少剂量法，即首剂用量不变，给药间隔不变，但维持剂量减少

D. 如必须使用对肾脏有损害的药物时，可用延长间隔法，即药物用量不变，但给药间隔延长

111. 关于待分装的药品描述，不正确的是(B)。

A. 液体药品也要将瓶子擦干净再分装

B. 一种药品分装完毕后可立即分装另一药物

C. 药品分装室不要求无菌环境

D. 对外包装进行清洁

112. 关于用药咨询服务，叙述不正确的是(D)。

A. 为咨询者寻求药物治疗相关信息提供畅通渠道，使其能及时获得有效

的药学服务

- B. 帮助患者掌握正确使用药物的方法，提高药物治疗的有效性和安全性
 - C. 发现和了解药品使用中的相关问题，及时采取干预措施
 - D. 帮助患者判断医师诊断是否正确
113. 医生在开具处方时点错了小数点，可能是属于(C)。
- A. 药物错误
 - B. 给药错误
 - C. 剂量错误
 - D. 给药途径错误
114. 在药房中不需专柜（专区）储存的药物是(A)。
- A. 限制使用级抗菌药物
 - B. 第二类精神药品
 - C. 医疗用毒性药品
 - D. 高警示药品
115. 不需要分开摆放或陈列的药品是(C)。
- A. 包装相近
 - B. 名称相近
 - C. 作用相同
 - D. 读音相近
116. 下列药品中，在药品标签和说明书中不需要印有特殊标识的是(D)。
- A. 医疗用毒性药品
 - B. 麻醉药品和精神药品
 - C. 外用药
 - D. 抗菌药物
117. 法规规定不得在社会药房销售的药品是(B)。
- A. 医疗用毒性药品
 - B. 麻醉药品
 - C. 中成药
 - D. 抗菌药物
118. 下述关于住院药房调剂智能化系统的叙述不正确是(C)。

- A. 住院药房调剂智能化系统包括口服药品单剂量分包机及其辅助设备
- B. 系统存在先期投入成本高、后期耗材成本尚无法收费等问题
- C. 自动摆药机只能将 1 粒药片或胶囊自动准确装入 1 个药袋内
- D. 住院药房调剂智能化系统可以提升药学服务的技术含量，促进合理用药

119. 按《抗菌药物临床应用管理办法》，价格昂贵的抗菌药物是(C)。

- A. 限制使用级
- B. 非限制使用级
- C. 特殊使用级
- D. 禁止使用级

120. 妊娠禁用药为毒性中药，凡禁用的中药绝不能使用，下列中药材或中药饮片属于妊禁用药的是(C)。

- A. 三七
- B. 大黄
- C. 巴豆
- D. 红花

121. 按照《处方管理办法》，处方类别应标明在处方的(B)。

- A. 左上角
- B. 右上角
- C. 左下角
- D. 右下角

122. 关于非处方药，以下描述不正确的是(A)。

- A. 乙类非处方药须在药房由执业药师或药师指导下购买和使用
- B. 甲类非处方药品是在具有药品经营许可证配备执业药师或药师以上技术人员的社会药店和医疗机构药房零售的非处方药品
- C. 可以在经过批准的普通零售商业企业销售的非处方药是乙类非处方药
- D. 乙类处方非处方药安全性更高，无需医师或药师的指导就可以购买和使用

123. 医院药师工作模式转型要以(B)。

- A. 药品为中心
- B. 患者为中心
- C. 科研为中心
- D. 以临床为中心

124. 药师的基本专业技能是(A)。

- A. 调剂技能
- B. 沟通能力
- C. 药品质量保障能力
- D. 药品信息服务能力

125. 药师的工作职责不包括（ A ）。

- A. 建立患者病历
- B. 个体化给药方案
- C. 防范药害事件
- D. 用药教育

126. 《中华人民共和国药品管理法》适用于在中华人民共和国境内（ A ）。

- A. 从事药品研制、生产、经营、使用和监督管理活动
- B. 药品检验、科研、信息网络的单位和个人
- C. 所有有关药品生产、研究开发和使用的单位和个人
- D. 药品生产、经营、使用、检验、科研的单位和个人

127. 处方药的调剂流程通常为（ A ）。

- A. 收方—审方—调配—贴签—复核—发药
- B. 收方—调配—贴签—审方—复核—发药
- C. 收方—审方—复核—调配—贴签—发药
- D. 收方—复核—调配—贴签—审方—发药

128. 以下调剂服务模式反映了当代调剂学发展方向的是（ A ）。

- A. 知识与技术服务和科研教学型
- B. 知识与技术服务型
- C. 单纯供应服务型
- D. 科研教学型

129. 医师开具处方和药师调剂处方应当遵循（ A ）。

- A. 安全、有效、经济和适宜的原则
- B. 安全、有效的原则
- C. 速效、有效、适宜的原则
- D. 安全、有效、适宜的原则

130. 以下说法不正确的是（ B ）。

- A. 调剂学是伴随着药学的发展而发展的，有了药学就有了调剂学
- B. 处方审核、调配、复核、发药均完成之后，再统一由操作者签字或签章
- C. 药品应按药品说明书上的温度要求进行贮存

D. 发药时应逐个药品交待使用方法与注意事项

131. 关于住院药房医嘱审核的叙述，正确是（ A ）。

A. 药师应对医嘱的药物过敏相关问题、药物用法用量相关问题、给药途径相关问题、有无重复用药、药物相互作用和配伍禁忌等问题进行审核

B. 药师应对医嘱的药物过敏相关问题、药物用法用量相关问题、给药频度、有无重复用药、药物相互作用和配伍禁忌等问题进行审核

C. 药师应对医嘱的药物过敏相关问题、药物用法用量相关问题、给药途径相关问题、药物使用经济性、药物相互作用和配伍禁忌等问题进行审核

D. 药师应对医嘱的药物过敏相关问题、药物选择是否正确、给药途径相关问题、有无重复用药、药物相互作用和配伍禁忌等问题进行审核

132. 以下对缓 / 控释制剂特点的描述不正确的是（ C ）。

A. 给药次数少

B. 减少了波峰波谷现象

C. 增加了用药总剂量

D. 药物含量大

133. 以下可以嚼碎服用的剂型是（ D ）。

A. 缓释片

B. 控释片

C. 中间有划痕的控释片

D. 咀嚼片

134. 滴鼻剂使用方法正确的是（ D ）。

A. 洗净双手，揩净鼻腔分泌物，先呼气，头部向后仰

B. 滴管不要接触到鼻黏膜，在鼻上 1~2cm 处，对准鼻孔滴药液

C. 滴鼻后，适当吸气，使药液尽量达到较深部位，保持仰位 1 分钟，后坐直

D. 以上均正确

135. 药师在发药时，对患儿家长进行必要的发药交代，不正确的是（ B ）。

A. 告知家长药品的使用方法，提醒家长要仔细阅读药品说明书，尤其是药品的用法用量、注意事项、禁忌、药品的贮存等内容

B. 告知家长可自行增加小儿的用药剂量和用药次数

- C. 用药时，要严密观察小儿的病情变化及治疗中的药物反应
- D. 将药品放在小儿不能取到的地方，尤其不能与零食放在一起
136. 药师对于妊娠期和哺乳期妇女的用药指导，不正确的是（ A ）。
- A. 药品说明书标明：“怀孕妇女服用本品是否安全尚不明确。”的药品，在怀孕期及哺乳期内绝对不能使用
- B. 药师应告知患者不要随意使用药物，更不能自行用药
- C. 如需用药，要选用已有一定依据证明对婴儿无明显损害的药物，并告知患者药物可能对胎儿和婴儿产生的不良影响
- D. 鼓励患者向医师寻求建议，一旦发生不良反应应及时向医生报告
137. 有关药品分装室的描述不正确的是（ B ）。
- A. 可以在临时调剂室进行药品分装工作
- B. 室温 25~30℃
- C. 需要具备净化级别在 10 万~30 万级
- D. 相对湿度 45~6~55%
138. 关于药品分装胶囊，不正确的叙述是（ C ）。
- A. 分装目的是掩盖药物不适宜臭味
- B. 将粉末状或颗粒状药物装于胶囊中
- C. 胶囊号越大的装载量越大
- D. 胶囊规格选择通常选一个剂量使胶囊装满的最小规格
139. 用药咨询服务需重点关注的患者是（ D ）。
- A. 患有多种疾病或药物治疗方案复杂、效果不佳的患者
- B. 特殊病生理条件的患者
- C. 有药物不良反应史的患者
- D. 以上都是
140. 医生在开具处方时点错了小数点，可能是属于（ B ）。
- A. 药物错误
- B. 剂量错误

C. 给药错误

D. 给药途径错误

141. 不属于降低用药安全风险的环境因素的是（ D ）。

A. 有充足的空间保证药品分类存放，不得混放和叠放

B. 光线明亮，便于药师看清楚处方和药品

C. 调剂间与发药间相对隔开，避免外界嘈杂的声音对药师工作造成干扰

D. 严格执行标准调剂操作规程，及时发现和避免工作缺陷

142. 需要单独设库储存的药品是（ C ）。

A. 化学药品

B. 中成药

C. 中药饮片

D. 注射剂

143. 以下叙述不正确的是（ D ）。

A. 药学信息服务的特点主要表现在以患者为中心，强调服务的最终受益者是患者

B. 信息化和自动化已经成为调剂技术发展的方向

C. 调剂智能化系统是指通过计算机调控，与其它自动化发药设备配合，替代人工作业迅速完成药品调配的操作系统

D. 药学信息服务的基本任务主要是满足医生、药师和护士对药学信息的需求

144. 不属于药学信息服务范围的是（ B ）。

A. 参与药品不良事件的报告和分析

B. 建立和维护药学信息硬件系统

C. 出版《药讯》，就药品的使用等对医生、护士、药师进行合理用药宣传

D. 对各类药学专业人员进行在职教育和培训

145. 以下不正确的论述是（ B ）。

A. 处方审核与点评系统是根据卫生部《处方管理办法》的要求，依靠数据化的医药知识库，以提高医疗质量、降低医疗风险为主要目的研制的软件系统

B. 如果系统知识库自动审核结果为不规范处方、用药不适宜处方及超常的处方，则会自动记录并提交作为最终结果

C. 处方审核与点评系统用人机对话的方式，由浅入深地进行“处方审核与点评”

D. 在处方审核的基础上，对关注度高的不合理处方提出一个合理化的用药建议，以更好地帮助医生提高治疗质量、降低用药风险

146. 将饮片单独煎煮 30~40 分钟后，药渣并人群药同煎，滤取的煎液兑人群药的煎液同服的煎法称为（ B ）。

- A. 先煎
- B. 另煎
- C. 烱化
- D. 包煎

147. 下列属于“十八反”配伍禁忌的是（ C ）。

- A. 硫黄、三棱不宜与芒硝、玄明粉同用
- B. 芒硝不宜与三棱同用
- C. 甘草不宜与海藻、京大戟、芫花、甘遂同用
- D. 水银不宜与砒霜同用

二、配伍选择题

[1- 4]

- A. 白色
- B. 淡绿色
- C. 淡黄色
- D. 淡红色

1. 普通处方印刷用纸的颜色为（ A ）。

2. 急诊处方印刷用纸的颜色为（ C ）。

3. 儿科处方印刷用纸的颜色为（ B ）。

4. 麻醉药品和第一类精神药品处方印刷用纸的颜色为（ D ）。

[5-8]

- A. 麻醉药品
- B. 抗菌药物
- C. 高警示药物
- D. 饮片

- B. 阿胶
- C. 车前子
- D. 薄荷

31. 需先煎的饮片是(A)。
32. 需后下的饮片是(D)。
33. 需包煎的饮片是(C)。
34. 需烔化的饮片是(B)。

[35-37]

- A. 乙类非处方药
- B. 甲类非处方药
- C. 处方药
- D. 高警示药

35. 可以自行判断、购买和使用，红色 OTC 标志的药品是(B)。
36. 可以自行判断、购买和使用，绿色 OTC 标志的药品是(A)。
37. 必须凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品是(C)。

[38-40]

- A. 审核处方用药的适宜性
- B. 审核处方格式的规范性
- C. 理解处方医师的治疗方案
- D. 确认处方的合法性

38. 审核处方后记中是否有医师手签名或者加盖专用签章是(B)。
39. 审核存在有药物相互作用的处方是(A)。
40. 审核处方用药与临床诊断的相符性是(A)。

[41-44]

- A. 生石膏
- B. 阿胶

C. 车前子

D. 薄荷

41. 需先煎的饮片是 (A)。

42. 需后下的饮片是 (D)。

43. 需包煎的饮片是 (C)。

44. 需烔化的饮片是 (B)。

[45-48]

A. 乙类非处方药

B. 甲类非处方药

C. 处方药

D. 高警示药

45. 可以自行判断、购买和使用, 红色 OTC 标志的药品是 (B)。

46. 可以自行判断、购买和使用, 绿色 OTC 标志的药品是 (A)。

47. 必须凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品是 (C)。

48. 若使用不当或发生用药错误会对患者造成严重伤害甚至死亡的药品是 (D)。

[49-50]

A. 泡腾片

B. 注射剂

C. 片剂

D. 栓剂

49. 起效最快的剂型是 (B)。

50. 直接用水吞服易发生危险的剂型是 (A)。

三、问答题

1. 调剂学的主要任务是什么?

调剂学在医疗卫生事业中的任务是研究和指导药品的正确合理使用, 其目的是为患者提供安全、高效的药学服务。即:

(1) 通过审核、调配处方及发药, 为患者提供安全、有效及经济的药品;

(2) 解说药物合理应用的方法及相关知识;

(3) 回答患者咨询、开展患者教育, 为患者提供相关药学服务;

(4) 社会药房的调剂工作还要担负配售卫生用具，医疗器械等任务。

2. 简述发药交待的重要意义。

发药交代是药师的职责，是药师与患者沟通的重要内容。发药交代对指导患者合理用药、减少药品不良反应及增加患者用药依从性等起着重要的作用。药师通过发药交代，一方面使患者掌握正确的用药方法，另一方面使患者知道什么情况下不能用药、出现什么情况时应该停药。

3. 开展用药咨询的必要性是什么？

(1) 为咨询者寻求药物治疗相关信息提供畅通渠道，使其能及时获得有效的药学服务。

(2) 作为药学调剂业务的补充服务，可进一步为个体患者提供用药教育和指导；进一步帮助患者掌握正确使用药物的方法，提高药物治疗的有效性和安全性。

(3) 通过用药咨询服务，药师可发现和了解药品使用中的相关问题，及时采取干预措施，可降低药品不良事件的发生率。

(4) 通过用药咨询服务，药师可及时获知患者或医务人员的实际需求所在，从而引导药学服务工作的持续改进。

4. 简述单剂量调剂的重要意义。

(1) 减少发药差错。

(2) 保证药品质量。

(3) 提高用药知情权。

(4) 把护士“还给”患者。

(5) 提高药师业务水平和药学服务水平。

5. 影响调剂安全的药物因素有哪些？

(1) 同一药品不同规格；

(2) 药品名称的易混淆；

(3) 同一药品不同厂家；

- (4) 同一药品不同剂型或含量；
- (5) 药品的别名误读；
- (6) 药品包装易混淆；
- (7) 近有效期药品管理不到位。

6. 张某，65岁，因患有消化性溃疡，医师开具的处方为奥美拉唑肠溶胶囊、硫糖铝混悬液和多潘立酮片。张某没记住医师当时说的用法，也没看明白说明书，于是来到药房问药师。请问药师如何做用药指导？

答：对于消化系统疾病，医师常常给予患者联合用药，对于这些药物的用药时间与先后顺序患者经常弄不清楚。因此，医师或药师进行用药交代时除了详细说明用药方法外，还要将服用顺序交代清楚，并且粘贴用药标签。药师应告诉患者，这三种药不能同时服用，服药的方法和顺序是：餐前半小时服用促胃动力药多潘立酮片及胃黏膜保护剂硫糖铝混悬液，用餐后1小时服用抑酸剂奥美拉唑肠溶胶囊。

7. 简述社会药房的调剂模式。

(1) 处方药调剂：《处方管理办法》规定：药师应当凭医师处方调剂处方药品，非经医师处方不得调

剂。处方药必须凭执业医师或执业助理医师处方销售、购买和使用。社会药店药师调剂处方药的模式和操作规程与医院药房没有明显区别。

(2) 非处方药调剂：甲类非处方药、乙类非处方药可不凭医师处方销售、购买和使用，因此社会药房的非处方药一般可采用开架和柜台两种调剂模式。但无论何种模式，患者都应该在执业药师或药师的指导下购买和使用。

8. 审核处方用药的适宜性包括哪些方面？

(1) 对于规定必须做皮试的药品，药师应审核处方医师是否注明过敏试验及其结果。

(2) 处方用药与临床诊断的相符性。

(3) 剂量、用法的正确性。

- (4) 选用药物剂型与给药途径的合理性。
- (5) 是否有重复给药的现象。
- (6) 是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌。
- (7) 其他用药不适宜情况。