

调剂学（本）

一. 单项选择题

1. 以下名词的英文缩写不正确的是()。D. 优良药房工作规范 GMP
2. 促进处方开具、调剂、使用、保存的规范化管理, 提高处方质量, 促进合理用药, 保障患者用药安全的法规是()。D. 《医疗机构处方审核规范》
3. 按照《处方管理办法》, 处方类别应标明在处方的()。C. 右上角
4. 关于非处方药品, 以下描述不正确的是()。A. 乙类非处方药须在房由执业药师或药师指导下购买和使用
5. 国家药物政策的基本目标不包括()。D. 促进药品使用量
6. 药师誓言不包括的是()。D. 追求新知, 提升自我实现能力
7. 社会药房的药品陈列不正确的是()。C. 内服药可与外用药一起存放
8. 从事门诊药房的调剂人员应是()。A. 药学专业院校毕业, 并取得相应的药学专业技术职务任职资格的药师
9. 非药学技术人员在经过药学专业知识培训后, 可从事的药学工作是()。C. 处方统计
10. 医疗机构的药剂人员调配处方, 不正确的是()。C. 更改有错误的处方
11. 以下调剂服务模式反映了当代调剂学发展方向的是()。A. 知识与技术服务和科研教学型
12. 医师开具处方和药师调剂处方应当遵循()。A. 安全有效、经济和适宜的原则
13. 以下说法不正确的是() C. 处方审核、调配、复核、发药均完成之后, 再统一由操作者签字或签章
14. 关于住院药房医嘱审核的叙述, 正确是()。A. 药师应对医嘱的药物过敏相关问题、药物用法用量相关问题、给药途径相关问题、有无重复用药、药物相互作用和配伍禁忌等问题进行审核
15. 以下对缓/控释制剂特点的描述不正确的是()。C. 增加了用药总剂量
16. 以下可以掰开服用的剂型是()。D. 中间有划痕的控释片
17. 2007年5月1日起施行的《处方管理办法》对小儿处方的书写有明确要求, 第六条规定新生儿婴幼儿写日月龄, 必要时注明() C. 体重
18. 药师调剂小儿处方时需要注意的事项, 不正确的是()。C. 为方便患儿服用, 可提示家长将肠溶片研碎给孩子冲服
19. 药师对肝功能不全患者用药的调剂原则, 不正确的是()。B. 要对肝功能不全患者进行用药教育, 告知患者绝对不能使用对肝脏有损害的药物
20. 药师对肾功能不全患者使用对肾脏损害的药物进行调剂时, 不正确的是()。A. 青霉素、头孢菌素、林可霉素和异烟肼等药物通过肾脏排泄, 对肾脏毒性较大, 应调整剂量或监测血药浓度
21. 装填胶囊的操作, 不正确的叙述是()。B. 药粉厚度为囊体高度的 $1/5 \sim 1/4$
22. 制备液体药物制剂首选的溶剂是()。D. 蒸馏水
23. 瑞士奶酪模型要说明的是()。A. 错误-一旦发生, 极有可能抵达患者
24. 健康的用药安全文化认为()。B. 用药错误随时都可能发生
25. 在药房中不需专柜(专区)贮存的药物是()。C. 限制使用级抗菌药物
26. 药房药品应按其特性和管理要求进行保管, 描述正确的是()。D. 以上均正确
27. 不属于电子处方系统的特点的是()。C. 便于统计药品收入
28. 以下正确的叙述是()。B. 合理用药监测系统可以进行药物过敏史和注射剂配伍审查
29. 按《抗菌药物临床应用管理办法》, 价格昂贵的抗菌药物是()。C. 特殊使用级
30. 妊娠禁用药为毒性中药, 凡禁用的中药绝不能使用, 下列中药材或中药饮片属于妊娠禁用药的是()。C. 巴豆
1. 以下不正确的说法是()。C. 现代调剂工作强调以药物为中心, 注重人文服务
3. 处方中常见缩写词不正确的是()。A. p. e. 口服
4. 药品的质量特性不包括()。D. 持续性
5. 药学人员从事调剂工作不包括()。C. 疾病的诊断
6. 医院药房遵守的有关处方管理法规不包括()。B. 《药品注册管理办法》

7. 《中华人民共和国药品管理法》适用于()
- A. 所有有关药品生产、经营、使用、检验、科研的单位和个人
10. 门诊药房一般不设有()的区域是()。B. 静脉输液集中调配区
11. 关于处方审核的描述正确的是()。
- A. 处方审核是指药师在处方调配前对处方进行审核和安全用药检查把关的工作过程
12. 处方审核的内容不包括()。D. 价格合理性
14. 执业药师在社会药房调剂药品时不正确的做法是()。
- C. 调配处方时如所列药品缺货, 执业药师可以选择其他药品代用
15. 下列剂型起效最快的是()。A. 注射剂
16. 滴眼剂使用方法不正确的是()。B. 先滴患眼, 后滴健眼
18. 家长给患儿服药, 正确的做法是()。D. 患儿服药后要多加鼓励和安慰
19. 当需要准确量取更小体积的液体时, 正确的做法是()。A. 用移液管和吸耳球
20. 待分装的药品描述, 不正确的是()。
- B. 一种药品分装完毕后可立即分装另一药物
21. 将饮片单独煎煮 30~40 分钟后, 药渣并人群药同煎, 滤取的煎液兑人群药的煎液同服的煎法称为()。C. 另煎
22. 服清热药时不宜吃的食物是()。D. 辛辣助热类
23. 药学信息服务范围, 不包括()。B. 建立和维护药学信息硬件系统
24. 电子处方系统的特点, 不包括()。C. 增加药品使用量
25. 需要单独设库储存的药品是()。C. 中药饮片
26. 根据药品相关的法律法规要求, 不得在零售药店销售的药品是()。B. 麻醉药品
27. 用药错误可能涉及医务人员的()。A. 专业知识和实践经验
28. 调配环节用药安全的控制措施, 不包括()。C. 确认患者的身份, 以确保药品发给相应的患者
29. 药师对患者用药教育的基本内容, 不包括()。
- C. 使患者掌握疾病的诊断和鉴别诊断
30. 下述关于药物治疗管理的叙述不正确的是()。
- B. 药物治疗管理的主要目的是为了减少患者的药费支出
1. 以下论述不正确的论述是()
- C. 调剂学基本任务是为了创造在一定时间内用最少的药物剂量提供最大的疗效、最小的不良反应和最为适宜的给药系统, 为满足医疗卫生工作的需要提供质量优良的药物制剂
2. 关于处方种类与处方颜色, 以下表述正确的是()。B. 儿童处方为技绿色
3. 麻醉药品第一类精神药品处方的右上角标明的文字是()。C. 麻、精一
4. 普通处方、急诊处方、儿科处方药品保存期限为()。A. 1 年
5. 非处方药分甲乙二类, 分类依据是药品的()C. 安全性
6. 医院药房开办条件不包括()。C 执业药师许可证
7. 下列规范性文件中法律效力最强的是()。B. 《麻醉药品和精神药品管理条例》
8. 医院药师要承担的工作不包括()D. 和临床医生一起诊断患者
9. 下列药品中, 在药品标签和说明书中不需要印有特殊标识的是()。B. 合特殊药品的复方制剂
10. 抗菌药物调剂资格取消后, 在多久内不得恢复其药物调剂资格() C 半年内
11. 国家对药品实行分类管理制度将药品分为() C 处方药和非处方药
12. 下列处方书写不符合规则的是()。
- D. 开具西药中成药处方, 每一种药品应当另起一行, 每张处方不得超过 3 种药品
13. 社会药房处方审核人员是()。C. 执业药师
14. 关于药物漏服的说法正确的是()。
- D. 药物漏服后应视漏服的药品和漏服的时间来确定是否需要补服
15. 口服下列药物时不宜多饮水的是()。C 川贝止咳糖浆
16. 以下剂型中, 用水吞服时易发生危险的是()。B. 泡腾片

18. 瞳诺酮类药物的禁用范围是 () D. 18 岁以下儿童
19. 药师在给老年人调剂处方时。不正确的做法是 ()
A. 老年患者由于记忆力减退, 口头交代后得快忘记故可不进行口头交代
20. 溶液量取要求不正确的是 ()。D. 量取 15 ml 的液体, 应选用容量为 50 ml 的量筒
21. 关于药品分装胶囊, 不正确的叙述是 ()。C. 胶囊号越大的装载量越大
22. 用药咨询服务需重点关注的患者是 () D. 以上都是
23. 医生在开具处方时点错了小数点。可能是属于 ()。C 剂量错误
24. 医生欲开具氧氟沙星片 0. 1X35 片, 5 片, qd, 结果写成氧氟沙星片 0. 5X35 片, 5 片. qd. 按技术类型分, 这属于 ()。D. 剂量错误
26. 关于非限制使用级抗菌药物, 以下描述不正确的是 () C. 价格相对较高
27. 以下处方保存时限不正确的是 ()。B. 麻醉药品处方保存 5 年
28. 不属于门诊药房调剂智能化系统的特点的是 ()。A. 提高经济效益
9. 并开药名即一名多药, 是将步种疗效基本相似或有协同作用的饮片缩写在一起而构成的药名。多种包含的药物种类有 ()。B. 2~3 种
30. 与川乌、草乌、附子不宜同用的药物是 ()。C. 半夏

二、配伍选择题

[31-34]

- A. 白色
B. 淡绿色
C. 淡黄色
D. 淡红色
31. 普通处方印刷用纸的颜色为 (A)。
32. 急诊处方印刷用纸的颜色为 (C)。
33. 儿科处方印刷用纸的颜色为 (B)
34. 麻醉药品和第一类精神药品处方印刷用纸的颜色为 (D)。

[35-38]

- A. 麻醉药品
B. 抗菌药物
C. 高警示药物
D. 饮片
35. 应单独设库储存的是 (D)。
36. 根据安全性、疗效、细菌耐药等因素进行分级管理的是 (B)。
37. 使用不当或用药错误会对患者造成严重伤害甚至死亡的高危药是 (C)。
38. 社会药房不得经营的药品是 (A)。

[39-40]

- A. 玻棒
B. 瓷质研钵
C. 天平
D. 量筒
39. 液体与固体混和制备溶液剂时用于研磨的是 (A)。
40. 液体与固体混和制备混悬剂时用于研磨的是 (B)。

[31-33]

- A. 非限制使用级
B. 特殊使用级
C. 限制使用级
31. 经长期临床应用证明安全有效, 对病原菌耐药性影响较小, 价格相对较低的抗菌药物是 (A)。

32. 经长期临床应用证明安全、有效,对病原菌耐药性影响较大,或价格相对较高的抗菌药物是(C)

33. 具有明显或严重不良反应,不宜随意使用的抗菌药物是(B)。

[34-36]

A. 乙类非处方药

B. 甲类非处方药

C. 处方药

34. 可以自行判断、购买和使用,红色 OTC 标志的药品是(B)。

35. 可以自行判断、购买和使用,绿色 OTC 标志的药品是(A)。

36. 必须凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品是(C)。

[37-40]

A. 审核处方用药的适宜性

B. 审核处方格式的规范性

C. 理解处方医师的治疗方案

D. 确认处方的合法性

37. 审核处方必须符合本单位相关管理制度是(D)。

38. 审核处方后记中是否有医师手签名或者加盖专用签章是(B)。

39. 审核存在有药物相互作用疑义的处方是(C)。

40. 审核处方用药与临床诊断的相符性是(A)。

[31-33]

A. 车前子 B. 人参 C 阿胶 D. 薄荷

31. 需包煎的饮片是(A)。

32. 需烔化的饮片是(C)。

33. 需另煎的饮片是(B)。

[34-36]

A. 乙类非处方药 B. 甲类非处方药 C. 处方药 D. 高警示药

34. 可以自行判断购买和使用,红色 OTC 标志的药品是(B)

35. 可以自行判断、购买和使用,绿色 OTC 标志的药品是(A)

36. 必须凭执业医师和执业助理医师处方方可购买调配和使用的药品是(C)

[37-40]

A. 8 岁以下患者 B. 18 岁以下患者 C. 6 个月以下患者 D. 14 岁以下患者

37. 吲哚美辛禁用于(D)。

38. 地西泮禁用于(C)。

39. 左氧氟沙星禁用于(B)。

40. 四环素类药物禁用于(A)。

三、问答题

41. 调剂学的主要任务是什么?

调剂学在医疗卫生事业中的任务是研究和指导药品的正确合理使用,其目的是为患者提供安全、高效的药学服务。

即:

(1)通过审核、调配处方及发药,为患者提供安全、有效及经济的药品;

(2)解说药物合理应用的方法及相关知识;

(3)回答患者咨询,开展患者教育,为患者提供相关药学服务;

(4)社会药房的调剂工作还要担负配售卫生用具,医疗器械等任务。

42. 简述发药交待的重要意义。

发药交代是药师的职责,是药师与患者沟通的重要内容。发药交代对指导患者合理用药、减少药品不良反应及增加患者用药依从性等起着重要的作用。药师通过发药交代,一方面使患者掌握正确的用药方法,另一方面使患者知道什么情况下不能用药、出现什么情况时应该停药。

41. 开展用药咨询的必要性是什么? (10 分)

- (1) 为咨询者寻求药物治疗相关信息提供畅通渠道,使其能及时获得有效的药学服务。
- (2) 作为药学调剂业务的补充服务,可进一步为个体患者提供用药教育和指导;进一步帮助患者掌握正确使用药物的方法,提高药物治疗的有效性和安全性。
- (3) 通过用药咨询服务,药师可发现和了解药品使用中的相关问题,及时采取干预措施,可降低药品不良事件的发生率。
- (4) 通过用药咨询服务,药师可及时获知患者或医务人员的实际需求所在,从而引导药学服务工作的持续改进。

42. 简述社会药房的调剂模式。(10 分)

- (1) 处方药调剂:《处方管理办法》规定:药师应当凭医师处方调剂处方药品,非经医师处方不得调剂。处方药必须凭执业医师或执业助理医师处方销售、购买和使用。社会药店药师调剂处方药的模式和操作规程与医院药房没有明显区别。
- (2) 非处方药调剂:甲类非处方药,乙类非处方药可不凭医师处方销售、购买和使用,因此社会药房的非处方药一般可采用开架和柜台两种调剂模式。但无论何种模式,患者都应该在执业药师或药师的指导下购买和使用。

42. 简述单剂量调剂的重要意义。(10 分)

- (1) 减少发药差错。
- (2) 保证药品质量。
- (3) 提高用药知情权。
- (4) 把护士“还给”患者。
- (5) 提高药师业务水平和药学服务水平。