

《药物治疗学(本)》课程复习题

一、单项选择题

1. 医生开具处方应当遵循的原则是（ C ）。
A. 优先选用创新药物 B. 选用患者指定的药物
C. 选用安全、有效、经济的药物 D. 主要根据个人临床经验选用药物
2. 下列证据类型中，不属于原始研究的是（ A ）。
A. 系统评价 B. 随机对照试验
C. 观察性研究 D. 数据库分析研究
3. 终点指标不包括（ C ）。
A. 病死率、病残率 B. 疾病治愈率
C. 血糖水平 D. 心血管并发症发生率
4. 循证医学定义的核心内容不包括（ A ）。
A. 规章制度 B. 临床医生个人经验
C. 患者意愿 D. 系统化评价和合成的研究证据
5. 下列关于肾上腺素受体阻滞剂说法正确的是（ D ）。
A. α 受体阻滞剂的代表药物有哌唑嗪、美托洛尔等
B. α 受体阻滞剂一般作为高血压治疗的首选药
C. β 受体阻滞剂禁用于直立性低血压患者
D. β 受体阻滞剂尤其适用于伴快速心律失常、冠心病、心力衰竭、交感神经活性增高以及高动力状态的高血压患者
6. 药学信息服务不包括（ D ）。
A. 建立医院基本药物目录和协定处方集

- B. 对药品的使用数据进行挖掘
C. 参与药品不良事件的报告和分析
D. 进行新药的研究和开发
7. 不属于心力衰竭治疗基本药物的是（ C ）。
- A. β 受体阻滞剂 B. 呋塞米
C. 维拉帕米 D. 依那普利
8. 不属于抗心律失常药物治疗的目的及原则的是（ D ）。
- A. 治疗目的是减轻房颤的相关症状
B. 抗心律失常药物治疗可减少但不能消除房颤复发
C. 如果一种抗心律失常药物治疗无效，可考虑换用其他抗心律失常药物
D. 选择抗心律失常药物时，优先考虑有效性而不是安全性
9. 与伪麻黄碱合用可能造成重复用药的药物是（ A ）。
- A. 泰诺 B. 氯苯那敏
C. 布洛芬 D. 泰诺林
10. 长期治疗持续性哮喘的首选药物为（ B ）。
- A. 布地奈德雾化吸入溶液 B. 布地奈德干粉吸入剂（都保）
C. 硫酸特布他林气雾剂 D. 沙丁胺醇气雾剂
11. 脑血栓形成最常见的病因是（ A ）。
- A. 脑动脉粥样硬化 B. 脑动脉炎
C. 结缔组织疾病 D. 先天性血管畸形
12. 推荐在给药前进行 HLA-B* 1502 基因筛查的药品是（ D ）。
- A. 丙戊酸钠 B. 左乙拉西坦
C. 加巴喷丁 D. 卡马西平
13. 左旋多巴治疗帕金森病的机制是（ A ）。

- A. 左旋多巴在脑内转变为 DA，补充纹状体内 DA 的不足
- B. 提高纹状体中乙酰胆碱的含量
- C. 提高纹状体中 5-HT 含量
- D. 降低黑质中乙酰胆碱的含量

14. 下列不属于阿尔海默病的危险因素的是（ C ）。

- A. 脑梗死
- B. 心血管疾病
- C. 血液病
- D. 吸烟与饮酒

15. AD 患者在治疗过程中出现幻觉、妄想等精神症状，可以选用的药物是（ B ）。

- A. 氯硝西泮
- B. 奥氮平
- C. 氟西汀
- D. 唑吡坦

16. 属于短效 BZDs 类的药物是（ A ）。

- A. 咪达唑仑
- B. 地西洋
- C. 氟西汀
- D. 氯硝西泮

17. 患者男，16 岁，诊断抑郁症，应用氟西汀 3 个月后，抑郁症状完全消失，下一步处理是（ D ）。

- A. 换用更新型抗抑郁药度洛西汀继续治疗
- B. 立即停药
- C. 缓慢减量，1 周后停药
- D. 继续原方案治疗

18. 关于消化性溃疡的发病机制的叙述较全面的是（ B ）。

- A. 迷走神经张力增加，使胃酸分泌亢进，从而引起溃疡
- B. 致溃疡的攻击因素和人体对胃黏膜的保护因素失去平衡
- C. 胃壁局限性缺血，胃壁被消化形成溃疡

D. 胃液和胃蛋白酶分泌增加，促使胃组织蛋白发生水解，形成溃疡

19. 不属于甲氧氯普胺禁忌证的是（ C ）。

A. 肠梗阻 B. 胃穿孔

C. 恶心、呕吐 D. 帕金森综合征

20. 下列关于药物治疗作用的描述，错误的是（ A ）。

A. 磺脲类药物是通过作用于胰岛β细胞表面的受体促进胰岛素分泌

B. 葡萄糖苷酶抑制剂可降低餐前血糖

C. 噻唑烷二酮类药物可增强胰岛素在外周组织的敏感性，减轻胰岛素抵抗

D. 双胍类药物主要是通过促进外周组织摄取葡萄糖，加速无氧糖酵等途径改善糖代谢

21. 关于二甲双胍的说法不正确的是（ A ）。

A. 本品不可与磺脲类口服降糖药合用，合用时低血糖风险增加

B. 对于1型或2型糖尿病，本品与胰岛素合用，可增加胰岛素的降血糖作用，减少胰岛素用量

C. 许多国家制定的糖尿病指南中推荐二甲双胍作为2型糖尿病患者控制高血糖的一线用药

D. 本品首选用于单纯饮食及体育运动不能有效控制的2型糖尿病

22. 可促进铁剂吸收的维生素是（ D ）。

A. 维生素E B. 维生素B6

C. 维生素B12 D. 维生素C

23. 妊娠高血压进行降压治疗的药物不包括（ D ）。

A. 拉贝洛尔 B. 尼莫地平

C. 酚妥拉明 D. 硫酸镁

24. 下列药物使用期间应密切关注血糖的是（ B ）。
- A. 环孢素 B. 他克莫司
C. 吗替麦考酚酯 D. 左旋咪唑
25. 不宜处方用于泌尿系统感染的抗菌药物是（ B ）。
- A. 左氧氟沙星 B. 莫西沙星
C. 头孢曲松 D. 厄他培南
26. 第五生命体征是（ B ）。
- A. 体温 B. 疼痛
C. 脉搏 D. 血压
27. 不属于阿片类药物的特点的是（ B ）。
- A. 种类多、剂型也多 B. 具有封顶效应
C. 个体差异明显 D. 首选口服途径给药
28. 不符合三阶梯止痛治疗方案的用药原则的是（ B ）。
- A. 按阶梯用药 B. 疼痛时给药
C. 个体化给药 D. 口服给药
29. 关于阿仑膦酸钠患者用药指导，不正确的是（ C ）。
- A. 早餐前 30min 用
B. 服药前后 30min 内不宜饮用牛奶、奶制品、含钙较高的饮料、橘子汁和咖啡
C. 服药后可静卧 10 分钟
D. 患者在每周的固定一天服用本品
30. 下列关于维生素 D3 治疗骨质疏松的说法中，不正确的是（ D ）。
- A. 维生素 D3 是促进肠道 Ca^{2+} 吸收的唯一激素
B. 维生素 D3 可促进钙、磷在肾脏的重吸收

C. 维生素 D3 可反馈性的抑制甲状旁腺素的释放

D. 长期服用维生素 D3，也不会导致患者维生素 D3 蓄积中毒

31. 眼用糖皮质激素可起到抗炎、抗过敏的治疗作用，下列说法正确的是（ C ）。

A. 抗炎效力：泼尼松龙>地塞米松>氟米龙>氢化可的松

B. 抗炎效力：地塞米松>泼尼松龙>氟米龙>氢化可的松

C. 抗炎效力：地塞米松>氟米龙>泼尼松龙>氢化可的松

D. 抗炎能力：泼尼松龙>氟米龙>地塞米松>氢化可的松

32. 对于脱髓鞘性视神经炎患者在病情需要时可予大剂量糖皮质激素冲击治疗，治疗方案是（ B ）。

A. 地塞米松 5mg/d 静脉滴注 B. 甲泼尼龙 1g/d 静脉滴注

C. 甲泼尼龙 2g/d 静脉滴注 D. 地塞米松 10mg/d 静脉滴注

33. 银屑病临床上可分为（ D ）。

A. 急性、亚急性和慢性

B. 寻常型、增殖型、落叶型、红斑型

C. 重型和轻型

D. 寻常型、脓疱型、关节病型、红皮病型

34. 影响药物治疗的主要因素，不包括（ D ）。

A. 年龄 B. 性别

C. 肝肾功能 D. 天气

35. 按照 GRADE 证据质量分级标准，证据质量共被分为（ B ）级。

A. 5 B. 4

C. 3 D. 6

36. 不属于临床研究的是（ A ）。

A. 专家会诊 B. 随机对照试验

C. 队列研究 D. 病例对照研究

37. 药学信息服务不包括(D)。

A. 建立医院基本药物目录和协定处方集

B. 提供新药信息

C. 参与药品不良事件的报告和分析

D. 处方审查

38. 不属于冠心病的风险因素的是(C)。

A. 甘油三酯水平增高 B. 胆固醇水平增高

C. HDL-C 水平增高 D. LDL-C 水平增高

39. 蛋白尿指尿液中蛋白质含量超过(C)。

A. 10mg/24h B. 100mg/24h

C. 150mg/24h D. 1000mg/24h

40. 利尿剂的主要不良反应是(A)。

A. 大剂量使用会导致低血钾症和影响血脂、血糖和尿酸代谢

B. 心动过缓、乏力、四肢发冷，并对心肌收缩力、房室传导以及窦性心律有抑制作用

C. 在开始治疗阶段反射性交感神经活性增强，尤其在使用短效制剂时，引起心率加快、面部潮红、头痛、下肢水肿等

D. 刺激性干咳，发生率为 10%-20%，可能与体内缓激肽增多有关，停药后消失

41. 关于贝特类药物说法错误的是(D)。

A. 常用药物有吉非贝齐，非诺贝特，苯扎贝特等

B. 患肝、胆疾病、孕妇、儿童及肾功能不良者禁用

C. 主要适应证为高甘油三酯血症或以 TG 升高为主的混合型高脂血症

D. 对 TG 无降低作用甚至稍有升高

42. 对于口服华法林的非瓣膜性房颤患者，应调整药物剂量使 INR 保持在 (C)。

A. 0.8-1.5 B. 1.5-5

C. 0-0 D. 0-0

43. 血管紧张素转换酶抑制药的禁忌证不包括 (B)。

A. 高钾血症患者 B. 蛋白尿患者

C. 双侧肾动脉狭窄患者 D. 妊娠期妇女

44. 控制慢性阻塞性肺疾病症状的主要治疗措施是使用 (A)。

A. 支气管扩张剂 B. 磷酸二酯酶抑制剂

C. 祛痰药 D. 抗氧化剂

45. 下列不是双重抗血小板治疗首选指征的是 (D)。

A. 轻型缺血性脑卒中患者 (NIHSS 评分 ≤ 3)

B. 脑卒中发病 30d 内伴有症状性颅内动脉严重狭窄 (狭窄率 70%-99%)

C. 急性非心源性 TIA (ABCD2 评分 > 4 分)

D. 心源性栓塞导致的脑卒中

46. 癫痫持续状态的首选药物治疗为 (C)。

A. 静注丙泊酚 B. 肌注苯妥英钠

C. 静注地西泮 D. 肌注苯巴比妥

47. 关于左旋多巴不良反应的说法，错误的是 (D)。

A. 胃肠道反应 B. 心动过速

C. 开关现象 D. 肝性脑病

48. 抗帕金森病的药物是 (D)。

- A. 多巴胺受体阻断药 B. 三环类药
C. 胆碱受体激动药 D. 胆碱受体阻断药

49. 治疗头癣的口服药首选(A)。

- A. 灰黄霉素 B. 制霉菌素
C. 二性霉素 D. 克霉唑

50. 下列关于失眠治疗的说法, 错误的是(C)。

- A. 入睡困难一般可使用短效抗失眠药物
B. 睡眠维持障碍可用中、长效抗失眠药物
C. 对于急性失眠, 不应使用药物治疗, 以免形成药物依赖
D. 超过 4 周的药物干预需要每个月定期评估

51. 与抑郁症药物治疗相关的神经递质不包括(D)。

- A. 5-羟色胺 B. 氨基丁酸
C. 去甲肾上腺素 D. 多巴胺

52. 精神分裂症最主要、最本质的症状是(B)。

- A. 感知觉障碍 B. 思维障碍
C. 情感障碍 D. 意志和行为障碍

53. 精神分裂症药物治疗原则, 错误的是(B)。

- A. 确定诊断后, 应首先采用心理治疗等非药物干预
B. 复发患者应换用之前未使用过的药物
C. 药物不良反应可加重精神症状, 应重视
D. 应尽可能单一用药

54. 根除幽门螺杆菌的三联疗法, 不合理的是(D)。

- A. 胶体次枸橼酸铋+四环素+甲硝唑
B. 奥美拉唑+阿莫西林+甲硝唑

C. 奥美拉唑+克拉霉素+甲硝唑

D. 硫糖铝+阿莫西林+替硝唑

55. 以下关于药物蒙脱石的描述，错误的是(D)。

A. 具有吸附、收敛的作用

B. 可能影响其他药物的吸收，合用时应间隔 2h 左右

C. 不被胃肠道吸收，不进人体液循环

D. 不适用于儿童腹泻

56. 非促胰岛素分泌剂不包括(C)。

A. 双胍类 B. 噻唑烷二酮类

C. 格列奈类 D. 糖苷酶抑制剂

57. 以下关于抗甲状腺药物的说法，不正确的是(B)。

A. 甲巯咪唑与丙硫氧嘧啶的作用机制基本相同

B. 因治疗需要，抗甲状腺药物导致的过敏反应可用抗组胺药物治疗，不能停药

C. 甲巯咪唑导致的粒细胞减少和粒细胞缺乏多发生在用药后的 2~3 个月内，也可见于任何时期

D. 甲巯咪唑抗甲状腺作用较丙硫氧嘧啶约强 10 倍，且疗效快，持续作用时间长

58. 硫脲类抗甲状腺药起效慢的主要原因是(D)。

A. 口服吸收缓慢

B. 肝内代谢转化快

C. 肾脏排泄速度快

D. 待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效

59. 属于抗纤维蛋白溶解药的是(A)。

A. 酚磺乙胺 B. 氨苯环酸

C. 凝血酶 D. 卡巴克洛

60. 下列药物在治疗肾病综合征时需注意高血钾的是(D)。

A. 呋塞米 B. 氢氯噻嗪

C. 布美他尼 D. 螺内酯

61. 尿路感染最常见的细菌为(B)。

A. 黏质沙雷菌 B. 大肠埃希菌

C. 肠球菌 D. 变形杆菌

62. 对疼痛的定义正确的表述是(C)。

A. 是机体面临刺激或疾病的信号

B. 是机体对创伤或疾病的反应机制，也是疾病的症状

C. 是组织损伤或潜在的组织损伤所引起的不愉快感觉和情感体验

D. 由外界创伤引起的机体损伤

63. 癌症患者轻度疼痛，可选用(A)。

A. 非甾体抗炎药 B. 弱阿片药

C. 强阿片药 D. 抗抑郁类药

64. 不符合三阶梯止痛治疗方案的用药原则的是(B)。

A. 按阶梯用药 B. 疼痛时给药

C. 个体化给药 D. 口服给药

65. 下列是系统性红斑狼疮的基础治疗药物，可控制皮疹和减轻光过敏的是(A)。

A. 羟氯喹 B. 吗替麦考酚酯

C. 他克莫司 D. 雷公藤多苷

66. 下列关于非甾体抗炎药治疗类风湿关节炎，使用注意中不正确的是

(D)。

- A. 注意非甾体抗炎药的种类、剂量和剂型个体化
- B. 定期监测血常规和肝肾功能
- C. 通常选用一种非甾体抗炎药，如无效可换用另一种
- D. 可同时服用两种或两种以上非甾体抗炎药

67. 雌激素预防和治疗骨质疏松的主要作用机制是(B)。

- A. 抑制体内生成新的破骨细胞，从而导致体内具有生物活性的破骨细胞数量减少，骨吸收活动减弱
- B. 雌激素与骨细胞上雌激素受体结合，抑制破骨细胞的骨吸收作用，使骨基质形成增加
- C. 直接增加特异性酪氨酸激酶的活性或间接抑制成骨细胞磷酸化酪氨酸蛋白磷酸酶的活性，最终增加磷酸化促进骨细胞增生
- D. 破骨细胞通过自身的胞饮作用使雌激素进入细胞内，使破骨细胞的活性受到抑制

68. 关于骨质疏松，下述说法中不正确的是(D)。

- A. 与钙剂联合用药有相辅相成的效果
- B. 肠道吸收不良是骨质疏松症发病的重要原因
- C. 的绝对适应证是长期接受糖皮质激素治疗的患者
- D. 是维生素类药物，故可安全放心地服用

69. 常用的减充血剂不包括(C)。

- A. 伪麻黄碱 B. 1%伪麻黄碱溶液
- C. 氯雷他定 D. 0.05%盐酸羧甲唑啉

70. 眼用糖皮质激素抗炎效力正确的是(C)，

- A. 泼尼松龙>地塞米松>氟米龙>氢化可的松

B. 地塞米松>泼尼松龙>氟米龙>氢化可的松

C. 地塞米松>氟米龙>泼尼松龙>氢化可的松

D. 泼尼松龙>氟米龙>地塞米松>氢化可的松

71. 通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是(C)。

A. 缬沙坦 B. 呋塞米

C. 硝苯地平 D. 维拉帕米

72. 银屑病临床上可分为(D)。

A. 急性、亚急性和慢性 B. 寻常型、增殖型、落叶型、红斑型

C. 重型和轻型 D. 寻常型、脓疱型、关节病型、红皮病型

73. 药物治疗最初阶段，药物以不同制剂的形式，通过不同给药途径，从给药部位进入患者体内的过程，称为(B)。

A. 药物化学阶段 B. 药剂学阶段

C. 药动学阶段 D. 药效学阶段

74. 循证医学定义的核心内容，不包括(A)。

A. 规章制度 B. 临床医生个人经验

C. 患者意愿 D. 系统化评价和合成的研究证据

75. 医疗机构药学信息服务的核心，不包括(C)。

A. 药品使用与合理用药 B. 药品不良反应监测

C. 药品生产 D. 药品管理

76. 关于药品说明书，下列说法正确的是(A)。

A. 药品说明书具有法律效力

B. 药品说明书包含药品安全性、有效性和价格等数据和信息

C. 不同药品生产企业生产的同种药品说明书一定相同

D. 药品说明书中不良反应项下内容越多，说明药品越不安全

77. 下列属于肾功能检查指标的是(B)。

A. 谷丙转氨酶 B. 血清肌酐

C. 总胆红素 D. 白蛋白

78. 成人正常血小板计数参考范围为(C)。

A. $(4\sim 10)\times 10^9/L$ B. $(4\sim 10)\times 10^{12}/L$

C. $(100\text{—}300)\times 10^9/L$ D. $(100\sim 300)\times 10^{12}/L$

79. 下列药物中常与他汀类联用的是(B)。

A. 抗真菌药 B. 依折麦布

C. 环孢素 D. 大环内酯类抗生素

80. 治疗心力衰竭的基本药物, 不包括(B)。

A. 比索洛尔 B. 维拉帕米

C. 呋塞米 D. 依那普利

81. 高血压的治疗原则是(C)。

A. 无症状患者可以停药

B. 大剂量单一用药优于联合用药

C. 个体化阶梯治疗

D. 联合用药一步到位

82. HDL 是指(B)。

A. 乳糜微粒 B. 高密度脂蛋白

C. 低密度脂蛋白 D. 极低密度脂蛋白

83. 氨溴索属于(C)。

A. 解热镇痛药 B. 鼻黏膜血管收缩剂

C. 祛痰药 D. 抗过敏剂

84. 避免吸入糖皮质激素后口咽部发生不良反应, 可采用的方式不包括

(C)。

- A. 吸药后及时用清水含漱口咽部
- B. 选用干粉吸入剂
- C. 选用普通定量气雾剂
- D. 加用储雾罐

85. 肺结核初治的治疗疗程为(A)。

- A. 强化期 2 个月 / 巩固期 4 个月
- B. 强化期 3 个月 / 巩固期 5 个月
- C. 强化期 3 个月 / 巩固期 8 个月
- D. 强化期 4 个月 / 巩固期 2 个月

86. 癫痫持续状态的首选药物为(A)。

- A. 静注地西洋 B. 肌注苯妥英钠
- C. 静注丙泊酚 D. 肌注苯巴比妥

87. 治疗抗帕金森病的药物，单用无效的是(D)。

- A. 左旋多巴 B. 普拉克索
- C. 金刚烷胺 D. 卡比多巴

88. 阿尔茨海默病的危险因素，不包括(A)。

- A. 血液病 B. 心血管疾病
- C. 脑梗死 D. 吸烟与饮酒

89. 治疗轻、中度阿尔茨海默病的一线药物，不包括(D)。

- A. 卡巴拉汀 B. 加兰他敏
- C. 多奈哌齐 D. 美金刚联合多奈哌齐

90. 失眠的首选药物，不包括(B)。

- A. 唑吡坦 B. 氯硝西洋

C. 劳拉西泮 D. 雷美替胺

91. 关于抗抑郁药物治疗原则，不恰当的是(D)。

- A. 剂量逐步递增，尽可能采用最小有效剂量
- B. 小剂量疗效不佳时，增至足量、足疗程
- C. 足量、足疗程用药后无效，可考虑换同类药
- D. 尽可能多种药物协同使用

92. 关于第二代抗精神病药物的描述，不正确的是(C)。

- A. 不局限于对多巴胺受体的拮抗，故称为非典型抗精神病药物
- B. 对精神分裂症的阳性和阴性症状均有效
- C. 氯丙嗪和氟哌啶醇是常用第二代抗精神病药
- D. 治疗初发急性精神分裂症的首选药物

93. 消化性溃疡的发病机制，叙述较全面的是(D)。

- A. 迷走神经张力增加，使胃酸分泌亢进，引起溃疡
- B. 胃液和胃蛋白酶分泌增加，促使胃组织蛋白发生水解，形成溃疡
- C. 胃壁局限性缺血，胃壁被消化，形成溃疡
- D. 致溃疡的攻击因素和人体对胃黏膜的保护因素失去平衡

94. 下列关于微生态制剂的描述，不正确的是(C)。

- A. 地衣芽孢杆菌、双歧三联活菌制剂都属于微生态制剂
- B. 可用于菌群失调所致的腹泻
- C. 活菌制剂可以与抗菌药物同服
- D. 应冷藏保存，宜用冷、温开水送服

95. 属于短效胰岛素的是(A)。

- A. 生物合成人胰岛素 B. 赖脯胰岛素
- C. 门冬胰岛素 D. 甘精胰岛素

96. 关于二甲双胍的说法，正确的是(C)。

- A. 不可与磺脲类口服降糖药合用，合用时低血糖风险增加
- B. 二甲双胍与胰岛素联合使用时不会增加低血糖发生的危险性
- C. 二甲双胍是 2 型糖尿病患者控制高血糖的一线用药和联合用药中的基础用药
- D. 服用二甲双胍发生胃肠道不良反应，需要立即停用

97. 最适宜治疗巨幼细胞性贫血的药物是(D)。

- A. 叶酸及维生素 B12
- B. 叶酸及维生素 D
- C. 叶酸及维生素 B1
- D. 铁剂及维生素 B12

98. 治疗妊娠高血压的药物，不包括(B)。

- A. 拉贝洛尔
- B. 硫酸镁
- C. 酚妥拉明
- D. 尼莫地平

99. 使用期间应密切关注血糖水平的药物是(D)。

- A. 环孢素
- B. 吗替麦考酚酯
- C. 左旋咪唑
- D. 他克莫司

100. 不宜用于泌尿系统感染的抗菌药物是(D)。

- A. 左氧氟沙星
- B. 厄他培南
- C. 头孢曲松
- D. 莫西沙星

101. 肾病综合征最主要的诊断依据是(B)。

- A. 低蛋白血症
- B. 大量蛋白尿
- C. 水肿
- D. 高脂血症

102. 阿片受体激动剂不包括(A)。

- A. 纳洛酮
- B. 芬太尼
- C. 吗啡
- D. 哌替啶

103. 轻度癌痛可选用的药物是(D)。

- A. 羟考酮
- B. 吗啡
- C. 芬太尼
- D. 对乙酰氨基酚

104. 患者骨肿瘤，疼痛评分 7 分，单独应用疗效欠佳的镇痛药物是(B)。

- A. 羟考酮
- B. 塞来昔布
- C. 芬太尼
- D. 吗啡

105. 关于降尿酸治疗的叙述，正确的是(B)。

- A. 无症状性高尿酸血症的治疗应以降尿酸药物治疗为主
- B. 降尿酸治疗的目标是促进晶体溶解和防止晶体形成
- C. 苯溴马隆是抑制尿酸合成的药物
- D. 急性发作期需要药物进行降尿酸治疗

106. 关于双膦酸盐的使用，不正确的是(C)。

- A. 主要不良反应是上消化道紊乱和对食管的刺激
- B. 服用该类药物时应用大量的水送服
- C. 服药后宜采取卧位
- D. 不宜与食物同服

107. 关于使用非甾体抗炎药治疗骨关节炎的叙述，正确的是(C)。

- A. 有 2~3 种胃肠道危险因素存在时，应加用预防溃疡病的药物
- B. 使用非甾体抗炎药治疗腰椎间盘突出症，可以防止疾病的发展及合并症的发生
- C. 足量使用一种非甾体抗炎药 2~3 周后仍无效，可更换另一种，待有效后逐渐减量
- D. 同时使用两种非甾体抗炎药，疗效一定能增加

108. 关于体股癣的药物治，不正确的是(B)。

- A. 以外用抗真菌药为主
- B. 通常均应联合外用糖皮质激素
- C. 常用药物有复方间苯二酚搽剂等
- D. 皮疹广泛或病情迁延顽固者，可加服伊曲康唑

109. 关于结膜炎的药物治疗，不正确的是（ B ）。

- A. 主要针对病因进行治疗
- B. 主要采用局部给药（眼用制剂），严重结膜炎不必全身给药
- C. 使用眼膏涂眼，宜睡前使用
- D. 分泌物较多时，可用无刺激性的冲洗液（生理盐水或3%硼酸等）冲洗

110. 变应性鼻炎中，中重度间歇性和持续性鼻炎的首选药物是（ D ）。

- A. 抗组胺药
- B. 口服糖皮质激素
- C. 鼻内用减充血剂
- D. 鼻内用糖皮质激素

111. 用于青光眼降眼压的常用药物，不包括（ A ）。

- A. 氟米龙
- B. 曲伏前列素
- C. 毛果芸香碱
- D. 噻吗洛尔

112. 合理用药的基本原则不包括（ D ）。

- A. 安全
- B. 有效
- C. 经济
- D. 质量合格

113. 属于间接成本的是指患者（ B ）。

- A. 求诊支出的食宿费
- B. 伤残造成的误工损失
- C. 治疗引起的精神痛苦
- D. 药品费用

114. 成年男性贫血的诊断标准是（ B ）。

- A. 血红蛋白 $<110\text{g/L}$
- B. 血红蛋白 $<120\text{g/L}$
- C. 血细胞比容 <0.35
- D. 红细胞计数 $<5 \times 10^{12}/\text{L}$

115. 不属于肝功能检查的指标是（ D ）。

- A. 谷丙转氨酶
- B. 白蛋白
- C. 总胆红素
- D. 血清肌酐

116. 反映糖尿病较长时间血糖控制水平的金指标是（ D ）。

- A. 空腹血糖
- B. 餐后 2 小时血糖
- C. 尿糖
- D. 糖化血红蛋白

117. 关于肾上腺素受体阻滞剂的叙述，正确的是（ D ）。

- A. α 受体阻滞剂的代表药物有哌唑嗪、特拉唑嗪、美托洛尔等
- B. α_1 受体阻滞剂单独应用于血压控制效果较好
- C. 禁用于妊娠妇女、高血钾症
- D. β 受体阻滞剂尤其适用于心率较快的中青年患者或合并心绞痛患者

118. LDL 是指（ C ）。

- A. 乳糜微粒
- B. 高密度脂蛋白
- C. 低密度脂蛋白
- D. 极低密度脂蛋白

119. 关于抗心律失常药物治疗的目的和原则，不正确的是（ D ）。

- A. 减轻房颤的相关症状
- B. 维持窦性心律的疗效为中等程度
- C. 如果一种抗心律失常药物治疗无效，可考虑换用其他抗心律失常药物
- D. 选择抗心律失常药物时，优先考虑有效性

120. 不属于心衰治疗基本药物的是（ C ）。

- A. β 受体阻滞剂
- B. 呋塞米
- C. 维拉帕米
- D. 依那普利

121. 洋地黄类药物的禁忌证不包括（ D ）。

- A. 病态窦房结综合征
- B. 预激综合征伴房颤或心房扑动

C. 梗阻性肥厚型心肌病 D. 心动过速

122. 哮喘给药途径以吸入疗法为优，以下表述不正确的是（D）。

A. 呼吸道内局部药物浓度高 B. 用药量少

C. 极少有全身不良反应 D. 血药浓度高

脑出血最常见的病因是（ C ）。

A. 先天性脑血管畸形 B. 继发于脑梗死的出血

C. 高血压和动脉硬化 D. 血液病

123. 抗癫痫药的作用机制不包括（ A ）。

A. 增加脑内 5-HT 的水平 B. 电压依赖性的钠通道阻滞剂

C. 增加脑内或突触的 GABA 水平 D. 直接促进氯离子的内流

124. 对帕金森病药物治疗原则的叙述，错误的是（ B ）。

A. 坚持剂量滴定以避免产生药物的急性不良反应

B. 使用左旋多巴可突然停药

C. 尽可能以小剂量达到满意临床效果

D. 治疗应遵循循证医学的证据

125. 引起消化性溃疡的攻击因素，错误的是（ C ）。

A. 胃酸和胃蛋白酶 B. 非甾体抗炎药

C. 米索前列醇 D. 幽门螺杆菌

126. 治疗炎症性肠病有效的一线药物是（ A ）。

A. 柳氮磺吡啶 B. 布地奈德

C. 英夫利昔单抗 D. 硫唑嘌呤

127. 对于慢性胃炎治疗的叙述，不正确的是（ B ）。

A. 根除 Hp B. 使用 NSAID

C. 保护胃黏膜 D. 抑制胆汁反流

128. 关于抗甲状腺药物的叙述，不正确的是（ D ）。

- A. 适用于甲亢患者的初始治疗
- B. 疗效较肯定，但仅能获得 40%~60%治愈率
- C. 不易导致永久性甲减
- D. 停药后的复发率较低

129. 丙硫氧嘧啶抗甲状腺药起效慢的主要原因是（ D ）。

- A. 口服吸收缓慢
- B. 肝内代谢转化快
- C. 肾脏排泄速度快
- D. 待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效

130. 使用雄激素治疗的是（ B ）。

- A. 缺铁性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 叶酸缺乏性贫血
- D. 慢性肾功能衰竭性贫血

131. 适用于由毛细血管损伤及通透性增加所致的出血的药物是（ D ）。

- A. 酚磺乙胺
- B. 氨苯环酸
- C. 凝血酶原复合物
- D. 卡巴克洛

132. 多吃新鲜水果和蔬菜即可补充摄人不足的是（ B ）。

- A. 缺铁性贫血治疗
- B. 叶酸缺乏性贫血
- C. 维生素 B12 缺乏性贫血
- D. 再生障碍性贫血

133. 在使用利尿药时需注意引起高血钾的是（ D ）。

- A. 呋塞米
- B. 氢氯噻嗪
- C. 布美他尼
- D. 螺内酯

134. IgA 肾病治疗上以降蛋白尿和降压为主，如尿蛋白 $>0.5\text{g/d}$ 时，推荐（ A ）。

- A. ACEI 或 ARB 治疗
- B. 小剂量激素
- C. 钙调磷酸酶抑制剂
- D. 烷化剂

135. 对于急性膀胱炎、尿道炎患者，宜选用的药物是（ A ）。

- A. 呋喃妥因 B. 头孢氨苄
- C. 氨苄西林 D. 头孢唑林

136. 不属于前列腺增生药物治疗选择的是（ D ）。

- A. α 受体阻滞剂 B. 5α 还原酶抑制剂
- C. 雌激素 D. 丙酸睾酮

137. 被列为第五大生命体征是（ B ）。

- A. 体温 B. 疼痛
- C. 脉搏 D. 血压

138. 关于非甾体抗炎药的叙述，错误的是（ B ）。

- A. 有封顶效应，不应超量给药
- B. 多可同时使用两种药物
- C. 同类药物中一种药物效果不好，可换用另一种药
- D. 非选择性 NSAID 不良反应较多

139. 癌症患者长期使用阿片类止痛药时，首选的给药途径是（ A ）。

- A. 口服给药 B. 透皮吸收途径给药
- C. 临时皮下注射用药 D. 自控镇痛给药

140. 治疗类风湿关节炎的药物中，给药频率为每周 1 次的是（ C ）。

- A. 环磷酰胺 B. 硫唑嘌呤
- C. 甲氨蝶呤 D. 环孢素

141. 作为 SLE 的基础治疗药物，应长期维持使用的是（ A ）。

- A. 羟氯喹 B. 吗替麦考酚酯
- C. 他克莫司 D. 雷公藤多苷 I

142. 关于对治疗骨关节炎的 NSAID 的描述，错误的是（ B ）。

- A. 有 2~3 种胃肠道危险因素存在时，应加用预防溃疡病的药物
- B. 可同时使用两种或两种以上的 NSAID
- C. 尽量避免不必要的大剂量、长期应用 NSAID
- D. 用药期间不宜饮酒

143. 全部为抑制骨吸收的一组药物是（ B ）。

- A. 雌激素、双膦酸盐类、氟化物
- B. 双膦酸盐类、降钙素、雌激素受体调节剂
- C. 雌激素、双膦酸盐类、维生素 K
- D. 雌激素、双膦酸盐类、活性维生素 D

144. 关于阿仑膦酸钠的叙述，错误的是（ C ）。

- A. 是第三代氨基双膦酸盐类骨吸收抑制剂
- B. 抗骨吸收作用较依替膦酸二钠强 1000 倍
- C. 服药后 30min 内可躺卧
- D. 患者应在每周的固定一天服用本品

145. 化脓性中耳炎的抗感染治疗，不可选择的抗菌药物是（ A ）。

- A. 氨基糖苷类 B. 青霉素类
- C. 头孢菌素类 D. 硝基咪唑类

146. 急性鼻炎最常见的致病病毒是（ B ）。

- A. 柯萨奇病毒 B. 鼻病毒
- C. 流感病毒 D. 冠状病毒

147. 药疹治疗的首要措施是（ C ）。

- A. 应用大剂量糖皮质激素 B. 输血促进药物排泄
- C. 停用致敏药物 D. 应用激素并同时用抗菌药物

148. 通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是（ C ）。

- A. 缬沙坦 B. 呋塞米
C. 硝苯地平 D. 阿替洛尔

149. RCT 的含义是(C)。

- A. 专家的会诊意见 B. 队列研究
C. 随机对照试验 D. 病例对照研究

450. 对影响药物治疗的病理因素的叙述，不正确的是(B)。

- A. 以肝脏代谢为主的药物，在肝脏衰竭时 $T_{1/2}$ 明显延长
B. 以肾排泄为主的药物，在肾衰竭时 $T_{1/2}$ 明显缩短
C. 心力衰竭可导致全身脏器淤血，使药物的 $T_{1/2}$ 明显延长
D. 干扰胃肠道功能的疾病可改变口服药物的吸收过程

151. 不属于冠心病危险因素的是(C)

- A. 甘油三酯水平增高 B. 胆固醇水平增高
C. 高密度脂蛋白胆固醇增高 D. 低密度脂蛋白胆固醇水平增高

152. 关于利尿剂的叙述，错误的是(C)。

- A. 代表药物有呋塞米、螺内酯、氢氯噻嗪等
B. 利尿药的降压作用较平和
C. 螺内酯是排钾利尿药
D. 尤其适用于老年高血压患者

153. 甲氧西林敏感金葡菌感染的肺炎，宜选用的抗菌药物是(A)。

- A. 苯唑西林 B. 利奈唑胺
C. 头孢唑林 D. 糖肽类

154. 肺结核初治的疗程为(A)。

- A. 强化期 2 个月/巩固期 4 个月
B. 强化期 3 个月/巩固期 5 个月

C. 强化期 3 个月/巩固期 8 个月

D. 强化期 4 个月/巩固期 2 个月

155. 治疗 COPD 的支气管扩张剂不包括(D)。

A. B2 受体激动剂 B. 抗胆碱能药物

C. 茶碱类药物 D. 糖皮质激素

156. 不属于双重抗血小板治疗首选指征的是(D)。

A. 轻型缺血性脑卒中患者

B. 脑卒中发病 30d 内伴有症状性颅内动脉严重狭窄

C. 急性非心源性 TIA

D. 心源性栓塞导致的脑卒中

157. 抗癫痫药对于肝药酶代谢有自身诱导作用的是(B)。

A. 丙戊酸 B. 卡马西平 C. 左乙拉西坦 D. 托吡酯

158. 抗帕金森病药物中单用无效的是(B)。

A. 左旋多巴 B. 卡比多巴 C. 金刚烷胺 D. 溴隐亭

159. 阿尔茨海默症患者的首发症状是(A)。

A. 记忆障碍 B. 时间、空间定向障碍

C. 理解力和判断力障碍 D. 睡眠障碍

160. 通过选择性阻滞突触间隙 5-HT 再摄取而发挥抗抑郁作用的药物是(C)。

A. 阿米替林 B. 吗氯贝胺 C. 帕罗西汀 D. 马普替林

161. 不属于炎症性肠病维持期药物治疗选择的药物是(C)。

A. 柳氮磺吡啶 B. 美沙拉嗪 C. 糖皮质激素 D. 硫唑嘌呤

162. 关于止泻药蒙脱石的叙述，错误的是(B)。

A. 具有吸附、收敛的作用

B. 不适用于儿童腹泻

C. 可能影响其他药物的吸收，合用时应间隔 2h 左右

D. 不被胃肠道吸收，不进入体液循环

163. 关于糖尿病的综合防治，正确的是(C)

A. 糖尿病教育、纠正代谢紊乱

B. 医学营养治疗、防止发生糖尿病急性代谢紊乱

C. 糖尿病教育、医学营养治疗、运动治疗、药物治疗、血糖监测

D. 药物治疗、血糖监测

164. 属于抗纤维蛋白溶解的药物是(B)

A. 酚磺乙胺 B. 维生素 B6 C. 凝血酶 D. 维生素 C

165. 不属于促白细胞生成的药物是(B)。

A. 盐酸小檗胺

B. 氨甲苯酸

C. 利可君

D. 卡巴克洛

166. 对肾病综合征临床特征的描述，错误的是(B)。

A. 大量蛋白尿 B. 高蛋白血症 C. 严重水肿 D. 高血脂

167. 对于肾小球肾炎临床表现的描述，不正确的是(C)。

A. 水肿

B. 蛋白尿

C. 肾功能不全和尿毒症是所有肾小球肾炎患者都有的表现

D. 贫血

168. 治疗前列腺增生，不引起低血压的药物是(A)。

A. 非那雄胺

C. 阿呋唑嗪

B. 特拉唑嗪

D. 坦洛新

169. 对于复杂性尿路感染，宜选药物不包括(B)。

A. 哌拉西林 B. 头孢他啶 C. 环丙沙星 D. 头孢噻肟

170. 国际疼痛学会关于疼痛的定义，正确的是(C)。

A. 是机体面临刺激或疾病的信号

B. 是机体对创伤或疾病的反应机制，也是疾病的症状

C. 是组织损伤或类似潜在的组织损伤所引起的不愉快的感觉和情感体验

D. 由外界创伤引起的机体损伤

171. 轻型狼疮的治疗药物不包括(B)。

A. NSAID B. 环磷酰胺 C. 羟氯喹 D. 糖皮质激素

33. 抑制尿酸合成的药物是(A)。

A. 别嘌醇

B. 苯溴马隆

C. 双氯芬酸

D. 丙磺舒

172. 骨关节炎的主要病变是(D)。

A. 关节内化脓性感染 B. 关节特异性炎症

C. 关节骨质疏松 D. 关节软骨退变和继发性骨质增生

173. 原发性和继发性骨质疏松最重要的影响因素是(D)。

A. 营养状态 B. 遗传基因

C. 物理因素 D. 激素调控

174. 全部为促进骨形成的一组药物是(C)。

A. 雌激素、双膦酸盐类、氟化物

- B. 双膦酸盐类、降钙素、钙制剂
- C. 氟化物、甲状旁腺激素、维生素 K
- D. 雌激素、双膦酸盐类、维生素 D3

175. 对于中、重度间歇性和持续性变应性鼻炎，首选药物是(C)。

- A. 抗组胺药 B. 口服糖皮质激素
- C. 鼻内用糖皮质激素 D. 鼻内用减充血剂

176. 结膜炎根据病因可分为细菌性、病毒性、免疫性，药物治疗不建议(C)。

- A. 局部给药为主，严重结膜炎必要时全身给药
- B. 根据微生物种类进行药物选择
- C. 长期混合几种抗菌药物滴眼液联合滴眼
- D. 眼膏宜睡前使用发挥持续治疗作用

177. 系统治疗银屑病的一线药物是(A)。

- A. 氨甲蝶呤 B. 硫唑嘌呤 C. 羟基脲 D. 抗菌药物

40. 诊断患者为重度子痫前期，血压持续升高为(D)。

- A. 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和(或)舒张压 $\geq 100\text{mmHg}$
- B. 收缩压 $\geq 150\text{mmHg}$ 和(或)舒张压 $\geq 100\text{mmHg}$
- C. 收缩压 $\geq 155\text{mmHg}$ 和(或)舒张压 $\geq 100\text{mmHg}$
- D. 收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ 和(或)舒张压 $\geq 110\text{mmHg}$

二、配伍题

- A. 洛伐他汀 B. 吉非贝齐
- C. 依折麦布 D. 考来烯胺

178. 属于贝特类药物的是(B)。

179. 属于羟甲基戊二酰辅酶 A 还原酶抑制剂的是(A)。

- A. 西咪替丁 B. 氢氧化镁 C. 米索前列醇 D. 莫沙必利

180. 保护胃黏膜的药物是(C)。

181. 中和胃酸的药物是(B)。

182. 抑制胃酸分泌的药物是(A)。

183. 促胃动力药物是(D)。

A. 强阿片类药，并可合用非甾体类抗炎药以及辅助镇痛药

B. 弱阿片类药物或低剂量的强阿片类药，并可联合应用非甾体类抗炎药以及辅助镇痛药

C. 非甾体类抗炎药物(NSAIDs)

D. 强阿片类药，并联合使用双膦酸盐类药物

184. 癌症患者轻度疼痛，可选用(C)。

185. 癌症患者中度疼痛，可选用(B)。

186. 癌症患者重度疼痛，首选(A)。

187. 癌症患者由骨转移引起的疼痛，选用(D)。

188. A. 伪麻黄碱

B. 氨溴索

C. 马来酸氯苯那敏

D. 奥司他韦

普通感冒常用药物中，能选择性收缩上呼吸道血管，对血压的影响较小的药物是(A)。

普通感冒常用药物中，有助于消除或减轻普通感冒患者的打喷嚏和流涕等症状，但常见不良反应包括嗜睡、疲乏的药物是(C)。

普通感冒常用药物中，常用的祛痰药是(B)。

189. A. 在人群中进行的、前瞻性的、用于评估医学干预措施效果的实验性对照研究

B. 队列研究、病例对照研究和横断面研究

- C. 将系统评价中的多个不同结果的同类研究，合并为一个量化指标的统计学方法，从统计学角度达到增大样本量、提高检验效能的目的
- D. 与药物作用直接相关的指标，表现为症状或检测指标的改善，通常在较短时间内出现变化

随机对照试验是指(A)。

荟萃分析是指(C)。

替代指标是指(D)。

属于观察性研究范畴的是(B)。

190. A. 利尿药

B. 钙通道阻滞剂

C. 血管紧张素转换酶抑制剂

D. 血管紧张素 II 受体拮抗剂

氢氯噻嗪属于(A)。

卡托普利属于(C)。

氨氯地平属于(B)。

氯沙坦属于(D)。

191. A. 冷湿敷，如 3%硼酸溶液、0.1%盐酸小檗碱溶液、0.1%依沙吖啶溶液等

B. 外用糖皮质激素软膏、乳剂或酊剂等，可合用保湿剂及角质松解剂

C. 外用氧化锌糊剂、糖皮质激素乳膏

D. 炉甘石洗剂、糖皮质激素乳膏或凝胶

湿疹急性期无水肿、糜烂、渗液时，药物治疗选择(D)。

湿疹急性期有大量渗出时，药物治疗选择(A)。

湿疹亚急性期药物治疗选择(C)。

湿疹慢性期药物治疗选择(B)。

192. A. 氟化物

B. 雌激素和孕激素

C. 活性维生素 D3

D. 非甾体抗炎药

治疗和预防骨质疏松症的药物中，抑制骨吸收的药物是(B)。

治疗和预防骨质疏松症的药物中，促进骨形成的药物是(A)。

193. A. 伪麻黄碱 B. 氨溴索

C. 马来酸氯苯那敏 D. 对乙酰氨基酚

能选择性收缩上呼吸道血管，用于缓解感冒引起的鼻塞、流涕和打喷嚏等症状的减充血剂是(A)。

能抑制呼吸道小血管扩张，用于消除或减轻感冒引起的打喷嚏和流涕等症状的抗组胺药是(C)。

能增加分泌物的排出，用于治疗感冒引起的痰多、咳嗽的祛痰药是(B)。

用于治疗感冒引起的发热、咽痛和全身痛等症状的解热镇痛药是(D)。

194. A. 地西泮 B. 多塞平

C. 唑吡坦 D. 艾司唑仑

治疗失眠的药物中，属于长效苯二氮革类药物的是(A)。

治疗失眠的药物中，属于非苯二氮革类药物的是(C)。

FDA 批准的唯一一种可用于治疗失眠的抗抑郁药是(B)。

治疗失眠的药物中，属于中效苯二氮革类药物的是(D)。

195. A. 以糖类为主要食物成分和餐后血糖升高的患者

B. 2 型糖尿病患者控制高血糖的一线用药和联合用药中的基础用药

C. 降低具有心血管高危风险的 2 型糖尿病患者主要心血管不良事件和肾脏

事件复合终点发生发展的风险

D. 通过刺激胰岛素的早期分泌而降低餐后血糖

二甲双胍在糖尿病指南中推荐作为（ B ）。

α -糖苷酶抑制剂适用于（ A ）。