

1. 药物治疗最初阶段，药物以不同制剂的形式，通过不同给药途径，从给药部位进入患者体内的过程，称为(D)。D. 药效学阶段
 2. 循证医学定义的核心内容，不包括(A)。A. 规章制度
 3. 医疗机构药学信息服务的核心，不包括(C)。C. 药品生产
 4. 关于药品说明书，下列说法正确的是(A)。A. 药品说明书具有法律效力
 5. 下列属于肾功能检查指标的是(B)。B. 血清肌酐
 6. 成人正常血小板计数参考范围为(C)。C. $(100—300) \times 10^9/L$
 7. 下列药物中常与他汀类联用的是(B)。B. 依折麦布
 8. 治疗心力衰竭的基本药物，不包括(B)。B. 维拉帕米
 9. 高血压的治疗原则是(C)。C. 个体化阶梯治疗
 10. HDL 是指(B)。B. 高密度脂蛋白
 11. 氨溴索属于(B)。B. 鼻黏膜血管收缩剂
 12. 避免吸入糖皮质激素后口咽部发生不良反应，可采用的方式不包括(B)。B. 选用干粉吸入剂
 13. 肺结核初治的治疗疗程为(A)。A. 强化期 2 个月 / 巩固期 4 个月
 14. 癫痫持续状态的首选药物为(A)。A. 静注地西洋
 15. 药疹治疗的首要措施是(D)。D. 停用致敏药物
 16. 治疗抗帕金森病的药物，单用无效的是(D)。D. 卡比多巴
 17. 阿尔茨海默病的危险因素，不包括(A)。A. 血液病
 18. 治疗轻、中度阿尔茨海默病的一线药物，不包括(D)。D. 美金刚联合多奈哌齐
 19. 失眠的首选药物，不包括(B)。B. 氯硝西洋
 20. 关于抗抑郁药物治疗原则，不恰当的是(D)。D. 尽可能多种药物协同使用
 21. 关于第二代抗精神病药物的描述，不正确的是(C)。C. 氯丙嗪和氟哌啶醇是常用第二代抗精神病药
 22. 消化性溃疡的发病机制，叙述较全面的是(D)。D. 致溃疡的攻击因素和人体对胃黏膜的保护因素失去平衡
 23. 下列关于微生态制剂的描述，不正确的是(C)。C. 活菌制剂可以与抗菌药物同服
 24. 属于短效胰岛素的是(A)。A. 生物合成人胰岛素
 25. 关于二甲双胍的说法，正确的是(C)。C. 二甲双胍是 2 型糖尿病患者控制高血糖的一线用药和联合用药中的基础用药
 26. 最适宜治疗巨幼细胞性贫血的药物是(D)。D. 铁剂及维生素 B₁₂
 27. 治疗妊娠高血压的药物，不包括(B)。B. 硫酸镁
 28. 使用期间应密切关注血糖水平的药物是(D)。D. 他克莫司
 29. 不宜用于泌尿系统感染的抗菌药物是(D)。D. 莫西沙星
 30. 肾病综合征最主要的诊断依据是(B)。B. 大量蛋白尿
 31. 阿片受体激动剂不包括(A)。A. 纳洛酮
 32. 轻度癌痛可选用的药物是(D)。D. 对乙酰氨基酚
 33. 患者骨肿瘤，疼痛评分 7 分，单独应用疗效欠佳的镇痛药物是(B)。B. 塞来昔布
 34. 关于降尿酸治疗的叙述，正确的是(B)。B. 降尿酸治疗的目标是促进晶体溶解和防止晶体形成
 35. 关于双膦酸盐的使用，不正确的是(C)。C. 服药后宜采取卧位
 36. 关于使用非甾体抗炎药治疗骨关节炎的叙述，正确的是(C)。C. 足量使用一种非甾体抗炎药 2~3 周后仍无效，可更换另一种，待有效后逐渐减量
 37. 关于体股癣的药物治疗，不正确的是(B)。B. 通常均应联合外用糖皮质激素
 38. 关于结膜炎的药物治疗，不正确的是(B)。B. 主要采用局部给药（眼用制剂），严重结膜炎不必全身给药
 39. 变应性鼻炎中，中重度间歇性和持续性鼻炎的首选药物是(D)。D. 鼻内用糖皮质激素
 40. 用于青光眼降眼压的常用药物，不包括(A)。A. 氟米龙
1. 影响药物治疗的主要因素，不包括()。D. 天气
 2. 按照 GRADE 证据质量分级标准，证据质量共被分为()级。B. 4
 3. 不属于临床研究的是()。A. 专家会诊
 4. 药学信息服务不包括()。D. 处方审查
 5. 不属于冠心病的风险因素的是()。C. HDL-C 水平增高
 6. 蛋白尿指尿液中蛋白质含量超过()。C. 150mg/24h
 7. 利尿剂的主要不良反应是()。A. 大剂量使用会导致低血钾症和影响血脂、血糖和尿酸代谢
 8. 关于贝特类药物说法错误的是()。D. 对 TG 无降低作用甚至稍有升高

9. 对于口服华法林的非瓣膜性房颤患者，应调整药物剂量使 INR 保持在 ()。C. 2.0-3.0
10. 血管紧张素转换酶抑制剂的禁忌证不包括 ()。B. 蛋白尿患者
11. 治疗哮喘给药途径以吸入疗法为优，表述不正确的是 ()。D. 血药浓度高
12. 控制慢性阻塞性肺疾病症状的主要治疗措施是使用 ()。A. 支气管扩张剂
13. 下列不是双重抗血小板治疗首选指征的是 ()。D. 心源性栓塞导致的脑卒中
14. 癫痫持续状态的首选药物治疗为 ()。C. 静注地西泮
15. 关于左旋多巴不良反应的说法，错误的是 ()。D. 肝性脑病
16. 抗帕金森病的药物是 ()。D. 胆碱受体阻断药
17. 治疗头癣的口服药首选 ()。A. 灰黄霉素
18. 下列关于失眠治疗的说法，错误的是 ()。C. 对于急性失眠，不应使用药物治疗，以免形成药物依赖
19. 与抑郁症药物治疗相关的神经递质不包括 ()。D. 多巴胺
20. 精神分裂症最主要、最本质的症状是 ()。B. 思维障碍
21. 精神分裂症药物治疗原则，错误的是 ()。B. 复发患者应换用之前未使用过的药物
22. 根除幽门螺杆菌的三联疗法，不合理的是 ()。A. 胶体次枸橼酸铋+四环素+甲硝唑
23. 以下关于药物蒙脱石的描述，错误的是 ()。D. 不适用于儿童腹泻
24. 非促胰岛素分泌剂不包括 ()。C. 格列奈类
25. 以下关于抗甲状腺药物的说法，不正确的是 ()。B. 因治疗需要，抗甲状腺药物导致的过敏反应可用抗组胺药物治疗，不能停药
26. 硫脲类抗甲状腺药起效慢的主要原因是 ()。D. 待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效
27. 属于抗纤维蛋白溶解药的是 ()。A. 酚磺乙胺
28. 下列药物在治疗肾病综合征时需注意高血钾的是 ()。D. 螺内酯
29. 尿路感染最常见的细菌为 ()。B. 大肠埃希菌
30. 对疼痛的定义正确的表述是 ()。C. 是组织损伤或潜在的组织损伤所引起的不愉快感觉和情感体验
31. 癌症患者轻度疼痛，可选用 ()。A. 非甾体抗炎药
32. 不符合三阶梯止痛治疗方案的用药原则的是 ()。B. 疼痛时给药
33. 下列是系统性红斑狼疮的基础治疗药物，可控制皮疹和减轻光过敏的是 ()。A. 羟氯喹
34. 下列关于非甾体抗炎药治疗类风湿关节炎，使用注意中不正确的是 ()。D. 可同时服用两种或两种以上非甾体抗炎药
35. 雌激素预防和治疗骨质疏松的主要作用机制是 ()。B. 雌激素与骨细胞上雌激素受体结合，抑制破骨细胞的骨吸收作用，使骨基质形成增加
36. 关于骨质疏松，下述说法中不正确的是 ()。D. VD_3 是维生素类药物，故可安全放心地服用
37. 常用的减充血剂不包括 ()。C. 氯雷他定
38. 眼用糖皮质激素抗炎效力正确的是 ()，C. 地塞米松>氟米龙>泼尼松龙>氢化可的松
39. 通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是 ()。C. 硝苯地平
40. 银屑病临床上可分为 ()。D. 寻常型、脓疱型、关节病型、红皮病型
1. 医生开具处方应当遵循的原则是 ()。C. 选用安全、有效、经济的药物
2. 下列证据类型中，不属于原始研究的是 ()。A. 系统评价
3. 终点指标不包括 ()。C. 血糖水平
4. 循证医学定义的核心内容不包括 ()。A. 规章制度
5. 成年男性贫血的诊断标准是 ()。B. 血红蛋白<120g/L
6. 反映糖尿病较长时间血糖控制水平的“金指标”是 ()。D. 糖化血红蛋白
7. 下列关于肾上腺素受体阻滞剂说法正确的是 ()。D. β 受体阻滞剂尤其适用于伴快速心律失常、冠心病、心力衰竭、交感神经活性增高以及高动力状态的高血压患者
8. 药学信息服务不包括 ()。D. 进行新药的研究和开发
9. 不属于心力衰竭治疗基本药物的是 ()。C. 维拉帕米
10. 不属于抗心律失常药物治疗的目的及原则的是 ()。D. 选择抗心律失常药物时，优先考虑有效性而不是安全性
11. 与伪麻黄碱合用可能造成“重复用药”的药物是 ()。A. 泰诺
12. 长期治疗持续性哮喘的首选药物为 ()。B. 布地奈德干粉吸入剂 (都保)
13. 脑血栓形成最常见的病因是 ()。A. 脑动脉粥样硬化
14. 药疹治疗的首要措施是 ()。C. 停用致敏药物
15. 推荐在给药前进行 HLA-B*1502 基因筛查的药品是 ()。D. 卡马西平

16. 左旋多巴治疗帕金森病的机制是 ()。A. 左旋多巴在脑内转变为 DA, 补充纹状体内 DA 的不足
17. 下列不属于阿尔海默病的危险因素的是 ()。C. 血液病
18. AD 患者在治疗过程中出现幻觉、妄想等精神症状, 可以选用的药物是 ()。B. 奥氮平
19. 属于短效 BZDs 类的药物是 ()。A. 咪达唑仑
20. 患者男, 16 岁, 诊断抑郁症, 应用氟西汀 3 个月后, 抑郁症状完全消失, 下一步处理是 ()。D. 继续原方案治疗
21. 第二代抗精神病药物的特点错误的是 ()。A. 作用机制为单一阻断多巴胺受体, 故称为典型抗精神病药物
22. 关于消化性溃疡的发病机制的叙述较全面的是 ()。B. 致溃疡的攻击因素和人体对胃黏膜的保护因素失去平衡
23. 不属于甲氧氯普胺禁忌证的是 ()。C. 恶心、呕吐
24. 下列关于药物治疗作用的描述, 错误的是 ()。A. 磺脲类药物是通过作用于胰岛 β 细胞表面的受体促进胰岛素分泌
25. 关于二甲双胍的说法不正确的是 ()。A. 本品不可与磺脲类口服降糖药合用, 合用时低血糖风险增加
26. 可促进铁剂吸收的维生素是 ()。D. 维生素 C
27. 妊娠高血压进行降压治疗的药物不包括 ()。D. 硫酸镁
28. 下列药物使用期间应密切关注血糖的是 ()。B. 他克莫司
29. 不宜处方用于泌尿系统感染的抗菌药物是 ()。B. 莫西沙星
30. 第五生命体征是 ()。B. 疼痛
31. 不属于阿片类药物的特点的是 ()。B. 具有封顶效应
32. 不符合三阶梯止痛治疗方案的用药原则的是 ()。B. 疼痛时给药
33. 下列是系统性红斑狼疮的基础治疗药物, 应长期维持使用的是 ()。A. 羟氯喹
34. 下列关于 NSAID 的描述, 错误的是 ()。B. 对腰椎间盘突出症而言, 使用 NSAID 可以防止疾病的发展及合并症的发生
35. 关于阿仑膦酸钠患者用药指导, 不正确的是 ()。C. 服药后可静卧 10 分钟
36. 下列关于维生素 D3 治疗骨质疏松的说法中, 不正确的是 ()。D. 长期服用维生素 D3, 也不会导致患者维生素 D3 蓄积中毒
37. 下列不是常用的减充血剂的是 ()。C. 氯雷他定
38. 眼用糖皮质激素可起到抗炎、抗过敏的治疗作用, 下列说法正确的是 ()。C. 抗炎效力: 地塞米松 > 氟米龙 > 泼尼松龙 > 氢化可的松
39. 对于脱髓鞘性视神经炎患者在病情需要时可予大剂量糖皮质激素冲击治疗, 治疗方案是 ()。B. 甲泼尼龙 1g/d 静脉滴注
40. 银屑病临床上可分为 ()。D. 寻常型、脓疱型、关节病型、红皮病型
1. 下列说法不正确的是 (B) B. 以肾排泄为主的药物, 在肾衰竭时 $T_{1/2}$ 明显缩短
2. RCT 的含义是 (C) C. 随机对照试验
3. 按照 GRADE 证据质量分级标准, 证据质量共被分为 (B) 级。B. 4
4. 药学信息服务不包括 (D) D. 进行新药的研究和开发
5. 成人正常血小板计数参考范围为 (A) A. $(100 \sim 300) \times 10^9/L$
6. 通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是 (C) C. 硝苯地平 D
7. 不属于心力衰竭治疗基本药物的是 (C) C. 维拉帕米
8. 关于他汀类说法错误的是 (B) B. 最严重的不良反应是粒细胞减少及肾功能受损
9. 关于华法林的说法, 不正确的是 (D) D. 食物对华法林的作用影响小
10. 患者, 男, 72 岁, 主因“血压升高 6 个月”入院。患者不规律服用中成药, 血压控制不佳。3 个月前患者将降压药物调整为氨氯地平, 血压波动于 $160 \sim 170/90 \sim 100 \text{mmHg}$ 。该患者目前血压控制不佳, 需联合降压药物, 不适合的是 (B) B. 硝苯地平
11. 对乙酰氨基酚 (扑热息痛) 属于 (A) A. 解热镇痛药
12. 避免吸入激素后的口咽部不良反应的方式中, 不正确的表述是 (D) D. 选用普通定量气雾剂
13. 肺结核初治的疗程为 (A) A. 强化期 2 个月 / 巩固期 4 个月
14. 他汀类药物对缺血性脑卒中患者的作用不包括 (A) A. 预防脑血管痉挛
15. 重型药疹及早应用 (D) D. 糖皮质激素
16. 下列药物单用治疗帕金森病无效的是 (B) B. 卡比多巴
17. 阿尔茨海默症患者的首发症状是 (A) A. 记忆障碍
18. 不属于治疗轻中度 AD 的一线药物的是 (B) B. 美金刚联合多奈哌齐
19. 下列不是失眠首选药物的是 (D) D. 氯硝西洋
20. 以下抗抑郁药物治疗原则不恰当的是 (C) C. 如仍无效, 可考虑换药, 但不能换用同类另一种药
21. 下列精神分裂症药物治疗原则错误的是 (B) B. 复发患者应换用之前未使用过的药物

22. 下列根除幽门螺杆菌的三联疗法不合理的是(D)。D. 硫糖铝十阿莫西林十替硝唑
23. 关于药物蒙脱石的描述, 错误的是(D)。D. 不适用于儿童腹泻
24. 不属于非促胰岛素分泌剂的是(C)。C. 格列奈类
25. 以下关于抗甲状腺药物的说法不正确的是(B) B. 因治疗需要, 抗甲状腺药物导致的过敏反应可用抗组胺药物治疗, 不能停药
26. 硫脲类抗甲状腺药起效慢的主要原因是(D)。D. 待已合成的甲状腺激素耗竭后才能生效
27. 属于抗纤维蛋白溶解药的是(A)。A. 酚磺乙胺
28. 使用时需注意高血钾的药物是(D)。D. 螺内酯
29. 尿路感染最常见的细菌为(B)。B. 大肠埃希菌
30. 对疼痛的定义正确的表述是(C)。C. 是组织损伤或潜在的组织损伤所引起的不愉快感觉和情感体验
31. 属于阿片受体拮抗剂的药品是(C)。C. 纳洛酮
32. 三阶梯止痛治疗方案的代表药物(A)。A. 阿司匹林、可待因、吗啡
33. 治疗类风湿关节炎的药物中, 每周给药一次的是(C)。C. 氨甲蝶呤 D
34. 一位患者的 HLA-B*5801 基因检测结果为阳性, 如果他需要进行降尿酸的药物治疗, 应避免使用(B)。B. 别嘌醇
35. 男性患者, 72 岁, 因左膝关节行走远距离后疼痛 5 年就诊, 正侧位 X 线显示左膝内侧间隙变窄, 边缘骨质增生, 软骨下骨硬化, 患者首选的药物治疗是(A)。A. 短期口服非甾体抗炎药
36. 滴虫性阴道炎的治疗药物首选(B)。B. 甲硝唑
37. 老年人缺乏维生素 Da 的主要影响因素是(D)。D. 户外活动减少
38. 急性鼻炎的最常见病原体种类为(B)。B. 鼻病毒
39. 结膜炎根据病因可分为细菌性、病毒性、免疫性, 以下药物治疗方法中不建议采用的是(C)。C. 长期混合几种抗菌药物滴眼液联合滴眼
40. 下列不是青光眼降眼压的常用药物的是(C)。C. 氟米龙

二、配伍选择题(配伍选择题是一组试题(2-4 题)共用四个备选项。备用选项在前, 题干在后。备用选项可重复选用, 也可不选用。每道题只有一个最佳答案。每题 2 分, 共 20 分)

41. 妊娠高血压疾病的药物治疗, 硝苯地平用于(A)。A. 降压治疗
42. 妊娠高血压疾病的药物治疗, 硫酸镁用于(C)。C. 防治子痫
43. 妊娠高血压疾病的药物治疗, 地西洋用于(B)。B. 镇静
44. 肾病综合征患者服用利尿剂时应(D)。D. 监护电解质水平
45. 肾病综合征患者长期应用环孢素期间应(B)。B. 密切监测血药浓度及肝肾功能
46. 肾病综合征患者应用吗替麦考酚酯期间应(C)。C. 密切监测血常规、肝功能
47. 肾病综合征患者应用他克莫司期间需(A)。A. 密切监测血药浓度, 肾功能和血糖
48. 治疗和预防骨质疏松症的药物中, 抑制骨吸收的药物是(B)。B. 雌激素和孕激素
49. 治疗和预防骨质疏松症的药物中, 促进骨形成的药物是(A)。A. 维生素 K
50. 治疗和预防骨质疏松症的药物中, 作用于骨矿化的药物是(C)。C. 维生素 D₃
41. 普通感冒常用药物中, 能选择性收缩上呼吸道血管, 对血压的影响较小的药物是()。A. 伪麻黄碱
42. 普通感冒常用药物中, 有助于消除或减轻普通感冒患者的打喷嚏和流涕等症状, 但常见不良反应包括嗜睡、疲乏的药物是()。C. 马来酸氯苯那敏
43. 普通感冒常用药物中, 常用的祛痰药是()。B. 氨溴索
44. 治疗失眠的药物中, 属于长效苯二氮革类药物的是()。A. 地西洋
45. 治疗失眠的药物中, 属于非苯二氮革类药物的是()。C. 唑吡坦
46. FDA 批准的唯一一种可用于治疗失眠的抗抑郁药是()。B. 多塞平
47. 湿疹急性期无水肿、糜烂、渗液时, 药物治疗选择()。D. 炉甘石洗剂、糖皮质激素乳膏或凝胶
48. 湿疹急性期有大量渗出时, 药物治疗选择()。A. 冷湿敷, 如 3%硼酸溶液、0.1%盐酸小檗碱溶液、0.1%依沙吖啶溶液等
49. 湿疹亚急性期药物治疗选择()。C. 外用氧化锌糊剂、糖皮质激素乳膏
50. 湿疹慢性期药物治疗选择()。B. 外用糖皮质激素软膏、乳剂或酊剂等, 可合用保湿剂及角质松解剂
41. 随机对照试验是指()。A. 在人群中进行的、前瞻性的、用于评估医学干预措施效果的实验性对照研究
42. 荟萃分析是指()。C. 将系统评价中的多个不同结果的同类研究, 合并为一个量化指标的统计学方法, 从统计学角度达到增大样本量、提高检验效能的目的
43. 替代指标是指()。D. 与药物作用直接相关的指标, 表现为症状或检测指标的改善, 通常在较短时间内出现变化

44. 属于观察性研究范畴的是 ()。B. 队列研究、病例对照研究和横断面研究
45. 治疗失眠的药物中, 属于长效苯二氮革类药物的是 ()。A. 地西洋
46. 治疗失眠的药物中, 属于非苯二氮革类药物的是 ()。C. 唑吡坦
47. FDA 批准的唯一一种可用于治疗失眠的抗抑郁药是 ()。B. 多塞平
- D. 在葡萄糖或其他刺激下胰岛 B 细胞分泌的一种激素
48. 二甲双胍在糖尿病指南中推荐作为 ()。B. 2 型糖尿病患者控制高血糖的一线用药和联合用药中的基础用药
49. α -糖苷酶抑制剂适用于 ()。A. 以糖类为主要食物成分和餐后血糖升高的患者
50. 钠葡萄糖共转运体 2 抑制剂可 ()。C. 降低具有心血管高危风险的 2 型糖尿病患者主要心血管不良事件和肾脏事件复合终点发生发展的风险
41. 氢氯噻嗪属于 (A)。A. 利尿药
42. 卡托普利属于 (C)。C. 血管紧张素转换酶抑制剂
43. 氨氯地平属于 (B)。B. 钙通道阻滞剂
44. 氯沙坦属于 (D)。D. 血管紧张素 II 受体拮抗剂
45. 湿疹急性期无水肿、糜烂、渗液时, 药物治疗选择 (D)。D. 炉甘石洗剂、糖皮质激素乳膏或凝胶
46. 湿疹急性期有大量渗出时, 药物治疗选择 (A)。A. 冷湿敷, 如 3% 硼酸溶液、0.1% 盐酸小檗碱溶液、0.1% 依沙吖啶溶液等
47. 湿疹亚急性期药物治疗选择 (C)。C. 外用氧化锌糊剂、糖皮质激素乳膏
48. 湿疹慢性期药物治疗选择 (B)。B. 外用糖皮质激素软膏、乳剂或酊剂等, 可合用保湿剂及角质松解剂
49. 治疗和预防骨质疏松症的药物中, 抑制骨吸收的药物是 (B)。B. 雌激素和孕激素
50. 治疗和预防骨质疏松症的药物中, 促进骨形成的药物是 (A)。A. 氟化物