

一.单项选择题[每题 2 分,共 50 分]

1. 正常情况下,妊娠 32 周末,孕妇的宫底高度位于(.
D.剑突与脐之间
- 2.首次产前检查应在().
A. 确定妊娠时
- 3 关于产褥期的子宫变化,下述正确的是()-
D.产后 6 周子宫回复至正未孕大小
- 4、围绝经期妇女,由于雌激素缺乏可引起().
B 萎缩性膀胱炎
- 5.绝经过渡期妇女体内激素发生明显的变化特点是().
B FSH 分泌量增加
6. 婚前医学检查的主要疾病,不包括(.
D.脾、胃、肠等脏器的急、慢性疾病
- 7.绒毛膜癌最主要的转移途径是(.
C. 血行转移
- 8 化疗前需要准确测量患者体重的原因是(.
D 精确计算药剂量
9. 妊娠期高血压疾病最基本的病理生理变化是().。
A.全身小动脉痉挛
- 10.妊娠期高血压病患者使用硫酸镁解痉时,应停用药物的情况是().
C 膝反射消失
- 11.某 40 岁妇女,白带多,偶伴性交后出血现象,妇科检查 t 宫颈重度糜烂。为排除宫颈癌,首选的检查项目是(.
A. 宫颈刮片细胞学检查
12. 胎盘早期剥离的主要病理变化是出血发生在().
C 底蜕膜
- 13, 张女士被诊断为有排卵性功血,并疑为子宫内膜不规则脱落,告诉她刮取子宫内膜进行活检的时间是().
B. 月经第 5 日
- 14, 计算身长的公式;身高(cm)=年龄×7+ 70(cm),适用的年龄段是().
D.2—12 岁
15. 小儿先会画直线后会画圆,图形,遵循的发育顺序是().
E. 由简单到复杂的顺序
- 16.1 岁以内婴儿每千克体重每日需要能量为().
c. 460kJ
- 17, 超低出生体重儿是指().
D 出生体重不是 1000g 的新生儿
18. 新生儿出生后开始排胎便的时间一般为().
C.生后 12 小时内
- 19.新生儿硬肿症,患儿肛温<30℃,暖箱开始温度应为().
B. 比体温高 1℃
20. 佝偻病活动期(微期)的主要表现是().
C 骨骼系统改变
21. 一个小儿,原体重 11kg,2 天来腹泻较重,今日尿较少,测体重仅为 10.2kg,查血清钠为

134mmo/L,该患儿脱水的性质和程度是()。

A.等渗中度脱水

22. 要幼儿肺炎最常见的类型是()。

c 支气管肺炎

23. 法洛三联症的心脏畸形中对患儿的病理生理和临床表现影响最重要的是()。

A. 肺动脉狭窄

24. 猩红热易出现的并发症是《》。

D 急性肾小球性肾炎

25. 结节性红斑,虑疹性结膜炎常见于()。

B. 原发性肺结核

二,名词解释(每题 4 分,共 20 分)

26. 适于胎龄儿

指出生体重(1 分)在同胎龄儿平均体重(1 分)的第 10-90 百分位(1 分)的要儿(1 分)。

27. 低渗脱水

电解质的丢失大于水的丢失(1 分),血清钠<130mmol/L(1 分),多见于营养不良小儿伴较长时间腹泻者或腹泻时口服大量清水,静脉输入大量非电解质液体,以及因疾病长期间盐等情况(1 分)。临床上除脱水体征较重外,易出现外周循环衰竭表现(1 分)。

28. 衔接

是指在枕先露分娩机制中(0.5 分),胎头双顶径(0.5 分)进入骨盆入口平面(1 分),胎头颅骨最低点(1 分)接近或达到坐骨棘水平时的状态(1 分),称为衔接

29. 前置胎盘

正常胎盘附着于子宫体部的后壁、前壁或侧壁(0.5 分),孕 28)周后(0.5 分)若胎盘附着于子宫下段(1 分),甚至胎盘下缘达到或覆盖宫颈内口处(1 分),其位置低于胎儿的先露部(1 分),称为前置胎盘。

30. 人工流产综合反应

指手术时因疼痛或局部刺激(1 分)使受术者在术中或术毕出现心动过缓,心律不齐、面色苍白,头昏,胸闷、大汗淋漓,(1 分)严重者甚至出现血压下降、昏厥、抽搐等迷走神经兴奋症状。(1 分)症状的出现及其严重程度与受术者的情绪,身体状况及手术操作有关。(1 分)

三.简答题【每题 6 分,共 18 分)

31. 简述妇科腹部手术后患者缓解腹胀的护理措施。答:刺激肠蠕动,缓解腹胀的措施有:

(1)可采用生理盐水低位灌肠,1、2、3 灌肠,热敷下腹部等,(3 分)

(2)若肠蠕动已恢复但仍未排气者,可针刺足三里,肛管排气,或按医嘱皮下注射新斯的明等。(2 分)

(3)术后第 2 天,护士可指导卧床患者进行肢体运动,根据情况协助患者术后早期下床活动 r 以利于改善胃肠功能,预防或减轻腹胀。(1 分)

32. 列出 3 种孕妇常见的症状。

答:(1)恶心,呕吐。

(2)尿频~限急。(3)水肿。

(4)便秘。(5)腰背痛。(6)下肢痉挛。

(7)仰卧位低血压综合征。

(以上内容只要列出 6 项即可,每项 1 分)

33. 简述心跳呼吸骤停的临床表现。

答:心跳呼吸骤停的临床症状和体征如下:(1 意识突然丧失,可有一过性拍菌。(1 分)《2》大动脉搏动消失,血压测不出。(1 分)>(3)心音消失或心动严重过缓。(1 分)

(4 呼吸停止或严重呼吸困难(表浅、缓慢、倒气)。《(1 分)此外瞳孔散大,紫绀为参考依据。(1 分)心电图可表现为:呈等电位表现;或严重心律失常及电机械分离(1 分)。四.病例分析(共 12 分)
34, 患儿,女 v3 岁,发现心脏杂音 2.年,2 天来咳嗽,1 天来加重伴发热。患儿于 2 年前体检时,发现心前区有杂音,疑为先天性心脏病,但未作进一步检查确诊。2 天前著凉后咳嗽,1 天来咳嗽加重伴有发热,体温 38℃—39℃。平时身体较弱,活动尚可,但易疲乏、易感冒咳嗽,一年前患过一次肺炎。病后食欲稍差,二便正常。体检:神清体格发育稍落后身高 89cm,体重 12kg,T37.8℃.心前区膨隆,心律齐,心率 132 次/分,胸骨左缘 3—4 肋间可闻 M/6—M/6 级粗糙的全收缩期反流性杂音,并可触及收缩期震颤,肺动脉第二音增强。两肺扣诊清音,两肺呼吸音粗,两肺底部可闻毯密中小圈啰音,腹软肝肋下 0.5cm 脾未及。神经系统(一),脊柱四 1032 肢无畸形。心脏 X 线检查;心脏外形中度增大,以左心室为主。肺纹理粗。心电图检查,显示左心室肥大。该患儿诊断为室间隔缺损,支气管肺炎。

请问;应采取什么护理措施?

答;(1 一般护理

身心评估,注意患儿的病史和病情,体征及化验检查情况及其意义。②观察病情,注意患儿神志及 T,P,R 的变化,有无呼吸困难,面色发绀。③生活管理:注意营养,保证休息。

环境清洁、空气清新,定时通气换气,保证合适的室内温度(18℃--22℃)和湿度(55%--60%).(答对 1 项得 1 分,共 4 分)

(2>改善症状

①体位 z 可采取头高位或半卧位,以利呼吸。经常给患儿更换体位或抱起,防止肺不张和减少肺充血。

②保持呼吸道通畅,及时清除患儿呼吸道分泌物必要给予吸痰。R 有缺氧表现时,及时给予氧疗。

④维持正常体温,定时测体温,体温超过 38.5℃给予物理降温或药物降温。⑤遵医嘱给予药物治疗并观察疗效和副作用,如抗生素、止咳化痰平喘剂等。(答对 1 项得 1 分,共 5 分)

(3 健康指导

①向家长介绍先心病的相关知识和肺炎的预防和护理知识。②对家长讲解先心病进一步检查,治疗的知识和日常护理知识。向家长介绍当前所用药物的用法和相关知识。

一、单项选择题(每题 2 分,共 50 分)

- 1.婚前卫生咨询时,建议服务对象控制下一代性别的是().
C.X 染色体连锁隐性遗传病
- 3.关于孕期母体血液成分的变化,错误的是().
C.血浆蛋白尤其是白蛋白增加
- 4.为预防负压吸引术后感染,嘱受术者术后禁止性生活及盆浴的期限是术后().
D1 个月
- 5.下列症状可能与绝经有关,但应除外()
D.严重抑郁,多次自杀倾向
6. 为了降低
A,叶酸
- 7.在分娩过程中起主导作用的产力是().
A,子宫收缩力
- 9.绒毛膜癌最主要的转移途径是().
C.血行转移
- 10.葡萄胎病人在随访期间最好的进力法
B.避孕套
- 12.李女士, 56 岁,绝经 5 年后阴道流血 2 个月,出血量时多时少,盆腔检查:宫颈光滑,子宫正常大小,软,双侧附件正常。怀疑子宫内膜癌,为明确诊断,首选的辅助检查是().
D.分段诊断性刮宫
- 13.一般体格生长,下列几个年龄阶段增长最快的是().
B 婴儿期前 6 个月
- 14.体重达到出生体重的 3 倍的年龄是()
D.11 个月
- 15.婴儿平衡与大运动的发育,正确的是()-
B3 个月时抬头很稳
- 16.关于预防接种的局部反应,正确的是().
D.一般 24—48 小时消退
- 17.正常婴儿,身高 65cm,可独坐一会儿,会用手摇玩具,能认出熟人和陌生人,最可能的月龄是().
B.6 个月
- 18.新生儿的正常呼吸频率为().
E.40~45 次/min
- 19.新生儿肺表面活性物质缺乏可导致().
B.新生儿肺透明膜病
- 21.引起小儿秋冬季腹泻最常见的病毒是().
A,轮状病毒
- 22.重症肺炎因缺氧及二氧化碳潴留可发生().
E.混合性酸中毒
- 23.多数婴儿动脉导管解剖团合的年龄是().
A.3~4 个月
- 24.儿科门诊护士分诊,早期发现林修的取 n B.口腔黏膜柯氏斑天版
B.口腔称膜柯氏斑
25. 以下几项病变可引起周围性呼吸衰竭的是(.

B. 支气管肺炎

二、名词解释(每题 4 分,共 20 分)

28. 低出生体重儿

指出生体重小于 2500g 的新生儿。

29. 哮喘持续状态

哮喘持续发作,在合理应用常规拟交感神经药物和茶碱类药物治疗后仍有严重或进行性呼吸困难,时间一般在 12h 以上称为哮喘持续状态。

30. 皮肤黏膜淋巴结综合征<概念,临床特征)

皮肤黏膜淋巴结综合征又称为川 0 病,是一种病因未明的变态反应性全身小血管炎性病变,临床特点为急性发热,皮疹,皮肤黏膜病损和淋巴结肿大。

三、简答题(每题 6 分,共 18 分)

31. 简述孕妇便秘、腰背痛和下肢痉挛的护理要点。

(1)便秘嘱孕妇养成每日定期排便的习惯,多吃水果、蔬菜等含纤维素多的食物,增加每日饮水量,注意适当活动,未经医生允许不可随便使用大便软化剂或轻泻剂。(2 分)

(2)腰背痛指导孕妇在俯拾或抬举物品时,保持上身直立,弯曲膝部,用两下肢的力量抬起,疼痛严重者,必须卧床休息(硬床垫),局部热敷。(2 分)

(3)下肢牵,孕妇饮食中增加钙的摄入,避免腿部疲劳、受凉,伸腿时避免脚趾尖伸向前,走路时脚跟先着地。痉挛发生时,背屈肢体或站直前倾,或局部热敷按摩。(2 分)

32. 简述新生儿生理性黄的特点。

1)一般情况良好。(1 分)

(2)足月儿生后 2~3 天出现,4~5 天达高?,(1 分)5~7 天消退,最迟不超过 2 周;早产儿出现稍晚,可至 3~4 周消退。(1 分)

(3)每日胆红素浓度升高 $\leq 85\mu\text{mol/L}$ 。(1 分)

(4)血清胆红素浓度足月儿不超过 $220.6\mu\text{mol/L}$,(1 分)早产儿不超过 $256.5\mu\text{mol/L}$ 。(1 分)注意较小早产儿胆红素低于 $171\mu\text{mol/L}$ 时,也可发生胆红素脑病。

33. 简述小儿肺炎合并心力衰竭的表现。

—

(1)心率突然加快,婴儿 ≥ 180 次/分,幼儿 ≥ 160 次/分;(1 分)

(2)呼吸突然加快,超过 60 次/分;(1 分)

(3)突然出现极度烦躁不安,明显发绀,面色发灰,指(趾)甲微循环充盈时间延长;(1 分)

(4)肝脏迅速增大;(1 分)

(5)心音低钝,或有奔马律;(1 分)

(6)尿少或无尿,颜面、眼睑或下肢水肿,颈静脉怒张。1 分)

四、病例分析题(共 12 分)

34. 李女士,30 岁,初产妇,停经 28 周,因阴道流血 1 天收入院。患者于 1 日前无明显诱因出现阴道流血,量较多,无腹痛。入院检查:血压 120/75mmHg,尿蛋白(一),下肢水肿(一),血色素 82g/L.B 超提示胎盘位于子宫右后壁延至前壁覆盖宫颈内口,为前置胎盘,该孕妇现接受期待疗法的治疗方案。

问题:为该孕妇确定 2 个主要的护理问题,并针对护理问题制定相应的护理措施。参考答案:

(1 潜在并发症:出血性休克(2 分)60(Gp 大质出然门央中)令太么氏念现护理措施:

D 保证休息孕妇需要绝对卧床休息,尤以左侧卧位为佳,并间断吸氧,每日 3 次,每次 1 小时。(1 分)

②减少刺激孕妇需避免各种刺激,以减少出血机会。医护人员进行腹部检查时动作要轻柔,禁作阴道检查及肛查,(1 分)

③监测生命体征,及时发现病情变化严密观察并记录孕妇生命体征,阴道流血的量、色、流血时间及一般状况,监测胎儿宫内状态。并按医嘱及时完成实验室检查项目,查血型,交叉配血备用。发现异常及时报告医师并配合处理。(2分)

(2>有感染的危险:与孕妇贫血有关(1分)

护理措施:

遵医嘱行口服硫酸亚铁、输血等措施。(1分)

②加强饮食营养指导建议孕妇多食高蛋白以及含铁丰富的食物,如动物肝、绿叶蔬菜以及豆类等。(1分)

3 加强会阴部护理使用消毒会阴垫,并及时更换,以保持会阴部清洁、干燥,(1分) ④监测孕妇的体温、血象及阴道流血、分泌物的性质、颜色、气味等,及时发现感染征象。

(1分)

⑤协助取样,监测孕妇血色素值的变化。(1分)

妇产科学与儿科护理学试题

一.单项选择题(每题 2 分,共 50 分)

- 1 正常胎心率的范围是().
C.120~160 次/分
2. 帮助胎儿先露部在盆腔内进行内旋转的主要力量是().
E.肛提肌收缩力
- 3.产程进展的标志是().
C.胎头下降和宫口扩张
- 4.在第二产程新生儿娩出后,首选的护理措施是().
E.清理呼吸道
5. 临产后肛查了解胎头下降程度的标志是()
C,坐骨棘
- 6.下列属于放置宫内节育器的禁忌证是(
D 近 3 个月阴道不规则流血
- 7.关于人工流产后护理,正确的是()
C.应注意观察腹痛、阴道流血等症状
- 8.绝经后妇女,补充雄激素可以预防骨质疏松的理由是()
A,减少骨吸收
- 9.卵巢肿瘤患者最常见的并发症是(
C 蒂扭转
- 10.良性滋养细胞疾病的最常见症状是()
D.停经后阴道出血
- 11.关于妊娠期高产程
C. 胎儿娩出前肩后立即静推麦角新碱
- 12.关于妊娠合并糖尿病的叙述,错误的是
C.不会导致胎儿生长受限
13. 新生儿生后排尿的时间一般为().
D 生后 24 小时内
- 14.出生体重为 3kg,一个 11 个月大的婴儿体重大约应为(.
C.9kg
- 15.小儿时期特有的能量需要是()
E.生长发育所需
- 16.乙肝第二次接种的年龄是(.
B1 个月
- 17 低出生体重儿是指()
C.出生体重不足 2500g 的新生儿
- 18.正常新生儿的心率平均为()
D.120~140 次/min
19. 关于新生儿硬肿症的叙述,正确的是().
A,最先发生硬肿的部位是小腿或大腿外侧
- 20.对佝偻病患儿定期户外活动的指导, 正确的是(
B.出生 1 个月可以开始定期户外活动
- 21.小儿脱水补充累积损失量阶段补液时间是(
C. 8~12h

22.重症与轻症肺炎的主要区别是()。

E.累及其他系统

23.佝偻病活动期(激期)的主要表现是()。

C.骨骼系统改变

24.水痘患儿应隔离至()。

C.全部皮疹结痂

25.婴幼儿肺炎最常见的类型是()。

C.支气管肺炎

二名词解释(每题 4 分,共 20 分)

26.适于胎龄儿

指出生体重在同胎龄儿平均体重的第 10~90 百分位的婴儿。

27.新生儿溶血症

是指因母子血型不合,母亲的血型抗体通过胎盘进入胎儿循环,发生同种免疫反应导致胎儿新生儿红细胞破坏而引起的溶血。

28.哮喘持续状态

哮喘持续发作,在合理应用常规缓解药物拟交感神经药和茶碱类药物治疗后,仍有严重或进行性呼吸困难者,时间一般在 12h 以上,称为哮喘危重状态,又称为哮喘持续状态。

29.围绝经期综合征

部分妇女在围绝经期期间可以出现一系列因性激素减少所致的征候群,被称为围绝经期综合征。

30.库肯勃瘤

心 1.出源法急长版永;大振五则长奥

是一种特殊的卵巢转移癌,原发部位为胃肠道,肿瘤为双侧,中等大小,实性,多伴有腹水。

三、简答题(每题 6 分,共 18 分)

31.简述妊娠期恶心、呕吐,水肿,仰卧位低血压综合征的护理要点。

(1)恶心、呕吐:在此期间应避免空腹或过饱,避免进食引起不舒服或难以消化的食物,如妊娠 12 周以后继续呕吐,甚至影响孕妇营养时,应考虑妊娠剧吐的可能,需住院治疗,纠正水电解质紊乱。对偏食者,在不影响饮食平衡的情况下,可不作特殊处理。(2 分)

(2)水肿,孕妇在妊娠后期易发生踝部及小腿下半部轻度浮肿,经休息后可消退,属正常。如下肢明显凹陷性水肿或经休息后不消退者,应及时诊治,警惕妊娠期高血压疾病的发生,嘱孕妇左侧卧位,解除右旋增大的子宫对下腔静脉的压迫,下肢稍垫高,避免长时间的站或坐,以免加重水肿症状。如需长时间站立的孕妇,则应两侧下肢轮流休息,收缩下肢肌肉,以利血液回流,并适当限制盐的摄入,但不必限制水分(3 分)

(3)仰卧位低血压综合征;孕妇改为侧卧位后症状可自然消失,不必紧张。(1 分)

32.简述新生儿病理性黄疸的特点-

(1)黄疸出现较早(生后 24 小时内)。1 分)

(2)程度重:血清胆红素浓度足月儿>221umol/L,早产儿超过 257umol/L。(1 分)

(3)进展快:胆红素每日上升超过 85umol/L。(1 分)

(4)持续时间长:足月儿超过两周,早产儿超过 4 周,(1 分)

5)黄疸退而复现、(1 分)

(6)结合胆红素超过 34umol/L。(1 分)

四、病例分析题(共 12 分)

34.某患者,女,41 岁,因经量增多,经期延长 2 年,症状加重 6 个月入院,2 年前开始出现月经量增多,近 6 个月经期延长,周期缩短为 6~7/16~17 天,量多伴血块,常感头晕、乏力,

月经史:14 25~05,量中。体检:子宫前位,约孕 3 个月大小,质硬,宫体活动度好,无明显压
5~6

痛。实验室检查;血红蛋白 82g/L。诊断为子宫肌瘤伴功能性子宫出血、继发性贫血收入院,
患者入院后睡眠差,经常询问“能否吃止血药治疗?害怕手术会疼痛,还怕影响以后生活……”
请列出 3 个可能的护理问题并制定护理措施。

答案;

(1)可能的护理问题:

1 人春界|公学

知识缺乏;与缺乏子宫肌瘤发生,发展和治疗相关的知识有关(2 分)

焦虑:与担心肌瘤恶变及手术后影响生活方式有关(2 分)

应对无效:与病史较长,病情加重、有继发性症状出现和无法选择有效治疗方案有关(2 分)(2)

相应的护理措施包括:认真进行病史评估;(1 分)给予积极地心理支持;(1 分)耐心解答患者提出
的问题并结合疾病普及相关知识;(1 分)积极进行缓解症状的各种处理,使患者感受到治疗的
有效性和被关爱的安全感,如处理和纠正贫血的措施,减轻压迫的措施、各种应急措施等:(1 分)

常规做好术前和术后护理,(2 分)

面清品部出处我 SR 对 X 出区

版出动国食 v 单斯警一读治百好家年灾心 R

的轮预方拉浓是出园主京我百总心素好版读人

妇产科学与儿科护理学试题

2020年1月

一、单项选择题(每题2分,共50分)

2. 激素避孕的不良反应不包括()。

C. 体重减轻

3. 妊娠期孕妇下肢痉挛的处理,错误的是()。

C. 走路时脚尖先着地

4. 在第二产程新生儿娩出后,首选的护理措施是()。

E. 清理呼吸道

6. 小儿先会画直线后会画圆、图形,遵循的发育顺序是()。

E. 由简单到复杂的顺序

7. 一新生儿胎龄37周,出生体重2600g,其出生体重在同胎龄儿平均体重的15百分位,该新生儿是()。

A. 足月儿、适于胎龄儿

8. 新生儿娩出时的窒息程度可用Apgar评分进行评估,于出生后1min, 5min各评一次,如评分为0~3分,患儿皮肤苍白,呼吸微弱或无呼吸,肌张力低下,应判断为()。

A. 重度窒息

9. 对新生儿肺透明膜病患儿进行氧气疗法,PaO₂应维持在()

.A. 6.7~9.3kPa(50~70mmHg)

10. 足月新生儿生理性黄疸多出现于生后()。

B. 2~3天

12. 营养性缺铁性贫血的一般表现,不包括()。

E. 年长儿可诉头晕、腹痛

13. 患儿,女,9个月,人工喂养。近4天来大便次数明显增多,每日15~18次,蛋花汤样带脓血,偶有呕吐。近日尿量减少。查体:T38.5℃,血压62/40mmHg,发病以来体重下降精神萎靡,前囟,眼窝凹陷。化验:血钠:140mmol/L,血钾3.6mmol/L。

该患儿脱水的性质和程度是()。

A. 等渗中度脱水

14. 腹泻患儿在补充累积损失量时其静点速度约为每小时()。

C. 8~10ml/kg

15. 哮喘持续状态找到的具晓唑持续发作,在合理应用常规拟交感神经药物和茶碱类药物疗后(1分)仍有严重或进行性呼吸困难,出现低氧血症、心功能不全,时间一般在()。

C. 12h以上

16. 法洛氏三联症患儿喜蹲踞主要是因为这能使()。

E. 体循环阻力增加,减少右向左分流血量

17. 急性肾炎患儿饮食管理中盐分必须限制到()。

C. 浮肿消退,血压正常

18. 皮肤黏膜淋综合征患儿突然死亡的原因是(西治是集版人)

E. 心肌梗塞

19. 麻疹出疹的顺序是()。

B. 耳后发际→面部→躯干→四肢→手掌足底

21. 以下妊娠合并糖尿病健康教育内容,错误的是()。

E. 产后不宜母乳喂养

22. 前置胎盘患者接受期待疗法过程中,正确的护理措施是()。

D.孕妇需住院观察,绝对卧床休息,尤以左侧卧位为佳

23.我国目前发病率最高的一种性传播疾病是

B.淋病

24. 子宫颈癌术后预防尿潴留发生的措施,不包括()

E.尽早采取导尿措施,尽量使尿液排空

25. 葡萄胎病人在随访期间最好的避孕方法是()。

B.避孕套

二、名词解释(每题 4 分,共 20 分)

26.胎先露:最先进入骨盆入口平面的胎儿部分称为胎先露。

27. 惊厥持续状态:如惊厥时间超过 30 分钟或两次发作间歇期意识不能完全恢复称惊厥持续状态,为惊厥的危重型。

28.高危妊娠:高危妊娠是指妊娠期或分娩期患有某种并发症或存在某种致病因素,从而可能对孕产妇、胎儿及新生儿造成危害者。具有高危妊娠因素的孕妇称高危孕妇。

29.胎盘早剥:妊娠 20 周后或分娩期,正常位置的胎盘在胎儿娩出前,部分或全部从子宫壁剥离,称为胎盘早期剥离,简称胎盘早剥。

30.潜伏紫绀型先心病:平时由于体循环压力高于肺循环,血液从左向右分流而不出现青紫。当屏气、剧烈哭闹或任何病理情况致肺动脉和右心室压力增高并超过左心压力时,血液自右向左分流而出现暂时性青紫,故此型又称潜伏紫绀型。

三、简答题(每题 6 分,共 18 分)

32 简述新生儿生理黄疸的特点。

(1 一般情况良好。(1 分)

(2)足月儿 2~3 天出现, 4~5 天达高峰,10~14 天消退;(2 分)早产儿出现稍晚,可至 4 周消退。(分)

(3)每日胆红素浓度升高之 85 $\mu\text{mol/L}$ 。(1 分)

(4)血清胆红素浓度足月儿不超过 221 $\mu\text{mol/L}$,早产儿不超过 257 $\mu\text{mol/L}$ 。注意较小早产儿胆红素低于 171 $\mu\text{mol/L}$ 时,也可发生胆红素脑病。(1 分)

33.简述川崎病形成冠状动脉瘤的高危因素。

(1)发病年龄在 1 岁以内;(1 分)

出新心另业山与 Neiss

(2)男孩:(1 分)

(3)持续高热超过 14 天;(1 分)

(4)贫血,白细胞总数在 $30 \times 10^9/L$ 以上,血沉超过 100mm/h,C 反应蛋白明显升高,血浆蛋白低下,(2 分)

(5)伴发动脉瘤者。(1 分)病例分析题(每题 12 分,共 12 分)

34.王女士,36 岁,初产妇,停经 30 周,因阴道流血 1 天收入院。患者于 1 日前无明显诱因出现阴道流血,量较多,无腹痛,入院检查:血压 120/75mmHg,尿蛋白(-),下肢水肿

-),血色素 82g/L,B 超提示胎盘位于子宫右后壁延至前壁覆盖宫颈内口,为前置胎盘,该妇现接受期待疗法的治疗方案。

问题:为该孕妇确定 2 个主要的护理问题,并针对护理问题制定相应的护理措施。参考答案:

(1)潜在并发症:出血性休克(2 分)护理措施:

D 保证休息孕妇需要绝对卧床休息,尤以左侧卧位为佳,并间断吸氧,每日 3 次,每次 1 小时。(1 分)

②减少刺激孕妇需避免各种刺激,以减少出血机会,医护人员进行腹部检查时动作要轻柔,禁作阴道检查及肛查。(1 分)

③监测生命体征,及时发现病情变化严密观察并记录孕妇生命体征,阴道流血的量、色、流血时间及一般状况,监测胎儿宫内状态。并按医嘱及时完成实验室检查项目,查血型,交叉配血备用。发现异常及时报告医师并配合处理。(2分)

(2)有感染的危险:与孕妇贫血有关(1分)高出天 0 一派出天 la3 护理措施:

D0Emet

①遵医嘱行口服硫酸亚铁、输血等措施。(1分)

②加强饮食营养指导建议孕妇多食高蛋白以及含铁丰富的食物,如动物肝、绿叶蔬菜以及豆类等,(1分)

3 加强会阴部护理使用消毒会阴垫,并及时更换,以保持会阴部清洁、干燥。(1分)④监测孕妇的体温,血象及阴道流血、分泌物的性质、颜色、气味等,及时发现感染征象。

(1分)

⑤协助取样,监测孕妇血色素值的变化,(1分)

妇产科学与儿科护理学试题

2020 年 7 月

一、单项选择题(每题 2 分,共 50 分)

- 1.婚前保健指导宣教的主要内容不包括().
E 对患有胃、肺、肠道等器官疾病的对象讲行就诊指导
- 2.用胎心监护仪监护胎心率,下列指标中提示胎儿缺氧的是().
E,晚期减速
- 3.妊娠 24 周末,宫底高度位于().
A,脐上一横指
- 4 在分娩过程中起主导作用的产力是().
A,子宫收缩力
5. 产褥期,正常血性恶露特点是色红,并含().
C.大量血液、少量胎膜及坏死蜕膜组织
- 6.体重(kg)=6(kg)+月龄×0.25,此公式适用于().
E.7~12 个月
- 8.新生儿窒息的预防地施不包含
C.孕妇不需检测血糖
- 9.新生儿肺透明膜病临床表现中最具特点的是
D.呼吸困难呈进行性加重
- 10.佝偻病活动期(激期)的主要表现是().
C.骨骼系统改变
- 11.营养性缺铁性贫血的治疗指导,错误的是()
D.绝对卧床休息
- 12.腹泻脱水患儿补液后排尿,此时输液瓶中尚有不含钾液体 300ml,此液体中最多可加人 10% 氧化钾().
B. 9ml
- 14,法洛氏三联症患儿突然昏厥抽搐的原因是().
C.肺动脉漏斗部肌肉痉挛
- 15.原发性肾病综合征患儿的饮食护理,错误的是().
B 水肿消退、尿量正常后应该继续长期间盐
- 16.川崎病形成冠状动脉瘤的高危因素,不包括()
B.女孩
- 17-关于麻征西和物理方法降温
E,体温升至 40℃以上时,可用小量退热药
- 18.以下是惊厥的一般处理,其中错误的是().
A.发作时,解开患儿衣领,采取平卧位
19. 妊娠期高血压疾病患者,采用大剂量硫酸镁治疗时,其最早出现的中毒反应
E.膝腱反射消失
- 20,妊娠期糖尿病是指
A.妊娠期首次发现或发生的糖代谢异常
- 21.胎盘早剥缓解症状的护理措施,不包括(-)
C.为期待疗法做好准备
- 22.关于产后出血的表现,错误的是()
E,失血表现明显,伴会阴部疼痛而阴道流血量不多时应考虑子宫损伤

23.子宫托使用的注意事项,错误的是()

B 上托 6 个月一般不用继续到医院复查

24.子宫内膜癌最常见症状是()

A,不规则阴道流血

25.卵巢肿瘤围手术期护理,错误的是()

D.一次放腹水不宜超过 1000ml,速度缓慢,放后用腹带包扎腹部

二、名词解释(每题 4 分,共 20 分)

26.大于胎龄儿:指出生体重在同胎龄儿平均体重第 90 百分位数以上的新生儿。

27.新生儿溶血症:是指因母子血型不合,母亲的血型抗体通过胎盘进入胎儿循环,发生同种免疫反应导致胎儿、新生儿红细胞破坏而引起的溶血。

28.哮喘持续状态:哮喘持续发作,在合理应用常规缓解药物拟交感神经药和茶碱类药物治疗后,仍有严重或进行性呼吸困难者,时间一般在 12h 以上,称为哮喘危重状态,又称为哮喘持续状态。

29.围绝经期综合征:部分妇女在围绝经期期间可以出现一系列因性激素减少所致的征候群,被称为围绝经期综合征。

30.库肯勃瘤;是一种特殊的卵巢转移癌,原发部位为胃肠道,肿瘤为双侧,中等大小,实性,多伴有腹水。

三、简答题(每题 6 分,共 18 分)味班出豺追的实数凯蒙城勘位;头刘版 L 效肤仅全

31.简述妊娠期水肿的护理要点-

孕妇在妊娠后期易发生踝部及小腿下半部轻度浮肿,经休息后可消退,属正常。(1 分)如下肢明显凹陷性水肿或经休息后不消退者,应及时诊治,警惕妊娠期高血压疾病的发生。(1 分)嘱孕妇左侧卧位,解除右旋增大的子宫对下腔静脉的压迫,下肢稍垫高,避免长时间地站或坐,以免加重水肿症状。(2 分)如需长时间站立的孕妇,则应两侧下肢轮流休息,并适当限制盐的摄入,但不必限制水分。(2 分)

32.简述急性肾小球肾炎患儿的饮食护理。

有水肿及高血压的患儿,应限制水、钠盐的摄入。每日食盐量 1~2g;(1 分)严重水肿、尿少者限制水的摄入,每天的液体入量一般等于前一天的出量加 500ml;(1 分)有氮质血症时,限制蛋白质的人量,每日 0.5g;(1 分)给予清淡、易消化、富含维生素的高糖饮食,少量多餐,以满足小儿热量并减轻水肿的胃肠道负担。(1 分)尿量增加、水肿消退、血压正常后,可恢复正常饮食。(2 分)

四、病例分析题(每题 12 分,共 12 分)

34.某患者,女,41 岁,因经量增多,经期延长 2 年,症状加重 6 个月入院,2 年前开始出现月经量增多,近 6 个月经期延长,周期缩短为 6~7/16~17 天,量多伴血块,常感头晕、乏力,月经史:14 5~6/25~26,量中。体检:子宫前位,约孕 3 个月大小,质硬,宫体活动度好,无明显压痛。实验室检查:血红蛋白 82g/L。诊断为子宫肌瘤伴功能性子宫出血、继发性贫血收入院,患者入院后睡眠差,经常询问“能否吃止血药治疗?害怕手术会疼痛,还怕影响以后生活……”请列出 2 个可能的护理问题并制定护理措施。

答:

(1)可能的护理问题:

知识缺乏:与缺乏子宫肌瘤发生、发展和治疗相关的知识有关(2 分)

焦虑:与担心肌瘤恶变及手术后影响生活方式有关(2 分)

应对无效:与病史较长,病情加重、有继发性症状出现和无法选择有效治疗方案有关(2 分)

(2)相应的护理措施包括:认真进行病史评估;(1 分)给予积极地心理支持;(1 分)耐心解答患者提

出的问题并结合疾病普及相关知识;(1分)积极进行缓解症状的各种处理,使患者感受到治疗的有效性和被关爱的安全感,如处理和纠正贫血的措施、减轻压迫的措施、各种应急措施等;1分)常规做好术前和术后护理。(2分)