



电大资源

- 1、18 岁青年女性, 不慎被开水烫伤, 出现大水泡, 皮薄、疼痛明显, 烧伤深度为 ()。-->B. 浅 II 度
- 2、30 岁青年女性, 体重 60 磅, 双上肢及躯干 II 度烧伤, 该病人第 1 个 24 小时需要补液的总量约为 ()。-->B. 6000ml
- 3、ARDS 病人主要的特征性临床表现为 ()。-->E. 进行性呼吸困难
- 4、L5~S1 椎间盘突出可压迫 ()。-->A. S1 神经根
- 5、T 管拔除最重要的指征是 () -->E. T 管造影无残余结石, 夹管试验无异常变化
- 6、T 管拔管前先试行夹管 1~2 天, 夹管期间应注意观察的内容是 ()。-->B. 腹痛、发热、黄疸
- 7、T 管引流病人的护理不正确的是 ()。-->A. 引流通畅可 3~5 天拔管
- 8、T 管引流病人护理不正确的是 ()。-->D. 通常置管 3~5 天拔管
- 9、拔除 T 管最关键的指征是 ()。-->E. T 管造影无残余结石, 夹管试验无异常变化
- 10、白先生, 32 岁, 既往有胃病史, 近一周来, 常感上腹部不适, 4 小时前突发上腹部剧烈疼痛, 伴有恶心、呕吐, 查体: 腹部压痛、肌紧张, 肝浊音界缩小, X 线检查可见膈下游离气体, 首先考虑 ()。-->D. 溃疡病穿孔
- 11、搬动留置胸腔闭式引流患者时应 ()。-->D. 用两把血管钳夹闭引流管
- 12、膀胱癌最常见的病理类型为 ()。-->A. 尿路上皮癌
- 13、膀胱癌最常见的临床表现是 ()。-->D. 血尿
- 14、膀胱癌最重要的检查手段是 ()。-->B. 膀胱镜检查
- 15、膀胱灌注药物的护理, 错误的叙述是 ()。-->C. 插入尿管后, 直接进行膀胱灌注, 不需排空膀胱
- 16、膀胱结石的典型症状是 ()。-->E. 排尿突然中断, 伴有阴部放射痛
- 17、毕 E 式胃大部切除术后最严重的并发症是 ()。-->C. 十二指肠残端破裂
- 18、避免或减轻乳腺癌病人患侧上肢水肿的做法不包括 ()。-->E. 患肢制动
- 19、病人术后功能锻炼的方法正确的是 ()。-->E. 术后 10~12 天开始全范围关节活动
- 20、勃格运动的目的是 () -->D. 促进侧支循环建立
- 21、不符合尿道损伤主要临床表现的是 ()。-->C. 尿楼
- 22、不符合体外循环后低心排综合征的表现是 ()。-->E. 中枢性高热

- 23、不符合枕骨大孔疝表现的是 ()。-->E. 呼吸骤停发生早
- 24、不会导致气道峰值压增高的是 ()。-->D. 气管导管气囊漏气
- 25、不属于外科护理的特点的是 ()。-->E. 老年病人最多
- 26、采用肾上腺皮质激素降低颅内压的作用原理是 ()。-->D. 稳定溶酶体膜作用
- 27、长期实施胃肠外营养的病人置管的部位是 ()。-->E. 上腔静脉
- 28、长期胃肠外营养支持的病人置管的部位首选 ()。-->D. 上腔静脉
- 29、肠梗阻保守治疗时最重要的是观察 ()。-->D. 肠纹窄迹象
- 30、肠梗阻病人非手术治疗后, 肠梗阻解除的标志是 ()。-->D. 肛门有排气、排便
- 31、肠梗阻病人非手术治疗期间最重要的护理措施是 ()。-->D. 观察有无肠管血运障碍
- 32、肠梗阻病人共同的临床表现不包括 ()。-->E. 休克
- 33、肠梗阻非手术治疗首要的措施是 ()。-->D. 胃肠减压
- 34、肠瘘最常见的电解质紊乱是 () -->A. 低钾、低钠
- 35、肠瘘病人切口周围使用氧化锌软膏的目的是 () -->D. 减少肠液对皮肤的刺激
- 36、肠外瘘病人切口周围皮肤护理最关键的措施是 ()。-->D. 及时清除外漏肠液
- 37、肠外营养支持的护理方法正确的是 ()。-->C. 不可经营养导管取血
- 38、肠瘘最常见的电解质紊乱是 () -->A. 低钾、低钠
- 39、成年男性, 体重 60kg, 双上肢及躯干 II 度烧伤, 该病人第 1 个 24 小时需要补液的总量约为 ()。-->C. 6000ml
- 40、成人大面积烧伤后治疗过程中要求其每小时尿量保证在 ()。-->C. 30ml 以上
- 41、成人经静脉补充钙离子时, 要求尿量每小时不得少于 ()。-->C. 30ml
- 42、成人头面颈和双上臂全部烧伤的面积为 ()。-->B. 16%
- 43、穿戴无菌手术衣及手套后, 应将双手置于 ()。-->B. 胸前
- 44、大肠癌手术前最重要的护理是 ()。-->A. 充分的肠道准备
- 45、大肠癌最常见的远处转移部位是 ()。-->A. 肝
- 46、大面积烧伤病人 II 度创面, 切痂后以小猪皮移植是属于 ()。-->D. 异种异体移植

- 47、大面积烧伤病人静脉补液期间, 判断其血容量是否补足的简便、可靠指标是 ()。-->D. 尿量
- 48、单纯性肠梗阻的主要治疗措施是 ()。-->D. 胃肠减压, 纠正水电解质失衡
- 49、单纯性肠梗阻与绞窄性肠梗阻的主要区别是 ()。-->D. 肠管壁有无血运障碍
- 50、胆道 T 管引流的病人胆道远端通畅的表现是 () -->C. 食欲好转, 黄疸消退, 引流量减少
- 51、胆道 T 管引流与腹腔引流管的护理措施不同的是 ()。-->D. 拔管前夹管观察 1~2 天
- 52、胆道管引流的病人胆道远端通畅的表现是 ()。-->D. 食欲好转, 黄疸消退, 引流量减少
- 53、胆管结石梗阻合并胆管炎时, 其临床特点是 ()。-->D. 波动性黄疸
- 54、胆囊结石首选的检查方法是 ()。-->B. 腹部超声
- 55、胆石症胆管炎病人出现急性梗阻性化脓性胆管炎时, 除了 Charcot 三联征外, 还具有的表现是 ()。-->C. 血压下降伴意识不清
- 56、胆石症的病人出现胆绞痛时禁用 ()。-->B. 吗啡
- 57、当椎间盘突出时神经根处于固定或半固定状态时, 若病人仰卧, 被动直腿抬高在多少度以内出现坐骨神经痛, 称为直腿抬高试验阳性 ()。-->D. 60°
- 58、低钾血症病人最早出现的临床表现是 ()。-->B. 四肢无力
- 59、动脉硬化闭塞症 III 期的典型表现是 ()。-->C. 静息痛
- 60、对 ARDS 的诊断和病情判断有重要意义的检查是 ()。-->A. 血气分析
- 61、对肠梗阻病人的术前护理正确的是 ()。-->B. 禁食、胃肠减压
- 62、对放疗及化疗均敏感的肺癌类型是 ()。-->C. 小细胞癌
- 63、对使用石膏绷带病人的护理措施中正确的是 ()。-->B. 石膏未干前搬动病人时应用手掌平托
- 64、对血栓闭塞性脉管炎病人的日常保健指导, 正确的是 () -->D. 每天进行 Buerger 运动
- 65、对于需要实施补液疗法的病人首要需要明确的问题是 ()。-->E. 体液失衡的类型
- 66、多根多处肋骨骨折因前后端失去支撑, 使损伤部位的胸廓软化, 产生 ()。-->C. 反常呼吸
- 67、儿童骨与关节结核病人发生夜啼的原因是 ()。-->B. 关节疼痛
- 68、发病率最高的颈椎病类型是 ()。-->C. 神经根型
- 69、反常呼吸常见于 ()。-->D. 多根多处肋骨骨折

请直接打印, 已按字母排版

已整理 700 个国开科目, 有需要请直接微信 905080280, 说明要购买的试卷号及科目名称即可

ps: 资料考前整理, 只供大家复习使用! 已和最新历届试题核对, 有新题并已整合, 以此版为准

电大资源网 2403《外科护理学》国家开放大学期末考试笔试题库(按字母)(507)

适用: 【国开电大】【期末笔试】

作者: 电大资源网: <http://www.dda123.cn/> (微信号: 905080280)

资料考前整理, 只供大家复习使用! 题库上次考试可用, 这次有可能改版, 如果科目改版资料对不上, 可以把科目名称发我微信, 可退回下载该改版科目的积分

ps: 如果把改版科目可用的题目拍图发微信可奖励 10-20 下载券, 把最新版题库发微信可奖励 20-50 下载券

题型: 单选(507)

学位英语交流 Q 群 235441264; 期末考试题库共享 Q 群: 208201490

单选(507)---电大资源网:

<http://www.dda123.cn/> (微信: 905080280)

70、反常呼吸运动常见于 ()。-->**E. 多根多处肋骨骨折 1**

71、反映休克病人组织灌流量最简单而有效的指标是 ()。-->**D. 尿量**

72、放疗引起局部皮肤红斑、灼痛时, 错误的护理措施是 ()。-->**E. 局部外涂碘酊**

73、肺癌病人出现一侧眼睑下垂, 瞳孔缩小, 眼球内陷, 额部与胸部少汗的原因是 ()。-->**C. 交感神经受压**

74、肺癌病人术后 24 小时内最常见的并发症是 ()。-->**C. 出血**

75、肺癌病人术后出血表现为 ()。-->**C. 胸腔闭式引流管内流出大量血性液**

76、肺癌病人最常见的早期表现是 ()。-->**B. 咳嗽**

77、肺癌术后病人最适宜的体位是 () -->**E. 半卧位**

78、肺叶切除术后 2 小时, 病人自觉胸闷, 呼吸急促, 测血压、脉搏均正常, 见水封瓶内有少量淡红色液体, 水封瓶长玻璃管内的水柱波动不明显。考虑为 ()。-->**C. 引流管阻塞**

79、风湿性心脏病病人尤其应注意的电解质紊乱类型 ()。-->**C. 低钾血症**

80、腹部损伤病人术后护理措施, 不正确的是 ()。-->**B. 停止胃肠减压后可恢复普食**

81、腹股沟直疝与斜疝最有意义的鉴别之处在于 ()。-->**E. 回纳病块后压迫内环, 增加腹压肿块是否出现**

82、腹膜炎术后取半卧位的目的不包括 ()。-->**D. 预防压疮**

83、腹腔实质性脏器破裂的主要表现是 ()。-->**A. 内出血或失血性休克**

84、腹外疝的主要病因是 ()。-->**E. 腹壁存在薄弱或缺损**

85、腹外疝形成的主要原因是 ()。-->**E. 腹壁存在薄弱或缺损 1**

86、该病人手术后, 有可能发生的最危急的并发症是 ()。-->**D. 呼吸困难与窒息**

87、该病人术后护理, 不正确的是 ()。-->**A. 将患肢固定在胸壁上**

88、肝癌病人常见的首发症状是 ()。-->**B. 肝区疼痛**

89、肝癌术前护理不正确的是 ()。-->**C. 术前晚用肥皂水灌肠**

90、肝叶切除病人的术后护理, 错误的是 ()。-->**E. 鼓励早期下床活动**

91、肝叶切除病人的术后护理鱼尾鱼是 ()。-->**D. 鼓励早期下床活动**

92、肝叶切除术后避免过早活动的目的是 ()。-->**E. 避免肝断面出血 1**

93、高钾血症病人出现心律失常时, 给予病人 10% 葡萄糖酸钙的目的是 ()。-->**C. 对抗钾离子对心肌的抑制作用**

94、高钾血症病人出现心律失常时, 首先应给予 () -->**E. 10 葡萄糖酸钙**

95、高渗性缺水病人最突出的临床表现是 ()。-->**B. 口渴**

96、高血压脑出血最好发的部位是 ()。-->**E. 基底节壳部**

97、高钾血症病人出现心律失常时, 首先应给予 ()。-->**C. 10%葡萄糖酸钙**

98、给休克病人快速大量输血补液时, 掌握量和速度的可靠指标是 ()。-->**D. 尿量和中心静脉压**

99、给休克病人快速大量输血补液时, 掌握量和速度, 根据哪一项指标可靠 ()。-->**D. 尿量和中心静脉压**

100、给休克病人使用血管扩张剂时必须 ()。-->**D. 在扩容完成之后**

101、给予破伤风病人破伤风抗毒素的目的是 ()。-->**B. 中和血液中游离毒素**

102、股骨颈骨折病人, 行皮牵引时抬高床尾的主要目的是 ()。-->**A. 设置对抗力量**

103、股骨颈骨折病人行皮牵引时应采取的体位是 ()。-->**A. 外展中立位**

104、股骨颈骨折病人行皮牵引时应采取的体位是 ()。-->**A. 30° 外展中立位**

105、骨筋膜室综合征的严重后果是 ()。-->**C. 缺血性肌挛缩**

106、骨与关节结核中发生率最高的是 ()。-->**C. 脊柱结核**

107、关于 T 管护理叙述正确的是 () -->**C. 胆总管下段阻塞时引流量增多**

108、关于肠造口的护理, 不正确的是 ()。-->**D. 造口袋不必经常更换**

109、关于结肠造口的护理, 不正确的是 ()。-->**A. 乙状结肠造口病人必须使用造口袋**

110、关于颅前窝骨折病人的护理, 错误的是 ()。-->**B. 用抗菌药溶液冲洗鼻腔**

111、关于肾盂造瘘管的护理不正确的是 ()。-->**C. 每次冲洗引流管的液量为 20~40ml**

112、关于食管癌根治术病人发生吻合口瘘的原因, 错误的是 ()。-->**E. 高蛋白血症**

113、关于食管癌术前的消化道准备, 错误的叙述是 ()。-->**A. 对于无严重梗阻的大多数病人, 需术前 12 小时禁水**

114、关于外科护理学, 下列叙述不正确的是 ()。-->**B. 评估及满足病人的基本生理需要是外科护理学的全部工作**

115、关于外科护理学的学习, 下列叙述不正确的是 ()。-->**E. 牢记课本知识, 不需时刻学习新知识**

116、关于胸腔闭式引流护理, 错误的做法是 () -->**D. 注意观察引流瓶长管水柱的波动**

117、关于肿瘤化疗的护理方法不正确的是 ()。-->**C. 若出现药液外渗, 应立即热敷**

118、观察急腹症病人的腹部体征中最重要的 ()。-->**B. 腹膜刺激征的产生**

119、观察颅脑损伤病人的生命体征的顺序是 () -->**E. 呼吸→脉搏→血压**

120、观察颅脑损伤病人的生命体征的顺序是 ()。-->**A. 呼吸→脉搏→血压**

121、观察颅脑损伤病人时, 提示为急性颅内压增高早期表现是 ()。-->**D. 脉慢, 呼吸慢, 血压高**

122、观察颅脑损伤病人时, 提示为颅内压增高的早期表现是 ()。-->**C. 脉搏缓慢, 呼吸深慢, 血压升高**

123、观察休克病人的尿量, 表示组织灌流合适的最低限度是 ()。-->**B. 30ml/小时**

124、灌注要素饮食时病人最好取 ()。-->**A. 半卧位**

125、输尿管结石病人绞痛发作时, 最重要的处理方法是 ()。-->**C. 解痉止痛**

126、呼吸功能监测最直接的指标是 () -->**C. 血氧饱和度**

127、护士对颈椎病人进行术后出院指导, 正确的是 ()。-->**A. 适度颈部锻炼, 避免过度运动**

128、护士对于肠梗阻病人的观察判断, 最正确的是 ()。-->**A. 呕吐早、频繁且含有胆汁应疑为高位肠梗阻**

129、护士指导某乳腺癌病人进行患侧肢体康复锻炼, 应告诉其最理想的锻炼目标是 ()。-->**E. 手能经头顶摸到对侧耳朵**

130、患儿, 3 岁, 因颈部蜂窝织炎入院, 颈部肿胀明显, 应特别注意观察 ()。-->**D. 呼吸**

131、患者左侧胸部被匕首刺伤半小时, 有胸痛, 呼吸急促, 口唇发绀。脉搏 120 次/分, 血压 9.3/5.3kPa (70/40mmHg)。左侧胸壁有伤口, 呼吸时能听到空气出入伤口的响声。气管移向健侧。患侧叩诊呈鼓音。病人的急救措施首先应 () -->**A. 迅速封闭伤口**

132、机体调节酸碱平衡最迅速的途径是 ()。-->**C. 血液缓冲系统**

133、急腹症病人未明确诊断前禁用 ()。-->**D. 镇痛剂**

134、急性腹膜炎适宜非手术继续观察的情况是 ()。-->**C. 原发病灶病变严重**

135、急性腹膜炎最重要的体征是 ()。-->**B. 腹膜刺激征**

136、急性腹膜炎最主要的表现是 ()。-->**D. 腹痛**

137、急性梗阻性化脓性胆管炎的最常见的梗阻因素是 ()。-->**B. 胆管结石**

138、急性颅内压增高病人典型的生命体征表现是 () -->**D. 脉慢, 呼吸慢, 血压高**

139、急性肾功能衰竭少尿期病人早期死亡的最常见原因是 ()。-->**B. 高钾血症**

140、急性肾功能衰竭少尿期病人早期最常见的电解质失衡的类型是 ()。-->**B. 高钾血症**

141、急性肾功能衰竭少尿期病人最常见的死亡原因是 ()。-->**B. 高钾血症**

142、急性消化道失液的病人, 医嘱有静脉补充下列液体, 作为其责任护士, 你考虑首先给其输入 ()。-->**D. 5%葡萄糖盐水**

143、急性硬脑膜外血肿病人意识障碍的典型表现是 () -->**B. 中间清醒期**

144、脊髓型颈椎病人可能出现的临床表现是 ()。-->**A. 踏棉感和束带感**

145、甲亢病人术前服用碘剂的方法, 错误的是 ()。-->**E. 不可滴在面包、饼干等食物内服用 1**

146、甲亢病人术前需要服用的减少甲状腺素合成的药物是 ()。-->**C. 硫脲类药物**

147、甲亢术后发生呼吸困难多见于以下原因, 除了 ()。-->**E. 双侧喉上神经分支损伤 1**

148、甲状腺癌病人手术后手脚麻木的原因是 ()。-->**D. 术中损伤甲状旁腺**

149、甲状腺部分切除术后病人麻醉清醒后, 护士鼓励其讲话的主要目的是判断 ()。-->**C. 有无神经损伤**

150、甲状腺大部分切除手术后第 3 天, 出现手足疼痛, 指尖针刺感并有轻微抽搐, 此时病人可能出现 ()。-->**B. 低钙血症**

151、甲状腺大部分切除手术后第 3 天, 出现手足疼痛, 指尖针刺感并有轻微抽搐, 护士应备好 ()。-->**E. 葡萄糖酸钙 1**

152、甲状腺大部分切除术后回到病房, 护士为评估病人有无神经损伤方法是 () -->**B. 让病人讲话**

153、甲状腺大部切除病人术后出现饮水呛咳的原因是 ()。-->**E. 喉上神经内支损伤**

154、甲状腺大部切除术后病人术后出现声音嘶哑的主要原因是 ()。-->**C. 喉返神经损伤**

155、甲状腺功能亢进病人术前需要服用的减少甲状腺素合成的药物是 ()。-->**C. 硫氧嘧啶**

156、甲状腺危象的原因主要由于 () -->**B. 术前准备未达要求**

157、鉴别腹膜内型和腹膜外型的膀胱破裂, 最好的方法是 ()。-->**D. 膀胱造影**

158、结肠癌病人最早出现的症状是 ()。-->A. 排便习惯及粪便性状改变

159、经鼻胃管灌注要素膳时病人最好取 ()。-->C. 半卧位

160、经鼻胃管灌注要素饮食时,病人最好取 ()。-->A. 半卧位

161、经鼻胃管灌注要素饮食时病人取半卧位的最主要目的是 ()。-->C. 避免食物反流

162、经鼻胃管为病人灌注要素饮食时,将病人取半卧位的目的是 ()。-->C. 避免误吸

163、经鼻胃管为病人灌注要素饮食时,最好让病人取 ()。-->A. 半卧位

164、经中心静脉置管行肠外营养支持病人体温突然升高至 39.5℃。精神不振,寒战,无腹痛腹胀,伤口引流液少,中心静脉置管处红肿,有压痛,应警惕其可能发生了 ()。-->D. 导管败血症

165、颈椎病发生的基本原因是 ()。-->D. 颈椎间盘退行性变

166、颈椎前路手术后最危急的并发症是 ()。-->D. 呼吸困难

167、纠正代谢性酸中毒首选 ()。-->B. 5%碳酸氢钠

168、开放性气胸的紧急处理首先要 ()。-->A. 用厚敷料封闭伤口

169、开放性气胸的紧急处理首先要 ()。-->B. 用无菌敷料封闭伤口

170、开放性气胸的紧急处理首先要 () -->D. 用厚敷料封闭伤口

171、开颅手术最危险的并发症是 () -->C. 颅内出血

172、抗休克治疗最根本的措施是 ()。-->C. 积极处理原发疾病

173、抗休克最首要的治疗措施是 ()。-->D. 及时、快速、足量补充血容量

174、抗休克最重要的治疗措施是 ()。-->E. 及时、快速、足量补充血容量

175、可采取非手术治疗的肾损伤类型是 ()。-->D. 肾挫伤

176、可出现肺动脉压降低的是 ()。-->D. 低血容量休克

177、可出现平均肺动脉压降低的是 ()。-->C. 肺动脉狭窄

178、可能导致急性肾功能衰竭少尿期病人死亡的电解质失衡是 ()。-->B. 高钾血症

179、可作为结肠癌初筛手段的是 ()。-->D. 大便潜血检查

180、老年男性,行回肠膀胱术后 1 个月,该病人最可能出现的水电紊乱是 ()。-->E. 高氯性酸中毒

181、老年男性尿潴留最常见的原因是 ()。-->E. 良性前列腺增生

182、李先生,35 岁,既往有胃病史,近一周来,常感上腹部不适,4 小时前突发上腹部剧烈疼痛,伴有恶心、呕吐,查体:腹部压痛、肌紧张,肝浊音界缩小,错线检查可见膈下游离气体,首先考虑 ()。-->D. 溃疡病穿孔

183、李先生,62 岁,食管癌手术后第三天拔除胃管后口服流质,第五天体温升高 39℃,呼吸困难、胸痛、脉速,胸透发现手术侧胸腔积液,应首先考虑并发 ()。-->D. 食管吻合口瘘

184、良性前列腺增生发生的重要因素是 ()。-->B. 老龄和有功能的睾丸

185、良性前列腺增生症发生的发生的必备条件是 ()。-->E. 老龄和有功能的睾丸

186、良性前列腺增生症最简便易行、有效的检查手段是 ()。-->D. 直肠指诊

187、良性前列腺增生最简单的初步诊断方法是 ()。-->C. 直肠指诊

188、良性前列腺增生最早出现的症状是 ()。-->A. 尿频及夜尿次数增多

189、临床上,代谢性酸中毒病人特征性的表现是 () -->B. 呼吸深而快

190、留置闭式胸腔引流管的病人引流管脱出,首先要 ()。-->B. 用厚层纱布封闭引流口

191、颅内动静脉畸形最常见的首发症状是 ()。-->A. 出血

192、颅内高压病人出现便秘时,错误的处理方法是 ()。-->E. 用肥皂水灌肠

193、颅内压升高病人,医嘱给予输注 20%甘露醇 250ml,输注时间至多 ()。-->B. 30 分钟

194、颅内压增高病人床头抬高 15°~30°,主要目的是为了 ()。-->C. 有利于颅内静脉回流

195、颅内压增高病人的床头抬高 15°~30° 的主要目的是为了 ()。-->E. 有利于颅内静脉回流

196、颅内压增高的“三主征”是 ()。-->E. 头痛、呕吐、视神经乳头水肿

197、颅内压增高的客观征象是 ()。-->C. 视神经乳头水肿

198、颅脑手术后留置脑室引流,通常情况下每日引流量不宜超过 ()。-->C. 500ml

199、颅中窝骨折病人不宜采用的护理措施是 ()。-->E. 用抗生素溶液冲洗鼻腔 1

200、慢性排斥反应的特点是 ()。-->D. 移植器官功能逐渐减退

201、弥漫性腹膜炎易导致的肠梗阻类型是 ()。-->A. 麻痹性肠梗阻

202、膜头癌最主要的临床表现是 ()。-->B. 进行性黄疸

203、胰腺癌有明显黄疸病人术前必须补充的维生素是 ()。-->E. 维生素 K

204、某病人,食管癌切除,食管胃吻合术后第 5 天,突然出现高热、寒战、呼吸困难胸痛白细胞高度怀疑发生了 ()。-->B. 吻合口瘘

205、某病人毕 II 式胃大部切除术后第 5 天,突发右上腹剧痛,伴有腹膜刺激征,应考虑为 ()。-->E. 十二指肠残端破裂

206、某病人不慎被开水烫伤,出现小水疱,疼痛不明显,水疱破裂后创面为红白相间。烧伤深度为 ()。-->C. 深 II

207、某病人腹部手术后 1 周,用力排便时突然腹痛,伤口敷料被红色渗液浸湿,此时应考虑 ()。-->B. 切口裂开

208、某病人行疝修补术后第 2 天,体温 37.8℃ 正确的处理是 () -->E. 继续观察,无需特殊处理

209、某病人行疝修补术后第 2 天,体温 37.8℃,正确的处理是 ()。-->D. 继续观察,无需特殊处理

210、某病人因车祸被送入急诊室。下颌骨开放性骨折,并有舌后坠。CT 检查显示颅内出血,量约为 30ml。首要的处理措施是 ()。-->E. 保持呼吸道通畅

211、某病人因车祸被抬入急诊室。下颌骨开放性骨折,并有舌后坠。CT 检查显示颅内出血,量约 30ml。首要的处理措施是 ()。-->D. 保持呼吸道通畅

212、某放疗病人,局部照射部位皮肤出现水肿,糜烂、渗出。可使用 ()。-->B. 2%甲紫

213、某膜部手术病人,术后第七天,一阵剧烈咳嗽之后,突然出现腹痛,伤口敷料被红色渗液浸湿,此时应考虑 ()。-->B. 切口裂开

214、某男性病人,中心静脉压 0.98kpa(10cmH₂O) BP 仍为 10.7/8kpa(80/60mmHg),提示病人 ()。-->C. 心功能不全

215、某重症监护病人,出现肺动脉压(PAP)降低,首先考虑的原因是 ()。-->D. 低血容量

216、男性,50 岁,腹部手术后 1 周,用力排便时突然腹痛,伤口敷料被红色渗液浸湿,此时应考虑 () -->B. 切口裂开

217、男性,60 岁,诊断为原发性肝癌,行肝叶切除术后第 3 天,出现嗜睡、烦躁不安、黄疸、少尿等,应考虑 () -->C. 肝性脑病

218、男性,70 岁,脊柱手术后卧床 2 周,出现右腿小腿疼痛、紧束感,并逐渐出现水肿。应考虑到病人出现的术后并发症是 () -->E. 下肢静脉血栓形成

219、男性,42 岁,20 余年胃十二指肠溃疡病史近月余发作。今日午餐进食较多,并少量饮酒,

餐后突然上腹剧烈刀割样疼痛,迅速全腹痛。查:急性面容。全腹压痛、反跳痛、肌紧张,上腹板状。初步考虑是 ()。-->B. 溃疡病急性穿孔

220、男性,完全性胃肠外营养支持,滴注后 2 小时出现口渴、头痛、尿多,首先处理是-->D. 暂停输注

221、男性,20 岁,因急性肠胃炎,呕吐、腹泻,不能进食,自述口干、尿少色黄。查体:口舌干燥,皮肤弹性差,眼窝凹陷。实验室检查:尿比重 1.028,血清钠浓度为 148mmol/L。考虑病人出现 ()。-->A. 等渗性缺水

222、男性,24 岁。单位体检时发现右肾盂内结石,直径 0.5cm,经非手术治疗,护士嘱其大量饮水,其主要目的是 ()。-->E. 增加尿量,利于结石排出

223、男性,25 岁,开放性的膀胱损伤,腹膜外型,在全麻下行膀胱修补,下腹部探查,血肿清除术,病人返回病房,留置尿管和盆腔引流管。术后要密切观察的情况,不包括 () -->C. 饮食

224、男性,25 岁,因高热 2 日未能进食,自述口渴、日干、尿少色黄。查体:口舌干燥,皮肤弹性差,眼窝凹陷。实验室检查:尿比重 1.028 血清钠浓度为 155mmol/L。考虑病人出现 ()。-->D. 中度高渗性脱水

225、男性,28 岁,诊断为腰椎间盘突出症,术后第一天。病人应开始下列哪项锻炼 ()。-->C. 直腿抬高练习

226、男性,30 岁,5 天前被汽车撞伤左上腹,当时左上腹有胀痛和局部压痛,暂留院观察。今晨上厕所时突然昏倒,查体见病人面色苍白、出冷汗,血压下降,脉细速,无明显腹膜刺激征。首先考虑为 ()。-->A. 脾破裂

227、男性,30 岁,餐后 1 小时,被车撞伤中上腹部,感上腹部剧烈疼痛呈持续性刀割样,短时间内腹痛逐渐扩至全腹,左上腹明显压痛、反跳痛、肌紧张,X 线检查示膈下有游离气体。该病人可能出现的问题是 ()。-->D. 胃肠破裂

228、男性,30 岁,右侧第 5 肋骨骨折,出现呼吸极度困难,发给,出冷汗。检查:BP65/40mmHg,右胸饱满,气管向左侧移位,叩诊鼓音,颈、胸腹部有广泛皮下气肿,首要的处理方法是 ()。-->D. 胸腔穿刺排气减压

229、男性,31 岁,下肢急性蜂窝织炎伴全身化脓性感染,需抽血做血培养及抗生素敏感试验,抽血的最佳时间应是 ()。-->C. 寒战、高热时

230、男性,36 岁,肾移植病人,术后 36 小时,出现少尿,肌酐持续升高,并伴高热、寒战,应考虑其出现 () -->B. 超急排斥

231、男性,39 岁,因脊髓型颈椎病接受手术治疗,对其的出院指导中正确的是 ()。-->A. 避免猛力转头动作

232、男性, 39 岁, 因脊髓型颈椎病接受手术治疗, 正确的出院指导是 ()。-->**A. 避免猛力转头动作**

233、男性, 40 岁, 诊断为十二指肠溃疡, 行毕 E 式胃大部切除术后 2 周, 常常在餐后 20 分钟左右出现上腹胀满、恶心、肠鸣和腹泻, 并伴心慌、出汗、乏力、面色苍白, 甚至虚脱, 自述平卧数分钟后可好转。病人目前出现的问题是 ()。-->**A. 早期倾倒综合征**

234、男性, 45 岁, 术后第二天体温升至 38°C, 第三天恢复, 护士应考虑其发热最可能的原因是 ()。-->**E. 手术热**

235、男性, 45 岁, 司机, 3 小时前因两车相撞, 上腹部被方向盘撞伤, 出现腹部剧痛, 不能行走, 不能直立, 头晕心慌, 眼前发黑, 并有呕吐。检查: T36.0°C P130 次/分 R24 次/分 BP80/60mmHg。患者神志清楚, 急性病容, 呻吟不止, 面色苍白, 出冷汗, 腹式呼吸弱, 全腹胀痛、5 跳痛, 肌紧张以上腹为明显, 移动性浊音 (+), 肠鸣音减弱。诊断性腹腔穿刺抽出不凝固且液 18ml。化验检查: 血红蛋白 50g/L, 红细胞 2×10¹²/L。目前的病人最可能的诊断是外伤但脾破裂、失血性休克。此时最重要的护理措施是 ()。-->**E. 遵医嘱补液**

236、男性, 45 岁, 司机, 3 小时前因两车相撞, 上腹部被方向盘撞伤, 出现腹部剧痛, 不能行走, 不能直立, 头晕心慌, 眼前发黑, 并有呕吐。检查: T36.0°C P130 次/分 R24 次/分 BP80/60mmHg。患者神志清楚, 急性病容, 呻吟不止, 面色苍白, 出冷汗, 腹式呼吸弱, 全腹胀痛、反跳痛, 肌紧张以上腹为明显, 移动性浊音 (+), 肠鸣音减弱。诊断性腹腔穿刺抽出不凝固血液 18ml。化验检查: 血红蛋白 50g/L, 红细胞 2×10¹²/L。病人最可能的诊断是外伤性脾破裂、失血性休克。此时不正确的护理措施是 ()。-->**B. 置热水袋保暖**

237、男性, 46 岁。直肠癌 Miles 术后 7 天出现下腹痛, 体温升高达 38.9°C, 下腹部中度压痛、反跳痛, 应高度怀疑术后出现的并发症是 ()。-->**B. 吻合口瘘**

238、男性, 47 岁, 从高处坠落导致腹部闭合性损伤, 疑有小肠破裂, 提示病人病情恶化需要手术的表现是 ()。-->**E. 腹痛和腹膜刺激征范围扩大**

239、男性, 48 岁, 诊断为十二指肠溃疡, 行毕 E 式胃大部切除术后 2 周, 常常在餐后 20 分钟左右出现上腹胀满、恶心、肠鸣和腹泻, 并伴心慌、出汗、乏力、面色苍白, 甚至虚脱, 自述平卧数分钟后可好转。病人目前出现的问题是 ()。-->**C. 早期倾倒综合征**

240、男性, 50 岁, 胃大部毕 II 式手术后“常于进食后 10-20 分钟出现上腹胀满、恶心、呕吐、心慌、出汗、乏力, 处理方法是 ()。-->**C. 餐后平卧 20 分钟**

241、男性, 52 岁, 因车祸致腹部开放性损伤, 伴少量肠管脱出, 正确的紧急处理措施是 ()。-->**E. 用消毒碗覆盖脱出物, 初步包扎伤口后迅速转送手术室**

242、男性, 55 岁, 毕 II 式胃大部切除术后 2 周, 常于进食后 20 分钟左右出现上腹饱胀、恶心、呕吐、心慌、出汗、乏力, 应考虑给病人 ()。-->**E. 餐后平卧 20 分钟**

243、男性, 56 岁, 食管癌切除, 食管胃吻合术后第 5 天, 进食后突然出现高热、寒战、呼吸困难、胸痛, 白细胞计数 20×10⁹/L, 高度怀疑发生了 ()。-->**B. 吻合口瘘**

244、男性, 56 岁, 行胃大部毕 II 式术后 1 个月, 常于进食 20~30 分钟后出现上腹饱胀、恶心、心悸、头晕、乏力, 应首先考虑给予 ()。-->**D. 调节饮食及餐后平卧 20~30 分钟**

245、男性, 56 岁, 因高度怀疑肠梗阻收住院。入院观察 3 天后症状未缓解, 给予“腹腔镜探查术+肠粘连松解术”, 明确诊断为粘连性肠梗阻, 术中见近端空肠扩张, 肠壁增厚、水肿, 有粘连系带压迫肠管, 约 8cm 肠段发黑坏死。以下关于该病人术后护理措施的叙述, 错误的是 ()。-->**B. 饮食从流质开始**

246、男性, 60 岁, 横结肠癌, 准备做根治术, 术前需要连续服肠道消炎药 ()。-->**A. 3 天**

247、男性, 60 岁, 诊断为原发性肝癌, 行肝叶切除术后第 3 天, 出现嗜睡、烦躁不安、黄疸、少尿等, 应考虑 ()。-->**C. 肝性脑病**

248、男性, 65 岁, 肝癌肝叶切除术后第 1 天, 病人感腹痛、心慌、气促、出冷汗, 血压 90/60mmHg, 首先应考虑为 ()。-->**C. 肝断面出血**

249、男性, 65 岁, 慢性便秘多年。近半年来发现, 站立时阴囊部位出现肿块, 呈梨形, 平卧时可还纳。体检发现外环扩大, 嘱病人咳嗽指尖有冲击感, 平卧回纳肿块后, 手指压迫内环处, 站立咳嗽, 肿块不再出现。该病人诊断为腹股沟斜疝, 拟行疝成形术。为避免术后复发术前准备中最重要的措施是 ()。-->**B. 治疗便秘**

250、男性, 65 岁, 慢性便秘多年。因腹股沟斜疝, 拟行疝成形术收住院。为避免术后复发, 该病人术前准备中最重要的措施是 ()。-->**B. 治疗便秘**

251、男性, 66 岁, 慢性便秘多年。近半年来发现, 站立时阴囊部位出现肿块, 呈梨形, 平卧时可还纳。体检发现外环扩大, 嘱病人咳嗽指尖有冲击感, 平卧回纳肿块后, 手指压迫内环处, 站立咳嗽, 肿块不再出现。该病人诊断为腹股沟斜

疝, 入院行疝成形术。术后当天患者宜采用的体位是 ()。-->**E. 平卧位, 膝、髋关节微曲**

252、男性, 67 岁。完全胃肠外营养支持病人, 该病人护理方法正确的是 ()。-->**C. 不可经营养导管取血**

253、男性, 68 岁, 河南林县人, 因进行性吞咽困难 4 个月就诊, 目前能进流食。既往吸烟 50 年, 每日 1 包。平时喜食脂制食品。其弟因食管癌去世。身高 1.75 肌体重 50kg。食管镜检查提示食管中段癌。拟行食管手术入院。此病人病史中与食管癌发病相关的因素不包括 ()。-->**E. 身高 1.75m, 体重 50kg**

254、男性, 70 岁, 脊柱手术后卧床 2 周, 出现右小腿疼痛、紧张感, 并逐渐出现水肿。应考虑到病人出现的术后并发症是 ()。-->**E. 下肢静脉血栓形成**

255、男性, 72 岁, 诊断为原发性肝癌, 行肝叶切除术后第 3 天, 出现嗜睡、烦躁不安、黄疸、少尿等, 应考虑肝性脑病。以下处理措施不正确的是 ()。-->**D. 增加蛋白质的摄入**

256、男性, 73 岁, 河南林县人, 因进行性吞咽困难 3 个月就诊, 目前能进流食。身高 1.75m, 体重 50kg。食管镜检查提示食管中段癌, 拟行食管手术入院。病人术前最主要的问题是 ()。-->**D. 营养失调: 低于机体需要量**

257、男性, 完全性胃肠外营养支持, 滴注后 2 小时出现口渴、头痛、尿多, 首先处理是 ()。-->**D. 暂停输注**

258、男性, 完全性胃肠外营养支持病人, 营养液滴注后 2 小时出现口渴、头痛、尿多, 该病人可能出现 ()。-->**B. 血糖升高**

259、男性, 因急性阑尾炎行阑尾切除术, 术后 4 天出现下腹坠胀、尿频、里急后重, 可能的诊断是 ()。-->**D. 盆腔脓肿**

260、男性病人, 食管癌切除, 食管胃吻合术后第 5 天, 突然出现高热、寒战、呼吸困难、胸痛, 白细胞 2 错 10⁹/L, 高度怀疑发生了 ()。-->**C. 吻合口瘘**

261、男性的泌尿系损伤最常见的部位是 ()。-->**C. 前尿道**

262、男性患儿, 11 岁, 出现尿频、尿急、尿痛, 排尿困难, 有时排尿突然中断, 应考虑 ()。-->**D. 膀胱结石**

263、脑癌急救护理, 下列哪项是错误的 ()。-->**C. 快速静脉输入 5%葡萄糖**

264、脑出血最常见的原因是 ()。-->**C. 高血压脑动脉硬化**

265、脑脊液鼻漏病人在处理和护理时, 不恰当的做法是 ()。-->**E. 外耳道口放置干棉球防止脑脊液外漏**

266、脑室引流术后, 引流管元脑脊液流出的原因, 不包括 ()。-->**A. 颅内压高于**

267、脑损伤病人的病情观察项目中最重要的是 ()。-->**E. 意识状态**

268、能够使下肢静脉血液向深静脉回流的主要动力是 ()。-->**B. 小腿肌肉泵收缩**

269、能够用于判断甲亢病情严重程度和治疗效果的重要标志是 ()。-->**C. 脉率脉压大小**

270、能够用于判断甲状腺功能亢进病情严重程度和治疗效果的重要标志是 ()。-->**C. 脉压和脉率大小**

271、能预防局麻药中毒的术前用药是 ()。-->**C. 苯巴比妥钠**

272、脓性指头炎病人出现搏动性跳痛时首先应采取的措施是 ()。-->**C. 切开引流**

273、女, 40 岁。胆道手术后, T 管引流 2 周, 拔管前先试行夹管 1-2 天, 夹管期间应注意观察的内容是 ()。-->**B. 腹痛、发热、黄疸**

274、女, 50 岁。右乳腺癌术后上肢活动受限。护士指导其患侧肢体康复锻炼, 应达到的最终目标是 ()。-->**E. 于经头摸到对侧耳尖**

275、女性, 37 岁, 因右乳乳腺癌在全麻下行乳腺癌改良根治术, 现为术后第 1 天, 病人 T3.4°C、P88 次/分、R24 次/分、BP125/80mmHg, 胸部用绷带加压包扎, 皮瓣下置引流管持续引流, 病人诉伤口疼痛, 且现在不能自己洗漱、进餐、如厕等, 病人向家人和护士诉说自己不能接受一侧乳房切除的事实。病人目前主要的护理诊断/问题, 错误的是 ()。-->**E. 潜在并发症: 双侧上肢水肿**

276、女性, 18 岁, 因骨肉瘤行右大腿截肢术, 术后出现幻肢痛, 护理人员向病人的解释中不正确的是 ()。-->**B. 残肢制动以避免疼痛**

277、女性, 23 岁, 颅内动脉瘤, 脑血管造影显示动脉瘤位于 Willis 环前部, 此病人术前最重要的练习是 ()。-->**B. 压迫颈动脉**

278、女性, 29 岁, 因风湿性心脏病行二尖瓣瓣膜置换。术后服用华林, 对其健康教育中最重要的 ()。-->**A. 定期检查凝血功能**

279、女性, 30 岁, 哮喘持续状态 2 天, 动脉血气分析 pH-->**D. 呼吸性酸中毒代偿期**

280、女性, 30 岁, 哮喘持续状态 2 天, 动脉血气分析

pH7.35, PaCO₂9.3kPa, PaO₂6.6kPa, BE+2mmol/L, HCO₃⁻32.5mmol/L, 其酸碱失衡的类型是 ()。-->**D. 呼吸性酸中毒代偿期**

281、女性, 33 岁, 因甲状腺功能亢进入院。查体: T36.6°C, P110 次/分, R19 次/分,

BP125/75mmHg, 甲状腺 11 肿大。病人身高 165cm, 体重 45kg, 近 3 个月来体重下降 5 阳, 快步行走 200 米后即有心慌、气短和出汗。病人行甲状腺

大部切除手术后, 术后护理措施不当的是 ()。
-->**E. 服用甲状腺素片并每日查血象**
282、女性, 33 岁, 因甲状腺功能亢进入院。查体: T36.6℃, P110 次/分, R19 次/分, BP125/75mmHg, 甲状腺 110 肿大。病人身高 165cm, 体重 45kg, 近 3 个月来体重下降 5kg, 快步行走 200 米后即有心慌、气短和出汗。根据公式计算, 该病人的基础代谢率为 ()。-->**D. 49**
283、女性, 33 岁, 因甲状腺功能亢进入院。该甲亢患者术前准备最重要的是 ()。-->**E. 服用抗甲状腺药物**
284、女性, 34 岁, 患前臂急性蜂窝织炎伴全身化脓性感染, 需抽血做血培养及抗生素敏感试验, 最佳时间应是 ()。-->**C. 寒战时**
285、女性, 34 岁, 因甲状腺腺瘤行甲状腺部分切除术, 术后病人出现饮水呛咳, 可能的原因是 ()。-->**E. 喉上神经内支损伤**
286、女性, 36 岁, 体重 60kg, 不慎被蒸气喷伤面部、前胸腹部和双上臂水疱; 面部红斑、疼痛、无水疱, 其余部位剧痛, 有大水疱。烫伤后第一个 24 小时应补丢失液量是 ()。-->**B. 1800ml**
287、女性, 37 岁, 甲状腺大部切除术, 术后 3h 突然出现呼吸困难, 面部青紫, 颈部切口下肿胀, 其原因是 ()。-->**A. 出血**
288、女性, 37 岁, 因右乳乳腺癌在全麻下行乳腺癌改良根治术, 现为术后第 1 天, 病人 T37.4℃, P88 次/分, R24 次/分, BP125/80mmHg, 胸部用绷带加压包扎, 皮瓣下置引流管持续引流, 病人诉伤口疼痛, 且现在不能自己洗漱、进餐、如厕等, 病人向家人和护士诉说不能接受一侧乳房切除的事实。病人目前主要的护理诊断/问题, 错误的是 ()。-->**E. 潜在并发症: 双侧上肢水肿**
289、女性, 38 岁。晨跑时突发右下腹刀割样剧痛, 向会阴部放射, 病人面色苍白、冷汗, 伴恶心、呕吐。查体示体温正常, 心肺无异常, 全腹软, 尿常规示镜下血尿 (++)。应首先考虑 ()。-->**B. 右输尿管结石**
290、女性, 39 岁, 左前臂行石膏绷带包扎后 1 小时, 出现手指剧痛, 苍白发凉, 挠动脉搏动减弱, 应首先采取的措施是 ()。-->**D. 适当松解石膏绷带**
291、女性, 40 岁, 原发性甲亢 2 年, 入院前 1 个月基础代谢率 +40%, 性情急躁, 检查发现甲状腺腺体较大。局麻下行甲状腺大部分切除术后 6 小时, 病人烦躁不安, 呼吸困难, 发绀, 脉搏 102 次/分。问: 病人现在出现了哪种并发症? ()。-->**B. 呼吸困难与窒息**
292、女性, 41 岁, 甲状腺大部分切除术后 30 小时出现进行性呼吸困难, 口唇发绀, 伤口纱布上有少量鲜血渗透, 护士最先考虑的原因是 ()。-->**D. 切口内血肿形成**

293、女性, 45 岁, 因乳腺癌行局部放疗, 胸前壁皮肤出现水疱时, 可局部使用 ()。-->**E. 0.2% 薄荷淀粉**
294、女性, 45 岁, 因乳腺癌行局部放疗, 胸前壁皮肤出现水疱时, 可局部使用 ()。-->**C. 硼酸软膏**
295、女性, 46 岁, 因颅内压增高行脑室外引流术, 该病人脑室引流量每日不宜超过 ()。-->**D. 500ml**
296、女性, 48 岁, 胆囊切除、胆总管探查, T 管引流术后, 提示该病人胆道远端通畅的表现是 ()。-->**D. 食欲好转, 黄疸消退, 引流量减少**
297、女性, 50 岁, 腹胀、腹痛, 大便不成形, 每日 3~4 次, 有脓血便。查体: 左中腹可触及包块, 边界不清, 为明确诊断应做 ()。-->**D. 乙状结肠镜检查**
298、女性, 50 岁。胃大部切除术后 2 周, 进食后约 15 分钟出现上腹饱胀, 恶心、呕吐、头晕、心悸、出汗、腹泻等。应考虑并发了 ()。-->**C. 倾倒综合征**
299、女性, 52 岁, 因车祸致腹部开放性损伤, 伴少量肠管脱出, 正确的紧急处理措施是 ()。-->**E. 用消毒碗覆盖脱出物, 初步包扎伤口后迅速转送手术室**
300、女性, 55 岁, 突发上腹痛 6 小时, 伴高热, 皮肤巩膜发黄。既往 z 胆总管结石 2 年。体检: 一般情况差, T39.8℃, P126 次/分, R24 次/分, BP110.6/8.0kPa, 四肢湿冷, 皮肤发花, 心肺(一), 腹软, 右上腹压痛 C+, 反跳痛 (+), 肌紧张 (+), Murphy 征 (+), 肠鸣音弱。该病人最可能的医疗诊断为 ()。-->**E. 急性梗阻性化脓性胆管炎**
301、女性, 55 岁, 突发上腹痛 6 小时, 伴高热, 皮肤巩膜发黄。既往 z 胆总管结石 2 年。体检: 一般情况差, T39.8℃, P126 次/分, R24 次/分, BP110.6/8.0kPa, 四肢湿冷, 皮肤发花, 心肺(一), 腹软, 右上腹压痛 (+), 反跳痛 (+), 肌紧张 (+), Murphy 征 (+), 肠鸣音弱。该病人最可能的医疗诊断为急性梗阻性化脓性胆管炎, 目前治疗原则是 ()。-->**E. 抗休克的基础上紧急手术解除胆道梗阻**
302、女性, 55 岁, 诊断为胰腺癌, 诉全身瘙痒。查体: 皮肤巩膜黄染。以下护理措施不正确的是 ()。-->**A. 使用碱性清洁剂**
303、女性, 56 岁, 风湿性心脏病病人, 手术前后尤其应注意其出现 ()。-->**C. 低钾血症**
304、女性, 56 岁, 乳腺癌病人, 乳房局部皮肤出现“橘皮征”改变的原因是 ()。-->**A. 癌细胞堵塞皮下淋巴管**

305、女性, 56 岁, 乳腺癌术后病人, 术后 10 小时, 出现患侧皮肤青紫、皮温降低、脉搏不能扪及, 提示 ()。-->**B. 腋部血管受压**
306、女性, 61 岁, 行毕 II 式胃大部切除术后第 5 天, 突然出现体温升高至 39℃, 呼吸困难, 听诊肺部呼吸音减弱, 有湿啰音。应考虑为 ()。-->**E. 肺炎、肺不张**
307、女性, 62 岁, 肝癌肝左叶切除术后第 1 天, 感到腹痛、心慌、气促、出冷汗, 血压 80/50mmHg。首先考虑为 ()。-->**C. 肝断面出血**
308、女性, 67 岁, 急性肾功能衰竭少尿期, 出现呼吸困难, 头痛、软瘫、心律不齐、心动过缓, 腹胀, 应考虑 ()。-->**A. 高钾血症**
309、女性, 69 岁, 重度脑损伤昏迷病人, 医嘱给予鼻饲饮食, 灌注食物时, 应给予病人取 ()。-->**B. 半卧位**
310、女性, 心脏瓣膜置换术后病人, 提示其可能出现心脏压塞的表现是 ()。-->**C. 静脉压升高**
311、女性病人, 50 岁。胃大部切除术后 2 周, 病人进食后约 15 分钟出现上腹饱胀, 恶心、呕吐、头晕、心悸、出汗、腹泻等。可能出现了 ()。-->**C. 倾倒综合征**
312、女性病人, 50 岁。胃大部切除术后 2 周, 病人进食后约 15 分钟出现上腹饱胀, 恶心、呕吐、头晕、心悸、出汗、腹泻等。最主要的护理措施是 ()。-->**C. 嘱病人平卧片刻**
313、女性病人, 毕 II 式胃大部切除术后第 3 天, 突发右上腹剧痛, 伴有腹膜刺激征, 应考虑 ()。-->**E. 十二指肠残端破裂**
314、女性病人, 完全性胃肠外营养支持, 滴注后 2 小时出现口渴、头痛、尿多, 首先处理是 ()。-->**C. 暂停输注**
315、女性病人, 因休克进行扩容治疗, 在快速输液时, 中心静脉压 mmHg。应采取的措施是 ()。-->**E. 减慢输液加强强心剂**
316、判断呼吸性酸碱失衡的唯一指标是 ()。-->**A. pH**
317、判断胃肠破裂的可靠依据是 ()。-->**B. 腹膜刺激征**
318、判断胸腔引流管是否通畅的最简单方法是 ()。-->**E. 观察水封瓶中 t 主管内水柱的波动**
319、破伤风病人采用人工冬眠, 主要目的是 ()。-->**B. 减少抽搐**
320、破伤风注射 TAT 的目的是 ()。-->**C. 中和游离的毒素**
321、前列腺增生病人出现急性尿储留, 15 小时未排尿。正确的护理措施是 ()。-->**B. 留置导尿管**
322、轻度高渗性缺水最主要的表现是 ()。-->**B. 口渴**

323、全肺切除 24 小时补液量控制在 2000ml 以内, 滴注速度为 ()。-->**B. 80~100ml/分**
324、全肺切除病人术后输液, 滴速一般不超过 ()。-->**D. 60 滴/分钟**
325、全肺切除病人术后输液滴速一般每分钟不超过 ()。-->**B. 20 滴**
326、全肺切除术后放置胸腔闭式引流的目的是 ()。-->**D. 调节两侧胸腔压力**
327、全肺切除术后夹闭胸腔闭式引流管的目的是 ()。-->**A. 调节纵隔两侧胸腔压力**
328、全脊做麻醉的主要危险是可引起 ()。-->**B. 呼吸心跳骤停**
329、全麻未醒的病人应取 ()。-->**E. 去枕平卧、头偏向一侧**
330、全胃肠外营养支持病人可能发生的最严重的代谢并发症是 ()。-->**D. 高渗性非酮症昏迷**
331、确认胃癌最可靠的方法是 ()。-->**C. 胃镜检查**
332、人工瓣膜置换术后病人术后指导中关于抗凝药物使用的内容不正确的是 ()。-->**B. 凝血功能正常时可暂停药**
333、人工瓣膜置换术后病人术后最常用的抗凝药物是 ()。-->**B. 华法林**
334、人工髋关节置换术后 3 个月内, 病人可以做的动作是 ()。-->**B. 坐高椅**
335、乳腺癌病人常见的早期临床表现是 ()。-->**C. 无痛性肿块**
336、乳腺癌病人局部皮肤出现“酒窝征”的原因是 ()。-->**D. 癌肿侵及 Cooper 韧带**
337、乳腺癌病人局部皮肤出现“橘皮征”的原因是 ()。-->**D. 癌细胞堵塞浅淋巴管**
338、乳癌多发生于 ()。-->**D. 乳房外上象限**
339、乳癌根治术后第 2 天护理措施不正确的是 ()。-->**D. 指导肩关节的活动**
340、乳癌最常发生的部位是 ()。-->**B. 乳房外上象限**
341、乳癌最早出现的症状是 ()。-->**C. 无痛性肿块**
342、乳房自我检查时, 不正确的方法是 ()。-->**C. 依次用手指抓握检查乳房**
343、乳房自我检查适宜的时间是在月经开始后的 ()。-->**D. 7~10 天**
344、乳房自我检查最好在月经周期的 ()。-->**D. 第 7~10 天**
345、乳腺癌病人术后患侧上肢功能锻炼应达到的目的是 ()。-->**E. 手经头能摸到对侧耳朵**
346、乳腺癌根治术后病人的护理措施中不正确的是 ()。-->**D. 患侧肢体制动**
347、乳腺癌术后病人出现患侧皮肤呈青紫色伴皮肤温度降低、脉搏不能扪及, 提示 ()。-->**B. 腋部血管受压**

348、乳腺癌最主要的淋巴转移途径是 ()。-->**A. 腋窝途径**

349、上消化道穿孔致弥漫性腹膜炎最重要的护理措施是 ()。-->**C. 胃肠减压**

350、深静脉血栓形成的病人, 急性期应绝对卧床休息 10~14 日, 床上活动时避免动作幅度过大, 禁止按摩患肢, 其理由是 ()。-->**B. 防止血栓脱落**

351、肾挫伤非手术治疗期间, 要求病人至少需要卧床 ()。-->**B. 2 周**

352、肾挫伤非手术治疗至少需要卧床 ()。-->**A. 2 周**

353、肾结石病人的主要症状是 () -->**C. 活动后镜下血尿**

354、肾结石病人多表现为 ()。-->**A. 活动后镜下血尿**

355、肾损伤出现明显血尿时见于 ()。-->**D. 肾实质深度裂伤、破入肾盂肾盏**

356、食管癌、食管明显梗阻的病人术前准备中, 减轻食管黏膜水肿的措施是 ()。-->**E. 术前 3 天温盐水洗胃**

357、食管癌病人典型临床表现为 ()。-->**B. 胸骨后针刺样痛**

358、食管癌病人典型症状为 ()。-->**C. 进行性吞咽困难**

359、食管癌病人术后发生乳糜胸后应当选择的营养补充方式是 ()。-->**E. 肠外营养**

360、食管癌病人行根治术后 1 个月又出现吞咽不畅, 最可能的原因是 ()。-->**D. 吻合口狭窄**

361、食管癌的高危因素有 ()。-->**E. 大量饮酒**

362、食管癌根治术后病人 () -->**A. 胃肠功能未恢复前需要禁食**

363、食管癌根治术后少食多餐的主要目的是 ()。-->**C. 防止进食后呼吸困难**

364、食管癌进展期的典型症状为 ()。-->**B. 进行性吞咽困难**

365、食管癌食管梗阻的病人术前给予温盐水洗胃的目的是 ()。-->**B. 减轻胃黏膜水肿**

366、食管癌食管明显梗阻的病人术前减轻食管黏膜水肿的措施是 () -->**E. 术前 3 天温盐水洗胃**

367、食管癌手术后第 3 天拔除胃管后口服流质, 第 5 天体温升高到 39. C, 呼吸困难、胸痛、脉速, 胸透发现手术侧胸腔积液, 应首先考虑并发 () -->**D. 食管吻合口瘘**

368、食管癌术后饮食护理, 错误的是 () -->**C. 嘱病人饭后 2 小时平卧**

369、食管癌术后饮食护理措施中正确的是 ()。-->**C. 胃管拔除 3 周后若无不适可进普食**

370、食管癌最常见的病理类型是 ()。-->**A. 髓质型**

371、食管癌食管明显梗阻的病人术前减轻食管黏膜水肿的措施是 ()。-->**E. 术前 3 天温盐水洗胃**

372、使用石膏绷带病人的护理措施, 正确的是 ()。-->**E. 石膏未干前搬动病人时应用手掌平托 4**

373、手术后切口感染的表现不包括 ()。-->**A. 术后 24 小时内切口剧烈疼痛**

374、手术前禁食的目的是 ()。-->**C. 防止术中呕吐引起窒息**

375、手术前先行清洁灌肠的是 () -->**A. 结肠或直肠手术**

376、首选化疗的肺癌类型是 ()。-->**B. 小细胞癌**

377、输尿管结石病人绞痛发作时, 最重要处理方法是 ()。-->**C. 解痉止痛**

378、输尿管结石病人绞痛发作时, 最重要的处理方法是 ()。-->**D. 解痉止痛**

379、术后并发甲状腺象的主要原因是 ()。-->**E. 术前准备不充分**

380、术后观察病人排便情况的最主要目的是 ()。-->**A. 判断病人胆总管通畅情况**

381、术前体位练习, 正确的是 ()。-->**C. 颈过伸位**

382、术中发现肿块为恶性, 行甲状腺全切手术, 术后医嘱给予甲状腺素片口服。在指导用药时, 不正确的是 ()。-->**B. 药量终身不能改变**

383、提示急性腹膜炎病人病情恶化的重要指标是 ()。-->**A. 腹胀加重**

384、体外循环手术病人术后的电解质浓度的监测尤其应注意 () -->**B. 血钾浓度**

385、通过改善毛细血管通透性降低颅内压的治疗方法是 ()。-->**C. 激素治疗**

386、通过中心静脉途径进行肠外营养支持的病人, 估计其接受营养支持的时间至少应为 ()。-->**E. 2 周**

387、头皮撕脱伤病人被撕脱的头皮的保存方法是 ()。-->**D. 无菌敷料包裹、隔水低温保存**

388、外科疾病的分类不包括 ()。-->**B. 溃疡**

389、完全胃肠外营养支持病人, 营养液滴注后 2 小时左右出现口渴、头痛、尿多, 首先处理是 ()。-->**D. 暂停输注**

390、完全性肠梗阻病人非手术治疗期间, 反映病情缓解最重要的表现 () -->**D. 肛门有排气、排便**

391、王女士, 65 岁。跌倒致左股骨颈骨折, 现给予持续皮牵引处理。该患者最易发生的并发症是 () -->**E. 左股骨头缺血坏死**

392、危险三角区的疖, 挤压后容易导致的严重并发症是 ()。-->**D. 颅内海绵状静脉窦炎**

393、为保持引流装置的密闭和无菌, 如胸腔闭式引流管不慎脱落, 应立即 ()。-->**D. 夹闭引流管, 更换一水封瓶**

394、为了避免诱发下肢放射痛, 腰椎间盘突出症病人直腿抬高一般不能超过 ()。-->**A. 60°**

395、为了缓解腹部损伤病人的疼痛, 可采取的措施不包括 ()。-->**E. 立即使用吗啡类镇痛药**

396、为休克病人补充血容量应首选 ()。-->**C. 平衡盐溶液**

397、为预防肝性脑病, 应给病人提供的营养液类型是 ()。-->**C. 高支链氨基酸配方**

398、为预防破伤风, 清创时冲洗伤口最好使用 () -->**E. 3%双氧水**

399、胃癌病人术前护理措施, 错误的是 ()。-->**C. 要求吸烟的病人尽量减少吸烟的数量**

400、胃癌的主要转移方式是 ()。-->**A. 淋巴转移**

401、胃肠道手术后病人开始进食的时间是在 ()。-->**B. 肛门排气后**

402、胃大部切除术后 24 小时内, 常见的并发症有 ()。-->**A. 胃出血**

403、胃大部切除术后 5 天, 病人突然发生上腹部剧烈疼痛, 并伴有强烈的腹膜刺激征, 首先考虑为 ()。-->**E. 胃肠吻合口瘘**

404、胃大部切除术后需要及早手术的梗阻类型是 () -->**C. 输入段完全梗阻**

405、绞窄病与嵌顿疝的主要区别在于 ()。-->**C. 病内容物有无血运障碍**

406、无菌环境下配置的要素膳, 放置于 4℃冰箱冷藏, 其有效时间应小于 ()。-->**A. 24 小时**

407、吸人性麻醉前为了减少呼吸道分泌物, 给病人使用的药物是 ()。-->**C. 阿托品**

408、下列不属于肠梗阻的基本处理的是 ()。-->**E. 及早使用止痛剂**

409、下列骨折中属于不完全骨折的是 ()。-->**A. 青枝骨折**

410、下列关于肠外营养的护理的叙述, 正确的是 ()。-->**C. 不要经中心静脉导管取血**

411、下列关于肠外营养的护理正确的是 ()。-->**C. 不要经中心静脉导管取血**

412、下列关于冬眠低温治疗期间的护理的叙述, 错误的是 ()。-->**A. 复温时应先停止使用冬眠药物**

413、下列关于冬眠低温治疗期间的护理的叙述错误的是 ()。-->**D. 复温时应先停止使用冬眠药物**

414、下列关于甲亢病人的饮食指导, 正确的是 ()。-->**C. 高维生素、多饮水**

415、下列关于颅前窝骨折病人的护理错误的是 ()。-->**B. 用抗菌药溶液冲洗鼻腔**

416、下列哪项不是腹膜炎患者采用半卧位的目的 ()。-->**C. 防止下肢静脉血栓形成**

417、下列哪项属于原发性腹膜炎的病因 ()。-->**B. 病原菌经血液侵入腹腔**

418、下列术后肺不张的预防措施中, 不正确的是 ()。-->**E. 吸烟者术前 3 日戒烟**

419、下列不需要紧急手术的情况是 ()。-->**B. 严重休克不能纠正**

420、下肢静脉曲张病人病变早期的主要表现是 ()。-->**A. 下肢沉重酸胀感**

421、下肢静脉曲张病人使用弹力袜或弹力绷带时的注意事项, 错误的是 ()。-->**B. 清晨起床后穿戴, 先将弹力袜从头卷到足趾**

422、下肢静脉曲张剥脱术后病人应 ()。-->**D. 早期下床活动**

423、下肢静脉曲张的主要原因是 () -->**B. 静脉瓣膜破坏**

424、下肢深静脉血栓病人最主要的治疗方法是 ()。-->**D. 溶栓疗法**

425、下肢深静脉血栓病人最主要的治疗方法是 ()。-->**A. 抗凝疗法**

426、下肢深静脉血栓形成最严重的并发症是 () -->**B. 肺栓塞**

427、夏柯 (Charcot) 三联征是 ()。-->**A. 剑突下绞痛, 寒战高热, 黄疸**

428、现代外科护理学的概念是 ()。-->**E. 研究外科领域对人的整体护理**

429、休克代偿期的临床表现是 ()。-->**B. 血压稍升高, 脉搏快, 脉压减小**

430、需要实施补液疗法的病人首要需要明确的问题是 () -->**C. 体液失衡的类型**

431、眩晕和猝倒主要见于 ()。-->**B. 椎动脉型颈椎病**

432、血栓闭塞性脉管炎病人局部缺血期最主要的特点是 ()。-->**C. 间歇性跛行**

433、血栓闭塞性脉管炎的护理, 下列错误的是 () -->**B. 患肢每晚用 40℃水热敷**

434、压头试验阳性主要是由于试验时压迫或刺激了病人的 ()。-->**C. 颈肩部神经根**

435、腰椎间盘突出症的基本发病原因是 ()。-->**D. 椎间盘退行性变**

436、腰椎间盘突出症病人腰部活动时, 最容易受限的动作是 ()。-->**A. 前屈**

437、腰椎间盘突出症的好发部位是 ()。-->**E. L4~5 椎间盘和 L5~S1 椎间盘**

438、腰椎间盘突出症的基本病因是 () -->**D. 椎间盘退行性变**

439、腰椎间盘突出症的基本发病原因是 ()。-->**E. 椎间盘退行性变**

440、腰椎间盘突出症患者术后为防止患者神经根粘连, 最主要的做法是 () --> [A. 直腿抬高练习](#)

441、腰椎间盘突出症患者术后行直腿抬高练习的最主要的目的是为了预防 ()。--> [A. 神经根粘连](#)

442、腰椎间盘突出最常压迫的神经根是 ()。--> [D. L5 和 S1 神经根](#)

443、腰椎结核病人可出现 ()。--> [D. 拾物试验阳性](#)

444、一般情况下, 颈、胸、腹部手术后采用 ()。--> [A. 半坐卧位](#)

445、一先生, 62 岁, 先是夜间尿频, 后逐步排尿时间延长, 尿不净, 今下午排不出尿, 小腹胀痛来院就诊。护士首先应如何处理 () --> [C. 导尿并留置导尿管](#)

446、医嘱为病人每日补充 1000 氯化钾溶液 30ml, 在配置好的溶液中, 氯化钾浓度王巫大于 ()。--> [B. 0.3%](#)

447、胰头癌最主要的临床表现是 ()。--> [B. 进行性黄疸](#)

448、胰头癌最主要的症状是 ()。--> [C. 黄疸](#)

449、胰腺癌常见的首发症状是 ()。--> [E. 上腹痛](#)

450、胰腺癌的好发部位是 ()。--> [E. 胰头部](#)

451、胰腺癌有明显黄疸的病人, 术前需补充的维生素是 ()。--> [B. 维生素 K](#)

452、以下不符合脑震荡的表现的是 ()。--> [C. 意识障碍多在 30 分钟以上](#)

453、以下不属于机械性肠梗阻的是 ()。--> [B. 肠麻痹](#)

454、以下符合早期休克表现的是 () --> [E. 面色苍白, 烦躁不安](#)

455、以下是脑室引流术后, 引流管无脑脊液流出的原因, 除了 ()。--> [A. 颅内压高于 0.98~1.47kPa \(12~15cmH₂O\)](#)

456、硬膜外麻醉最严重的并发症是 ()。--> [E. 全脊髓麻醉](#)

457、硬脑膜外血肿病人意识障碍的典型表现是 ()。--> [C. 中间清醒期](#)

458、用于保护瘘口周围皮肤的常用药膏是 ()。--> [C. 氧化锌软膏](#)

459、有关肝动脉插管化疗的病人护理的叙述不正确的是 () --> [D. 若出现发热, 应使用抗菌药物](#)

460、有关下肢深静脉血栓非手术治疗护理及术前护理措施, 错误的是 ()。--> [C. 术后多卧床, 不宜早期离床活动](#)

461、右半结肠癌的主要表现不包括 ()。--> [E. 脓血便](#)

462、右上肺叶切除术后第一天病人最适宜的体位是 ()。--> [E. 半卧位 1](#)

463、预防腹股沟斜疝修补术后阴囊血肿的措施是 ()。--> [C. 切口用砂袋压迫并托阴囊](#)

464、预防全麻患者发生误吸的主要护理措施是 () --> [A. 术前禁食禁水](#)

465、预防腰麻术后头痛的主要措施是--> [E. 去枕下卧 6~8 小时](#)

466、预防腰麻术后头痛的主要措施是 ()。--> [E. 去枕平卧 6~8 小时](#)

467、预计该病人术后引流管至少留置 ()。--> [D. 14 天](#)

468、元菌环境下配置的要素饮食, 其有效时间应小于 ()。--> [D. 24 小时](#)

469、元条件时, 可用下列哪个公式计算基础代谢率 ()。--> [D. \(脉率+脉压\) -111](#)

470、原发性腹膜炎的病因是 ()。--> [D. 病原菌经血行感染](#)

471、原发性肝癌肝区疼痛的特点是 ()。--> [A. 持续性胀痛](#)

472、原发性肝癌最常见的首发症状是 () --> [C. 肝性昏迷](#)

473、原发性肝癌最常见的首发症状是 ()。--> [D. 肝区疼痛](#)

474、在 Colles 骨折病人的临床表现中, 属于骨折专有体征的是 () --> [E. 枪刺刀畸形](#)

475、在 Colles 骨折病人的临床表现中, 属于骨折专有体征的是 ()。--> [B. “枪刺刀”畸形](#)

476、在高位颈部脊髓损伤病人受伤早期, 应严密观察病人是否出现了 ()。--> [B. 呼吸衰竭](#)

477、在高位颈髓损伤病人受伤早期, 应严密观察病人是否出现了 () --> [A. 呼吸衰竭](#)

478、在无菌条件下配制的要素饮食 4℃冷藏的有效期为 ()。--> [E. 24 小时](#)

479、在肿瘤病人化疗或放疗期间, 最主要的观察项目是 ()。--> [A. 血象](#)

480、早期非小细胞癌的主要根治方式是 ()。--> [E. 手术](#)

481、早期胃癌诊断的最有效方法是 ()。--> [B. 纤维胃镜](#)

482、张力性气胸致死的主要原因是 ()。--> [E. 严重缺氧 1](#)

483、张女士, 62 岁, 因肝区隐痛伴食欲减退、乏力 3 个月入院, 既往有慢性肝炎病史 15 年。体格检查右上腹压痛, 肝大、肝区叩击痛明显。CT 示左、右肝内多个占位病变, 最大者 8cm×8cm×10cm, 肝硬化, 脾大。住院后给予肝动脉栓塞化疗。肝动脉栓塞化疗后预防出血的护理措施, 不正确的是 ()。--> [D. 卧床 12 小时后方可活动](#)

484、诊断肠梗阻的最主要依据是 ()。--> [D. 错线检查结果](#)

485、诊断肠梗阻最主要的依据是 ()。--> [E. 排便排气停止](#)

486、诊断大肠癌最有效、可靠的方法是 ()。--> [E. 内镜检查](#)

487、诊断腹内实质性脏器损伤最可靠的依据是 () --> [E. 腹腔穿刺抽到不凝固血液](#)

488、诊断颅底骨折最可靠的临床表现是 () --> [D. 脑脊液漏](#)

489、诊断颅底骨折最可靠的临床表现是 ()。--> [E. 脑脊液含血](#)

490、诊断颅底骨折最主要的依据是 ()。--> [A. 脑脊液漏](#)

491、诊断椎管内肿瘤最有价值的辅助检查方法是 ()。--> [C. 脊髓造影](#)

492、枕骨大孔疝不同于小脑幕切迹疝的临床表现是 ()。--> [D. 呼吸骤停出现早](#)

493、正常成年人 24 小时液体的出入量约为 ()。--> [D. 2000-2500ml](#)

494、直肠癌的早期症状不包括 ()。--> [C. 下腹痛](#)

495、直肠癌根治术能否保留肛门取决于 ()。--> [A. 肿瘤距肛门的距离](#)

496、直肠癌手术前准备, 下列哪项处理不正确 () --> [B. 术前 3 日服用肠道吸收抗生素](#)

497、耻骨骨折的肋骨是 ()。--> [C. 第 4-7 肋](#)

498、治疗良性前列腺增生的最重要的方法是 ()。--> [C. 经尿道前列腺切除术](#)

499、治疗破伤风的中心环节是 ()。--> [E. 控制痉挛](#)

500、治疗食管癌首选的方法是 ()。--> [A. 手术治疗](#)

501、中度甲亢患者基础代谢率多在 ()。--> [D. +30%~+60%](#)

502、肿瘤病人放疗局部的皮肤有水疱时可局部使用 ()。--> [C. 硼酸软膏](#)

503、属于乳腺癌高危人群的是 ()。--> [C. 月经初潮于 10 岁者](#)

504、属于肾性肾功能衰竭的病因是 ()。--> [A. 肾中毒](#)

505、最常见的病内容物是 ()。--> [B. 小肠和大网膜](#)

506、左半结肠癌病人的主要症状是 ()。--> [C. 肠梗阻](#)

507、左上肺叶切除术后第一天病人最适宜的体位是 () --> [E. 半卧位](#)

电大资源网, 每次考试为您提供最新最全的期末考试题库, 有需要直接访问 <http://www.dda123.cn/> 任何问题都可以联系我微信: 905080280