



请直接打印, 已按字母排版

已整理 700 个国开科目, 有需要请直接微信 905080280, 说明要购买的试卷号及科目名称即可

ps: 资料考前整理, 只供大家复习使用! 已和最新历届试题核对, 有新题并已整合, 以此版为准

电大资源网 1475 《药物治疗学》开放大学期末考试笔试题库 (按拼音) (343)

适用: 【**笔试**】【**课程号: 1**】

总题量 (343): 单选 (262) 名词配伍题 (81) 程序分析题 (0)

作者: 电大资源网: <http://www.dda123.cn/> (任何问题可微信留言, 搜微信: 905080280)

资料考前整理, 只供大家复习使用! 题库上次考试可用, 这次有可能改版, 如果科目改版资料对不上, 可以把科目名称发我微信, 可退回下载该改版科目的积分

ps: 如果把改版科目可用的题目拍图发微信可奖励 10-20 下载券, 把最新版题库发微信可奖励 20-50 下载券

单选 (262)--电大资源网: <http://www.dda123.cn/> (微信搜: 905080280)

- AD 患者在治疗过程中出现幻觉、妄想等精神症状, 可以选用的药物是 ()。-->**A. 氯硝西泮**
- IDL 是指 ()。-->**C. 低密度脂蛋白**
- IgA 肾病应评估肾脏疾病进展的风险, 治疗上以降蛋白尿和降压为主, 如尿蛋白 > 0.5g/d 时, 推荐 ()。-->**A. ACEI 或 ARB 治疗**

4、RCT 的含义是 ()。

C. 随机对照试验

5、RCT 的含义是 ()。-->**C. 随机对照试验**

6、阿尔茨海默症患者的首发症状是 ()。-->**A. 记忆障碍**

7、阿尔茨海默症患者的首发症状是 ()。-->**A. 记忆障碍**

8、阿片类药物的特点不正确的是 ()。-->**B. 具有天花板效应**

9、癌症患者长期使用阿片类止痛药时, 首选的给药途径是 ()。

-->**A. 口服给药**

- 癌症患者轻度疼痛, 可选用 ()。-->**A. 非甾体抗炎药**
- 按照 GRADE 证据质量分级标准, 证据质量共被分为 () 级。-->**B. 4**
- 按照 GRADE 证据质量分级标准, 证据质量共被分为 () 级。-->**B. 4**
- 按照 GRADE 证据质量分级原则, 证据质量共被分为几级? ()。-->**D. 6**
- 奥美拉唑的作用机制, 正确的是 ()。-->**D. 抑制 H⁺-K⁺-ATP 酶的活性**
- 避免吸入激素后的口咽部不良反应的方式中, 不正确的表述是 ()。-->**D. 选用普通定量气雾剂**
- 变应性鼻炎中对于中重度间歇性和持续性鼻炎的首选药物是 ()。-->**C. 鼻内用糖皮质激素**
- 不符合三阶梯止痛治疗方案的用药原则的是 ()。-->**B. 疼痛时给药**
- 不适合外用糖皮质激素治疗的疾病是 ()。-->**D. 体股癣**
- 不宜处方用于泌尿系统感染的抗菌药物是 ()。-->**B. 莫西沙星**
- 不属于阿片类药物的特点是 ()。-->**B. 具有封顶效应**
- 不属于非促胰岛素分泌剂的是 ()。-->**C. 格列奈类**
- 不属于冠心病的风险因素的是 ()。-->**C. HDL-C 水平增高**
- 不属于甲氧普胺禁忌证的是 ()。-->**C. 恶心、呕吐**
- 不属于抗心律失常药物治疗的目的及原则的是 ()。-->**D. 选择抗心律失常药物时, 优先考虑有效性而不是安全性**
- 不属于临床研究的是 ()。-->**A. 专家会诊**
- 不属于心力衰竭治疗基本药物的是 ()。-->**C. 维拉帕米**
- 不属于心力衰竭治疗基本药物的是 ()。-->**C. 维拉帕米**
- 不属于心衰治疗基本药物是 ()。-->**C. 维拉帕米**
- 不属于循证医学定义的核心内容的是 ()。-->**C. 规章制度**
- 不属于医疗机构药学信息服务的核心的是 ()。-->**D. 药品生产**
- 不属于治疗轻中度 AD 的 - 线药物的是 ()。-->**B. 美金刚联合多奈哌齐**
- 长期治疗持续性哮喘的首选药物为 () -->**B. 布地奈德干粉吸入剂 (都保)。**
- 常用的减充血剂不包括 ()。-->**D. 0.05% 盐酸羟甲唑啉**
- 成年男性贫血的诊断标准是 ()。-->**B. 血红蛋白 120g/L**
- 成人正常血小板计数参考范围为 ()。-->**A. (100~300) X10⁹/L**
- 成人正常血小板计数参考范围为 ()。-->**A. (100~300) X10⁹/L**
- 成人正常血小板计数参照范畴为 ()。-->**A. 100~300 X10⁹/L**
- 雌激素预防和治疗骨质疏松的主要作用机制是 ()。-->**D. 破骨细胞通过自身的胞饮作用使雌激素进入细胞内, 使破骨细胞的活性受到抑制**
- 催眠药物换药指征不包括 ()。-->**D. 使用超过 1 个月**
- 蛋白尿指尿液中蛋白质含量超过 ()。-->**C. 150mg/24h**
- 滴虫性阴道炎的治疗药物首选 ()。-->**B. 甲硝唑**
- 滴虫性阴道炎的治疗药物首选 ()。-->**B. 甲硝唑**
- 滴虫性阴道炎的分泌物的典型特点为 ()。-->**C. 稀薄脓性、黄绿色、泡沫状、有臭味**

- 第二代抗精神病药物的特点错误的是 ()。-->**A. 作用机制为单一阻断 DA2R 受体, 故称为典型抗精神病药物**
- 第二代抗精神病药物特点的描述, 错误的是 ()。-->**A. 作用机制为单一阻断 DA2R 受体, 故称为典型抗精神病药物**
- 第五生命体征是 ()。-->**B. 疼痛**
- 癫痫持续状态的首选药物为 ()。-->**C. 静注地西泮**
- 癫痫持续状态的首选药物治疗为 ()。-->**C. 静注地西泮**
- 对疼痛的定义正确的表述是 () -->**C. 是组织损伤或潜在的组织损伤所引起的不愉快感觉和情感体验**
- 对疼痛的定义正确的表述是 ()。-->**C. 是组织损伤或潜在的组织损伤所引起的不愉快感觉和情感体验**
- 对细菌性阴道病的治疗, 错误的是 ()。-->**B. 推荐甲硝唑 2g 顿服治疗**
- 对乙陆氨基酚 (扑热息痛) 属于 ()。-->**A. 解热镇痛药**
- 对于基础合并心血管疾病的糖尿病患者, 有降低心血管事件风险获益的药物是 ()。-->**D. 恩格列净**
- 对于口服华法林的非瓣膜性房颤患者, 应调整药物剂量使 INR 保持在 ()。-->**C. 2.0-3.0**
- 对于脱髓鞘性视神经炎患者在病情需要时可予大剂量糖皮质激素冲击治疗, 治疗方案是 ()。-->**B. 甲泼尼龙 1g/d 静脉滴注**
- 对于药物的“天花板”效应, 正确表述是 ()。-->**B. 疼痛加剧时, 增加药物剂量, 不会增加镇痛效果, 只会增加不良反应**
- 多吃新鲜水果和蔬菜即可补充摄入不足的是 ()。-->**B. 叶酸缺乏性贫血**
- 反映糖尿病较长时间血糖控制水平的“金指标”是 ()。-->**D. 糖化血红蛋白**
- 非促胰岛素分泌剂不包括 ()。-->**C. 格列奈类**
- 肺结核初治的疗程为 ()。-->**A. 强化期 2 个月/巩固期 4 个月**
- 肺结核初治疗程为 ()。-->**A. 强化期 2 个月/巩固期 4 个月**
- 高血压患者伴蛋白尿患者, 可首选降压药是 ()。-->**A. ACEI**
- 根除幽门螺杆菌的三联疗法, 不合理的是 ()。-->**D. 硫糖铝+阿莫西林+替硝唑**
- 骨关节炎的主要病变是 ()。-->**C. 关节软骨退变和继发性骨质增生**
- 关于阿仑膦酸钠患者用药指导, 不正确的是 ()。-->**C. 服药后可静卧 10 分钟**
- 关于贝特类药物说法错误的是 ()。-->**D. 对 TG 无降低作用甚至稍有升高**
- 关于贝特类药物说法错误的是 ()。-->**D. 对 TG 无降低作用甚至稍有升高**
- 关于成本效果分析表述不对的是 ()。-->**C. 成本效果比越低, 方案越有经济性**
- 关于地塞米松的药理作用, 下列选项不正确的是 ()。-->**B. 保钠排钾作用强**
- 关于二甲双胍的说法, 不正确的是 ()。-->**A. 不可与磺脲类口服降糖药合用, 合用时低血糖风险增加**
- 关于二甲双胍的说法不正确的是 ()。-->**A. 本品不可与磺脲类口服降糖药合用, 合用时低血糖风险增加**

72、关于骨质疏松, 下述说法中不正确的是 (→) **C.VD, 的绝对适应证是长期接受糖皮质激素治疗的患者**

73、关于骨质疏松, 下述说法中不正确的是 (→) **DVD3 是维生素类药物, 故可安全放心地服用**

74、关于华法林的说法, 不正确的是 (→) **D 食物对华法林的作用影响小**

75、关于华法林说法, 不对的是 (→) **D.食物对华法林作用影响小**

76、关于降尿酸治疗的叙述正确的是 (→) **B.降尿酸治疗的目标是促进晶体溶解和防止晶体形成**

77、关于她汀类说法错误的是 (→) **C.临床惯用有: 洛伐她汀、辛伐她汀、普伐她汀、氟伐她汀、阿托伐她汀以及重要成分为洛伐她汀血脂康**

78、关于利尿剂论述错误的是 (→) **B.痛风者及肾功能不全者禁用**

79、关于使用非甾体抗炎药治疗骨关节炎的注意事项的叙述不正确的是 (→) **B.对腰椎间盘突出症而言, 使用非甾体抗炎药可以防止疾病的发展及合并症的发生**

80、关于他汀类说法错误的是 (→) **B.最严重的不良反应是粒细胞减少及肾功能受损**

81、关于他汀类说法错误的是 (→) **B 最严重的不良反应是粒细胞减少及肾功能受损**

82、关于胃黏膜保护因素, 错误的是 (→) **C.胃泌素**

83、关于消化性溃疡的发病机制的叙述较全面的是 (→) **B.致溃疡的攻击因素和人体对胃黏膜的保护因素失去平衡**

84、关于洋地黄毒苷类药物说法错误的是 (→) **D.收缩功能异常引致心衰者, 无论其心衰程度如何, 浮现快室率房颤是洋地黄毒苷特别适应证**

85、关于药品说明书, 下列说法正确的是 (→) **D.药品说明书包含规格、用法用量、不良反应、禁忌证等信息**

86、关于药物说明书, 下列说法不对的是 (→) **B.药物说明书包括药物安全性、有效性和价格等数据和信息**

87、关于药物蒙脱石的描述, 错误的是 (→) **D 不适用于儿童腹泻**

88、关于左旋多巴不良反应的说法, 错误的是 (→) **组合白董中东系供厢白强海→D 肝性脑病**

89、关于左旋多巴不良反应的说法错误的是 (→) **D.肝性脑病**

90、过敏性结膜炎可选用 (→) **D.2% 色甘酸钠滴眼液**

91、和抑郁症药物治疗相关的神经递质不包括 (→) **D.多巴胺**

92、化脓性中耳炎的治疗为积极控制感染, 通畅引流, 不可选择的抗菌药物 (→) **A.氨基糖苷类**

93、患者, 男, 72 岁, 主因“血压升高 6 个月”入院。患者不规律服用中成药, 血压控制不佳。3 个月前患者将降压药物调节为氨氯地平, 血压波动于 160-170/90-100mmHg。该患者当前血压控制不佳, 需联合降压药物, 不适合是 (→) **B.硝苯地平**

94、患者口服泼尼松 60mg, 每天一次, 若改为口服甲泼尼龙, 则甲泼尼龙的剂量应为 (→) **B.52mg**

95、患者男, 16 岁, 诊断抑郁症, 应用氟西汀 3 个月后, 抑郁症状完全消失, 下一步处理是 (→) **D 继续原方案治疗**

96、患者男, 16 岁, 诊断抑郁症, 应用氟西汀 3 个月后, 抑郁症状完全消失, 下一步处理是 (→) **D.继续原方案治疗**

97、急性鼻炎的最常见致病种类为 (→) **B.鼻病毒**

98、甲氧西林耐药金葡菌感染肺炎宜选用抗菌药物是 (→) **D.万古霉素**

99、结膜炎根据病因可分为细菌性、病毒性、免疫性, 药物治疗不建议 (→) **C.长期混合几种抗菌药物滴眼液联合滴眼**

100、结膜炎根据病因可分为细菌性、病毒性、免疫性, 以下药物治疗方法中不建议采用的是 (→) **C 长期混合几种抗菌药物滴眼液联合滴眼**

101、精神分裂症稳定期的治疗错误的是 (→) **C.应住院治疗**

102、精神分裂症药物治疗原则, 错误的是 (→) **B.复发患者应换用之前未使用过的药物**

103、精神分裂症最主要、最本质的症状是 (→) **B.思维障碍**

104、抗帕金森病的药物是 (→) **D.胆碱受体阻断药**

105、抗抑郁药物治疗原则, 不恰当的是 (→) **C.如仍无效, 可考虑换药, 但不能换用同类另一种药**

106、可促进铁剂吸收的维生素是 (→) **D.维生素 C**

107、控制慢性阻塞性肺疾病症状的主要治疗措施是使用 (→) **A.支气管扩张剂**

108、老年人缺乏维生素 D 的主要影响因素是 (→) **D 户外活动减少**

109、老年人缺乏维生素 D 的主要影响因素是 (→) **D.户外活动减少**

110、利尿剂的主要不良反应是 (→) **A.大剂量使用会导致低血钾症和影响血脂、血糖和尿酸代谢**

111、硫脲类抗甲状腺药起效慢的主要原因是 (→) **D 待已合成的甲状腺激素耗竭后才能生效**

112、硫脲类抗甲状腺药起效慢的主要原因是 (→) **D.待已合成的甲状腺激素耗竭后才能生效**

113、慢性疼痛病人长期服用非甾体类抗炎药物的不良反应有 (→) **D.以上都对**

114、男性患者 72 岁, 因左膝关节行走远距离后疼痛 5 年就诊, 正侧位 X 线显示左膝内侧间隙变窄, 边缘骨质增生, 软骨下骨硬化, 患者首选的药物治疗是 (→) **A.短期口服非甾体抗炎药**

115、脑血栓形成最常见的病因是 (→) **A.脑动脉粥样硬化**

116、能提高左旋多巴疗效的药物是 (→) **D.卡比多巴**

117、尿路感染最常见的细菌为 (→) **B 大肠埃希菌**

118、尿路感染最常见的细菌为 (→) **B.大肠埃希菌**

119、尿酸在血液中的溶解度最高的酸碱值是 (→) **C.pH 在 6.2 至 6.8 之间**

120、皮肤出现红斑、水肿、糜烂、渗液, 外用药首选 (→) **D.溶液湿敷**

121、青光眼降眼压的常用药物, 不包括 (→) **C.氟米龙**

122、青光眼是一组以视神经萎缩和视野缺损为共同特征的疾病, 主要临床表现有 (→) **B.眼压升高或正常**

123、轻度癌痛可选用的药物是 (→) **A.阿司匹林**

124、妊娠高血压进行降压治疗的药物不包括 (→) **D.硫酸镁**

125、如下不是抗心律失常药物治疗目及原则是 (→) **D.选取抗心律失常药物时, 优先考虑有效性而不是安全性**

126、如下不属于循证医学定义核心内容是 (→) **B.临床医生个人经验**

127、三阶梯止痛治疗方案的代表药物 (→) **A 阿司匹林、可待因、吗啡**

128、三阶梯止痛治疗方案的代表药物 (→) **A.阿司匹林可待因吗啡**

129、肾病综合征最主要的诊断依据是 (→) **A.大量蛋白尿**

130、失神发作不宜选择的药物为 (→) **D.卡马西平**

131、使用时需注意高血钾的药物是 (→) **D 螺内酯**

132、双膦酸盐类的主要不良反应是 (→) **A.上消化道紊乱和对食管刺激**

133、他汀类药物对缺血性脑卒中患者的作用不包括 (→) **A 预防脑血管痉挛**

134、他汀类药物对缺血性脑卒中患者的作用不包括 (→) **A. 预防脑血管痉挛**

135、疼痛得到控制的标准是 (→) **D.A+B+C**

136、通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是 (→) **C 硝苯地平**

137、通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是 (→) **C 硝苯地平**

138、头癣内服药治疗首选 (→) **A.灰黄霉素**

139、推荐给药前进行 HLA-B*1502 基因筛查的药品是 (→) **D.卡马西平**

140、脱髓鞘性视神经炎在病情需要时可予大剂量糖皮质激素冲击治疗, 治疗方案是 (→) **B.甲泼尼龙 1g/d 静脉滴注**

141、维生素 K1 的作用是 (→) **C.抗凝药过量引起的出血**

142、吸入激素后的口咽部不良反应可通过如下方式避免, 不正确的表述是 (→) **D.选用普通定量气雾剂**

143、吸入激素后口咽部不良反应可通过如下方式避免, 不对的表述是 (→) **D.选用普通定量气雾剂**

144、系统治疗银屑病的一线药物有 (→) **A.甲氨蝶呤**

145、下列不是常用的减充血剂, 此类药物一般连续使用不超过 7 天的是 (→) **C.氯雷他定**

146、下列不是常用的减充血剂的是 (→) **C.氯雷他定**

147、下列不是青光眼降眼压的常用药物的是 (→) **C 氟米龙**

148、下列不是失眠首选药物的是 (→) **D.氯硝西泮**

149、下列不是失眠首选药物的是 (→) **D 氯硝西泮**

150、下列不是双重抗血小板治疗首选指征的是 (→) **D 心源性栓塞导致的脑卒中**

151、下列不属于阿尔海默病的危险因素的是 (→) **C 血液病**

152、下列不属于胆碱酯酶抑制剂的是 (→) **C.美金刚**

153、下列不属于肝功能检查指标是 (→) **D.血清肌酐**

154、下列不属于冠心病风险因素是 (→) **C.高密度脂蛋白胆固醇增高**

155、下列不属于甲氧氯普胺禁忌证的是 (→) **C.恶心、呕吐**

156、下列不属于炎症性肠病维持期药物治疗选择的是 (→) **C.糖皮质激素**

157、下列不属于影响药物治疗重要因素是 (→) **D.天气**

158、下列不属于治疗轻中度 AD 的一线药物的是 (→) **B.美金刚联合多奈哌齐**

159、下列不属于治疗轻中度阿尔茨海默症的一线药物的是 (→) **B.美金刚联合多奈哌齐**

160、下列根除幽门螺杆菌的三联疗法不合理的是 ()。-->**D. 硫糖铝+阿莫西林+替硝唑**

161、下列关于 NSAID 的描述,错误的是 ()。-->**B. 对腰椎间盘突出症而言,使用 NSAID 可以防止疾病的发展及合并症的发生**

162、下列关于 NSAID 的描述,错误的是 ()。-->**B. 对腰椎间盘突出症而言,使用 NSAID 可以防止疾病的发展及合并症的发生**

163、下列关于非甾体抗炎药治疗类风湿关节炎,使用注意中不正确的是 ()。-->**D. 可同时服用两种或两种以上非甾体抗炎药**

164、下列关于非甾体抗炎药治疗类风湿关节炎,使用注意中不正确的是 ()。-->**A. 注意非甾体抗炎药的种类、剂量和剂型个体化**

165、下列关于肾上腺素受体阻滞剂说法对的是 ()。-->**C. 禁用于妊娠妇女、高血压症**

166、下列关于肾上腺素受体阻滞剂说法正确的是 ()。-->**DB. 受体阻滞剂尤其适用于伴快速心律失常冠心病、心力衰竭、交感神经括约性增高以及高动力状态的高血压患者**

167、下列关于失眠首选药物的说法,错误的是 ()。-->**D. 可首选氯硝西泮**

168、下列关于失眠治疗的说法,错误的是 ()。-->**C. 对于急性失眠,不应使用药物治疗,以免形成药物依赖**

169、下列关于双膦酸盐的使用叙述正确的是 ()。-->**A. 口服双膦酸盐类的主要不良反应是上消化道紊乱和对食管刺激**

170、下列关于微生态制剂的描述,错误的是 ()。-->**D. 安全性高,不会发生过敏反应**

171、下列关于维生素-->**D. 治疗骨质疏松的说法中,不正确的是 ()**

172、下列关于维生素 D,治疗骨质疏松的说法中,不正确的是 ()。-->**D. 长期服用维生素 D,也不会导致患者维生素 D,蓄积中毒**

173、下列关于吸入型短效 β_2 受体激动剂,不对的说法是 ()。-->**D. 为长期治疗持续性哮喘的首选药物**

174、下列关于药物治疗作用的描述,错误的是 ()。-->**A. 磺脲类药物是通过作用于胰岛 B 细胞表面的受体促进胰岛素分泌**

175、下列精神分裂症药物治疗原则错误的是 ()。-->**B. 复发患者应换用之前未使用过的药物**

176、下列抗癫痫药对于肝药酶代谢有自身诱导作用的是 ()。-->**B. 卡马西平**

177、下列抗菌药物不宜处方用于泌尿系统感染的是 ()。-->**B. 莫西沙星**

178、下列抗帕金森病药,通过在脑内转变为多巴胺起作用的是 ()。-->**A. 左旋多巴**

179、下列可选用单硝酸异山梨酯治疗疾病是 ()。-->**D. 不稳定性心绞痛**

180、下列是系统性红斑狼疮的基础治疗药物,应长期维持使用的是 ()。-->**A. 羟氯喹**

181、下列是系统性红斑狼疮的基础治疗药物,可控制皮疹和减轻光过敏的是 ()。-->**C. 他克莫司**

182、下列是系统性红斑狼疮的基础治疗药物,应长期维持使用的是 ()。-->**A. 羟氯喹**

183、下列说法不对的是 ()。-->**B. 以肾排泄为主药物,在肾衰竭时 T_{1/2} 明显缩短**

184、下列说法不正确的是 ()。-->**C. 不同类型的骨质疏松症,其治疗和预防的原则是不同的**

185、下列说法不正确的是 ()。

B. 以肾排泄为主的药物,在肾衰竭时 T_{1/2} 明显缩短

186、下列选项不是前列腺增生药物治疗选择的是 ()。-->**D. 丙酸睾酮**

187、下列药品不属于阿片受体激动剂的是 ()。-->**C. 纳洛酮**

188、下列药物不会引起直立性低血压的是 ()。-->**A. 非那雄胺**

189、下列药物单用抗帕金森病无效的是 ()。-->**B. 卡比多巴**

190、下列药物单用治疗抗帕金森病无效的是 ()。-->**B. 卡比多巴**

191、下列药物使用期间应密切关注血糖的是 ()。-->**C. 吗替麦考酚酯**

192、下列药物使用期间应密切关注血糖水平的是 ()。-->**B. 他克莫司**

193、下列药物在使用时需要使用带有滤网装置的是 ()。-->**E. 蔗糖铁**

194、下列药物在使用时需注意低血钾的是 ()。-->**D. 螺内酯**

195、下列药物在治疗肾病综合征时需注意高血钾的是 ()。-->**D. 螺内酯**

196、下列药物中常与她汀类联用是 ()。-->**D. 抗真菌药**

197、下列药物属于长效 NSAIDs 的是 ()。-->**A. 对乙酰氨基酚**

198、下列证据类型中,不属于原始研究的是 ()。-->**A. 系统评价**

199、下列属于间接成本是 ()。-->**B. 伤残导致误工损失**

200、下列属于肾功能检查指标的是 ()。-->**D. 血清肌酐**

201、下述说法中不正确的是 ()。-->**D. VD3 是维生素类药物,故可安全放心地服用**

202、消化性溃疡的发病机制,叙述较全面的是 ()。-->**B. 致溃疡的攻击因素和人体对胃黏膜的保护因素失去平衡**

203、哮喘给药途径以吸入疗法为优,如下表述不对的是 ()。-->**D. 血药浓度高**

204、血管紧张素转换酶抑制药的禁忌证不包括 ()。-->**B. 蛋白尿患者**

205、循证医学定义的核心内容不包括 ()。-->**A. 规章制度**

206、眼用糖皮质激素抗炎效力正确的是 ()。-->**C. 地塞米松氟米龙泼尼松龙氯化可的松**

207、眼用糖皮质激素可起到抗炎、抗过敏的治疗作用,下列说法正确的是 ()。-->**C. 抗炎效力: 地塞米松 > 氟米龙 > 泼尼松龙 > 氯化可的松**

208、药物治疗过程不涉及 ()。-->**D. 药物化学阶段**

209、药物治疗最初阶段,药物以不同剂型形式,通过不同给药途径,从给药部位进入患者体内的过程,称为 ()。-->**D. 药剂学阶段**

210、药学信息服务不包括 ()。-->**D. 进行新药的研究和开发**

211、药学信息服务不包括 ()。-->**D. 处方审查**

212、药学信息服务不涉及 ()。-->**B. 对药物使用数据进行挖掘**

213、药学信息服务核心为 ()。-->**A. 药物销售**

214、药疹治疗的首要措施是 ()。-->**C. 停用致敏药物**

215、一位患者的 HLA-B*5801 基因检测结果为阳性,如果他需要进行降尿酸的药物治疗,应避免使用 ()。-->**B. 别嘌醇**

216、一位患者的 HLA-B*5801 基因检测结果为阳性,如果他需要进行降尿酸的药物治疗,应避免使用 ()。-->**B. 别嘌醇**

217、医生开具处方应当遵循的原则是 ()。-->**C. 选用安全、有效、经济的药物**

218、以货币计量产出是 ()。-->**B. 效益**

219、以下不属于急性化脓性中耳炎常见致病菌的是 ()。-->**D. 大肠埃希菌**

220、以下关于二甲双胍的说法不正确的是 ()。-->**A. 本品不可与磺脲类口服降糖药合用,合用时低血糖风险增加**

221、以下关于降尿酸治疗错误的观点是 ()。-->**B. 服用促尿酸排泄的药物别嘌醇导致重度过敏患者可能有生命危险**

222、以下关于抗甲状腺功能亢进药物的说法正确的是 ()。-->**C. 停药后的复发率较高,并存在原发性或继发性失效可能**

223、以下关于抗甲状腺药物的说法,不正确的是 ()。-->**B. 因治疗需要,抗甲状腺药物导致的过敏反应可用抗组胺药物治疗,不能停药**

224、以下关于抗甲状腺药物的说法不正确的是 ()。-->**B. 因治疗需要,抗甲状腺药物导致的过敏反应可用抗组胺药物治疗,不能停药**

225、以下关于抗甲状腺药物的说法不正确的是 ()。-->**B. 因治疗需要,抗甲状腺药物导致的过敏反应可用抗组胺药物治疗,不能停药**

226、以下关于抗甲状腺药物说法不正确的是 ()。-->**B. 因治疗需要,抗甲状腺药物导致的过敏反应可用抗组胺药物治疗,不能停药**

227、以下关于药物蒙脱石的描述,错误的是 ()。-->**D. 不适用于儿童腹泻**

228、以下关于左甲状腺素钠片的说法不正确的是 ()。-->**D. 左甲状腺素替代治疗后 4~8 周监测血清甲状腺激素治疗达标后,每 6~12 个月复查一次**

229、以下抗抑郁药物治疗原则不恰当的是 ()。-->**C. 如仍无效,可考虑换药,但不能换用同类另一种药**

230、以下抗抑郁药物治疗原则不恰当的是 ()。-->**C. 如仍无效,可考虑换药,但不能换用同类另一种药**

231、以下全部为抑制骨吸收的一组药物是 ()。-->**B. 双膦酸盐类、降钙素、雌激素受体调节剂**

232、以下药品是阿片受体拮抗剂的是 ()。-->**C. 纳洛酮**

233、以下药物不是非促胰岛素分泌剂的是 ()。-->**C. 格列奈类**

234、以下药物不属于促胰岛素分泌剂的是 ()。-->**D. 二甲双胍**

235、以下属于短效胰岛素的是 ()。-->**A. 生物合成人胰岛素**

236、抑制骨矿化不良最严重的双膦酸盐类药物是 ()。-->**C. 依替膦酸钠**

237、银屑病临床上可分为 ()。-->**D. 寻常型、脓疱型、关节病型、红皮病型**

238、引起消化性溃疡的攻击因素,错误的是 ()。-->**D. 米索前列醇**

239、影响药物治疗的主要因素,不包括 ()。-->**D. 天气**

240、用糖皮质激素治疗肾病综合征,描述错误的是 ()。-->**A. 用药后尿中蛋白减少即减量**

241、与伪麻黄碱合用也许导致“重复用药”药物是 ()。-->**A. 泰诺**

242、与抑郁症药物治疗相关的神经递质不包括 ()。-->**D. 多巴胺**

243、原发性和继发性骨质疏松最重要的影响因素是 ()。-->**D. 激素调控**

244、在甲亢时升高,最常见和最有诊断意义的指标是 ()。-->**D. FT3**

245、在使用阿片或非阿片药物治疗慢性疼痛中,需要合理使用辅助药物,包括 ()。-->**D.以上都对**

246、治疗急性湿疹,无水肿、糜烂、渗液,外用药首选 ()。-->**A.炉甘石洗剂**

247、治疗类风湿关节炎的药物中,每周给药一次的是 ()。-->**C.氨甲蝶呤**

248、治疗类风湿关节炎的药物中,需要每周给药一次的是 ()。-->**C.甲氨蝶呤**

249、治疗头癣的口服药首选 ()。-->**A.灰黄霉素**

250、治疗哮喘给药途径以吸入疗法为优,表述不正确的是 ()。-->**D.血药浓度高**

251、治疗寻常型银屑病的药物治疗不包括 ()。-->**A.首选口服糖皮质激素**

252、终点指标不包括 ()。-->**C.血糖水平**

253、终点指标不涉及 ()。-->**A.病死率、病残率**

254、重度子痫前期患者,血压应高于或等于 ()。-->**D.160/110mmHg**

255、重型药疹应及早应用 ()。-->**D.糖皮质激素**

256、重型药疹应及早应用 ()。-->**D.糖皮质激素**

257、属于阿片受体拮抗剂的药品是 ()。-->**C.纳洛酮**

258、属于长效 NSAID 的是 ()。-->**D.塞来昔布**

259、属于短效 BZDs 类的药物是 ()。-->**A.咪达唑仑**

260、属于抗纤维蛋白溶解药的是 ()。-->**B.氨苯环酸**

261、最适宜治疗巨幼细胞性贫血患者的药物是 ()。-->**D.叶酸及维生素 B12**

262、左旋多巴治疗帕金森病的机制是 ()。-->**A.左旋多巴在脑内转变为 DA,补充纹状体内 DA 的不足**

名词配伍题(81)--电大资源网: <http://www.dda123.cn/> (微信搜: 905080280)

1、a-糖苷酶抑制剂适用于 () -->**A.以糖类为主要食物成分和餐后血糖升高的患者**

2、FDA 批准的唯一一种可用于治疗失眠的抗抑郁药是 ()。-->**B.多塞平**

3、IgA 肾病患者血压控制目标,当尿蛋白>1g/d 时, ()。-->**A.血压<125/75mmHg**

4、IgA 肾病患者血压控制目标,尿蛋白<1g/d 时, ()。-->**B.血压<130/80mmHg**

5、阿卡波糖的说明书适应症是配合饮食控制 ()。-->**D.降低糖耐量减低者的餐后血糖**

6、癌症患者轻度疼痛,可选用 ()。-->**A.非甾体类抗炎药物 (NSAIDs)**

7、癌症患者中度疼痛,可选用 ()。-->**C.弱阿片类药物或低剂量的强阿片类药物,并可联合应用非甾体类抗炎药物以及辅助镇痛药物**

8、癌症患者重度疼痛,首选 ()。-->**B.强阿片类药,并可合用非甾体类抗炎药物以及辅助镇痛药物**

9、促进骨形成的药物有 ()。-->**A.氟化物**

10、二甲双胍首选用于 ()。-->**C.单纯饮食及体育运动不能有效控制的 2 型糖尿病**

11、二甲双胍在糖尿病指南中推荐作为 ()。-->**B.2 型糖尿病患者控制高血糖的一线用药和联合用药中的基础用药**

12、高血压急症时惯用药物中,可用于各种高血压急症药物是 ()。-->**B.硝酸甘油**

13、高血压急症时惯用药物中,重要用于高血压危象或急性脑血管病时高血压急症药物是 ()。-->**A.硝普钠**

14、高血压急症时惯用药物中,重要用于急性心力衰竭或急性冠脉综合征时高血压急症药物是 ()。-->**C.尼莫地平**

15、荟萃分析是指 ()。-->**C.将系统评价中的多个不同结果的研究,合并为一个量化指标的统计学方法,从统计学角度达到增大样本量、提高检验效能的目的**

16、罗格列酮被称为 ()。-->**B.胰岛素增敏剂**

17、慢性肾衰竭贫血治疗的有效药物是 ()。-->**A.重组人红细胞生成素 (rhEPO)**

18、钠葡萄糖共转运体 2 抑制剂可 ()。-->**C.降低具有心血管高危风险的 2 型糖尿病患者主要心血管不良事件和肾脏事件复合终点发生发展的风险**

19、脑出血最常见的病因是 ()。-->**C.高血压和动脉硬化**

20、脑血栓形成最常见的病因是 ()。-->**A.脑动脉粥样硬化**

21、普通感冒常用药物中,常用的祛痰药是 ()。-->**B.氨,索**

22、普通感冒常用药物中,能选择性收缩上呼吸道血管,对血压的影响较小的药物是 ()。-->**A.伪麻黄碱**

23、普通感冒常用药物中,有助于消除或减轻普通感冒患者的打喷嚏和流涕等症状,但常见不良反应包括嗜睡、疲乏的药物是 ()。-->**C.马来酸氯苯那敏**

24、普通感冒惯用药物中,惯用祛痰药是 ()。-->**C.氨溴索**

25、普通感冒惯用药物中,能选择性收缩上呼吸道血管,对血压影响较小药物是 ()。-->**A.伪麻黄碱**

26、普通感冒惯用药物中,有助于消除或减轻普通感冒患者打喷嚏和流涕等症状,但常用不良反映涉及嗜睡、疲乏药物是 ()。-->**B.马来酸氯苯那敏**

27、前列腺增生患者使用度他雄胺,建议 ()。-->**C.使用本品前作直肠检查或其他前列腺检查**

28、前列腺增生患者在服用 α 受体阻断剂前剂或增加剂量 12h 内,或在停药时应 ()。-->**B.避免驾驶或机械操作**

29、前列腺增生患者在服用 5 α 还原酶抑制剂时, ()。-->**A.维持用药的时间宜较长**

30、妊娠高血压疾病的药物治疗,地西洋用于 ()。B.镇静

31、妊娠高血压疾病的药物治疗,硫酸镁用于 ()。C.防治子痫

32、妊娠高血压疾病的药物治疗,硝苯地平用于 ()。A.降压治疗

33、妊娠高血压疾病的药物治疗中,地西洋用于 ()。-->**B.镇静**

34、妊娠高血压疾病的药物治疗中,硫酸镁用于 ()。-->**C.防治子痫**

35、妊娠高血压疾病的药物治疗中,硝苯地平用于 ()。-->**A.降压治疗**

36、瑞格列奈的适应证是用于 ()。-->**A.饮食控制、减轻体重或运动锻炼不能有效控制其高血糖的 2 型糖尿病患者**

37、肾病综合征患者长期应用环孢素期间应 ()。-->**A.密切监测血药浓度,肾功能和血糖**

38、肾病综合征患者长期应用环孢素期间应 ()。B.密切监测血药浓度及肝肾功能

39、肾病综合征患者服用利尿剂时应 ()。D.监护电解质水平

40、肾病综合征患者服用利尿剂时应 ()。-->**B.监护电解质水平**

41、肾病综合征患者应用吗替麦考酚酯期间应 ()。C.密切监测血常规、肝功能

42、肾病综合征患者应用吗替麦考酚酯期间应 ()。-->**D.密切监测血常规、肝功能**

43、肾病综合征患者应用他克莫司期间需 ()。A.密切监测血药浓度,肾功能和血糖

44、肾病综合征患者应用他克莫司期间需 ()。-->**C.密切监测血药浓度及肝肾功能**

45、湿疹急性期无水肿、糜烂、渗液时,药物治疗选择 ()。-->**D.炉甘石洗剂、糖皮质激素乳膏或凝胶**

46、湿疹急性期有大量渗出时,药物治疗选择 ()。-->**A.冷湿敷,如 3%硼酸溶液、0.1%盐酸小檗碱溶液、0.1%依沙吖啶溶液等**

47、湿疹急性期有大量渗出时选择 ()。-->**C.冷湿敷,如 3%硼酸溶液、0.1%盐酸小檗碱溶液、0.1%依沙吖啶溶液等**

48、湿疹慢性期药物治疗选择 ()。-->**B.外用糖皮质激素软膏、乳剂或酊剂等,可合用保湿剂及角质松解剂**

49、湿疹慢性期应 ()。-->**A.外用糖皮质激素软膏、乳剂或酊剂等,可合用保湿剂及角质松解剂**

50、湿疹亚急性期药物治疗选择 ()。-->**C.外用氧化锌糊剂、糖皮质激素乳膏**

51、湿疹亚急性期应 ()。-->**B.外用氧化锌糊剂、糖皮质激素乳膏**

52、双重抗血小板治疗首选的指征是 ()。-->**B.轻型缺血性脑卒中患者 (NIHSS 评分 \leq 3)。**

53、随机对照试验是指 ()。-->**A.在人群中进行的、前瞻性的、用于评估医学干预措施效果的实验性对照研究**

54、替代指标是指 ()。-->**D.与药物作用直接相关的指标,表现为症状或检测指标的改善,通常在较短时间内出现变化**

55、循证医学及循证药理学证据中,病例分析属于 ()。-->**A.原始研究证据**

56、循证医学及循证药理学证据中,临床实践指南属于 ()。-->**B.二次研究证据**

57、循证医学及循证药理学证据中,随机对照实验属于 ()。-->**A.原始研究证据**

58、循证医学及循证药理学证据中,系统评价/Meta 分析属于 ()。-->**B.二次研究证据**

59、用于体外循环下实施冠状动脉旁路移植术的病人,以减少手术过程中的出血,并相应降低输血要求的药物是 ()。-->**D.抑肽酶**

60、再生障碍性贫血的常用药物是 ()。-->**C.司坦唑醇**

61、治疗过敏性鼻炎的药物 0.03%异丙托溴铵鼻溶液属于 ()。-->**D.抗胆碱药**

- 62、治疗过敏性鼻炎的药物 1%麻黄碱溶液属于 ()。-->B 减充血剂
- 63、治疗过敏性鼻炎的药物 4%色甘酸钠属于 ()。-->A 肥大细胞膜稳定剂
- 64、治疗过敏性鼻炎的药物孟鲁司特钠属于 ()。-->C 抗白三烯药
- 65、治疗和预防骨质疏松症的药物中,促进骨形成的药物是 ()。
A.维生素 K
- 66、治疗和预防骨质疏松症的药物中,促进骨形成的药物是 ()。
-->A 化物
- 67、治疗和预防骨质疏松症的药物中,抑制骨吸收的药物是 ()
-->B 雌激素和孕激素
- 68、治疗和预防骨质疏松症的药物中,作用于骨矿化的药物是 ()。
C.维生素 D3
- 69、治疗和预防骨质疏松症的药物中,作用于骨矿化的药物是 ()。
-->C 活性维生素 D
- 70、治疗急性上呼吸道感染,氨溴索的作用是 ()。-->D 提高咳嗽对气道分泌物的消除率
- 71、治疗急性上呼吸道感染,对乙酰氨基酚的作用是 ()。-->C 针对普通感冒患者的发热、咽痛和全身酸痛等症状
- 72、治疗急性上呼吸道感染,伪麻黄碱的作用是 ()。-->A 选择性收缩上呼吸道血管,缓解感冒引起的鼻塞、流涕和打喷嚏等症状
- 73、治疗失眠的药物中,属于长效苯二氮革类药物的是 () -->A 地西洋
- 74、治疗失眠的药物中,属于非苯二氮革类药物的是 () -->C 唑吡坦
- 75、主要用于因原发性纤维蛋白溶解过度所引起的出血的药物是 ()。-->B 氨甲苯酸
- 76、属于钙通道阻滞药的是 ()。-->C 氨氯地平
- 77、属于观察性研究范畴的是 ()。-->B 队列研究、病例对照研究和横断面研究
- 78、属于利尿药的是 () -->A 氢氯噻嗪
- 79、属于血管紧张素 1 受体阻滞剂的是 ()。-->D 氯沙坦
- 80、属于血管紧张素转换酶抑制药的是 ()。-->B 卡托普利
- 81、作用于骨矿化的药物有 ()。-->C 活性维生素 D3

2017 年来,每年都有 50+个科目改版,电大资源网每学期均会在期末考试前整合最新试题+作业+综合练习册题目,有需要直接访问 <http://www.dda123.cn/> 任何问题都可以联系我微信: 905080280